

Indlægsseddel: Information til brugeren Voltaren 11,6 mg/g gel

diclofenacdiethylamin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Voltaren uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Voltaren.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren
3. Sådan skal du bruge Voltaren
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltaren tilhører gruppen af non-steroid antiinflammatoriske stoffer (NSAID). Voltaren dæmper betændelse og er smertestillende.

Du kan bruge Voltaren til behandling af smerter, ømhed og hævelser i led og muskler pga. betændelse.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Voltaren for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren

Brug ikke Voltaren, hvis du

- er allergisk over for diclofenac, andre non-steroid antiinflammatoriske stoffer (NSAIDs) eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i afsnit 6.
- tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, angioødem, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAIDs).
- er gravid i tredje trimester.
- er under 14 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på, at

- du ikke må bruge Voltaren på beskadiget hud, på åbne sår eller på eksem
- Voltaren ikke må komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis du ved et uheld får gel i øjnene, så skyl omhyggeligt med rent vand og kontakt lægen
- hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Voltaren
- Voltaren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen

- du ikke må tage solbad, og du ikke må opholde dig længe i solen, mens du bruger Voltaren
- du ikke må bruge Voltaren under tætsluttende forbindelse
- hvis du har eller har haft astma eller allergi, kan Voltaren udløse astmalignende anfald
- ældre oftere får bivirkninger af Voltaren og anden smertestillende medicin (NSAIDs)
- hvis du tager anden medicin mod smerter (NSAIDs), er risikoen for bivirkninger større
- du ikke må bruge Voltaren på store hudområder og i længere tid
- Voltaren kan påvirke dine nyrer, selvom det smøres på huden
- Voltaren indeholder propylenglycol og benzybenzoat, der kan irritere huden.

Brug af anden medicin sammen med Voltaren

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan få flere bivirkninger, hvis du samtidig bruger medicin mod smerter og betændelsestilstande (acetylsalicylsyre og andre NSAIDs).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Brug ikke Voltaren, hvis du er gravid i tredje trimester, da det kan skade dit ufødte barn eller medføre problemer ved fødslen. Voltaren bør ikke gives de første seks måneder af graviditeten, medmindre det er absolut nødvendigt og anbefalet af din læge. Ved behov for behandling i denne periode skal dosis holdes så lav som muligt og behandlingens varighed så kort som muligt.

Orale former af Voltaren (f.eks. tabletform) kan medføre bivirkninger hos det ufødte barn. Det er ikke kendt, om samme risiko gælder for Voltaren, når det anvendes på huden.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Voltaren på brysterne eller på store hudområder, og du skal bruge det så kort tid som muligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltaren påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Voltaren indeholder propylenglycol (E1520) og benzybenzoat

Voltaren indeholder propylenglycol (E1520) og benzybenzoat, som kan irritere huden og give allergiske reaktioner.

Voltaren indeholder duftstoffer (parfume)

Voltaren gel indeholder duftstoffer med benzylalkohol, citral, citronellol, coumarin, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, linalool, som kan medføre allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Voltaren

Voltaren må kun anvendes til udvortes brug.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn på 14 år og derover:

Smør gel svarende til en mængde på størrelse med et kirsebær til en valnød (svarer til 2-4 g) på huden 3-4 gange daglig.

Brugsanvisning:

Tube uden applikator

- 1) Inden første anvendelse:
 - Aluminiumstube: Lav hul på forseglingen ved hjælp af spidsen på tubens skruelåg.
 - Plasttube: Fjern forseglingen ved hjælp af den prægede overflade på bagsiden af skruelåget.
- 2) Massér forsigtigt gelen ind i huden på det ømme eller betændte område. Du kan opleve en svagt kølende fornemmelse, når gelen masseres ind.
- 3) Efter påsmøring skal hænderne tørres med absorberende papir (fx køkkenrulle) og derefter vaskes, medmindre du behandler hænderne. Det absorberende papir skal smides i skraldespanden efter brug.
- 4) Vent med at bade indtil Voltaren er tørret ind.

Tube med applikator (Se figur 1)

- 1) Inden første anvendelse:
 - Fjern den gennemsigtige beskyttelseshætte og skru applikatoren af. Bryd forseglingen ved hjælp af den stjerneformede åbning på applikatorens side. Skru applikatoren på tuben igen inden du trykker gel ud.
- 2) Applikatoren åbnes ved at trække i den hvide del. Tryk forsigtigt på tuben for at trykke gel ud i applikatoren. Brug applikatoren til forsigtigt at massere/gnide gelen ind i det ømme eller hævede område ligesom du ville gøre, hvis det var med fingrene. Når du masserer gelen ind i huden, vil trykket på applikatoren automatisk få den til at lukke.
- 3) Efter påsmøring skal hænderne tørres med absorberende papir (fx køkkenrulle) og derefter vaskes, medmindre du behandler hænderne. Det absorberende papir skal smides i skraldespanden efter brug.
- 4) Vent med at bade indtil Voltaren er tørret ind.
- 5) Efter brug, tørres applikatoren af med en klud eller papir indtil den er tør og ren. Skyl eller dyp ikke applikatoren i vand. Brug ikke sæbe eller rengøringsmidler til at vaske overfladen af applikatoren. Efter rengøring, sættes den gennemsigtige beskyttelseshætte tilbage på tuben. Genbrug ikke applikatoren med en anden tube, men kassér den sammen med tuben, når du afleverer dine medicinrester på apoteket.

Figur 1



Træk den gennemsigtige beskyttelseshætte af



Skru applikatoren af



Bryd forseglingen ved hjælp af den stjerneformede åbning på applikatorens side



Skru applikatoren på tuben igen



Træk i den hvide del for at åbne applikatoren



Tryk forsigtigt på tuben for at trykke gel ud



Brug applikatoren til at massere gelen ind i huden.
Applikatoren lukker sig automatisk



Tør applikatoren af med en klud eller papir indtil den er tør og ren.

Behandler du akutte, mindre skader som f.eks. forstuvninger med Voltaren, må du ikke bruge Voltaren i mere end 7 dage uden at tale med lægen.

Kontakt din læge, hvis dine symptomer bliver værre eller ikke forbedres indenfor 7 dages behandling med Voltaren.

Hvis din læge har ordineret Voltaren til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du må ikke dække den påsmurte hud med tætsluttende forbindinger.

Administration

Voltaren må kun bruges på huden.

Børn og unge under 14 år:

Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for brug af Voltaren hos børn og unge under 14 år.

Hvis du har brugt for meget Voltaren

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Voltaren, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Voltaren

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Voltaren

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De hyppigste bivirkninger omfatter milde og forbigående hudreaktioner på applikationsstedet.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Vejrtrækningsbesvær, åndenød, astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

- Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem.
- Brændende fornemmelse på den behandlede hud.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

- Betændelse i huden med eller uden blærer.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Nældefeber, hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Øget følsomhed af huden for lys.

Afbryd behandlingen med Voltaren, hvis du får hududslæt af enhver art.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Voltaren ved temperaturer over 30 °C.
- Brug ikke Voltaren efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltaren 11,6 mg/g, gel indeholder

- Aktivt stof: Diclofenacdiethylamin 11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g.
- Hjælpesoffer: Dette lægemiddel indeholder 50 mg propylenglycol (E1520) og 1 mg benzybenzoat per gram gel.
- Øvrige indholdsstoffer: carbomer, macrogolcetostearylether, cocoylcaprylcarprat, isopropanol, diethylamin, paraffinolie, parfume creme 45 (indeholder benzylalkohol, citral, citronellol, coumarin, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, linalool) og rensset vand.

Udseende og pakningstørrelse

Voltaren findes i pakninger af 50 g, 75 g, 100 g eller 150 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
Vallensbæk Strand
Telefon: 80 25 16 27
E-mail: mystory.nd@haleon.com

Fremstiller

Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
Vallensbæk Strand
Danmark

Purna Pharmaceuticals NV

Rijksweg 17,
B-2870 Puurs
Belgium

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2024.