

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Panadol Cold & Flu & Cough 500 mg / 6,1 mg / 100 mg καψάκια, σκληρά

Για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω
παρακεταμόλη, υδροχλωρική φαινυλεφρίνη, γουαϊφενεσίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεσθε καλύτερα ή εάν αισθάνεσθε χειρότερα μετά από 3 ημέρες.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Panadol Cold & Flu & Cough και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough
3. Πώς να πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Panadol Cold & Flu & Cough
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Panadol Cold & Flu & Cough και ποια είναι η χρήση του

Το Panadol Cold & Flu & Cough χρησιμοποιείται για τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τα συμπτώματα του κρυολογήματος, του ρίγους και της γρίπης. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ήπιους και μέτριους πόνους, πυρετό, ρινική συμφόρηση (βουλωμένη μύτη) και παραγωγικό βήχα.

Το Panadol Cold & Flu & Cough προορίζεται για χρήση μόνο σε ενήλικες, ηλικιωμένους και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω.

Το Panadol Cold & Flu & Cough πρέπει να λαμβάνεται ΜΟΝΟ εάν πάσχετε από **ΟΛΑ** τα ακόλουθα συμπτώματα: πόνο ή/και πυρετό, βουλωμένη μύτη και παραγωγικό βήχα. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας αν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 3 ημέρες, ή αν ο βήχας συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, δερματικό εξάνθημα ή επίμονο πονοκέφαλο.

Πώς λειτουργεί το Panadol Cold & Flu & Cough

Το Panadol Cold & Flu & Cough περιέχει τρεις δραστικές ουσίες:

- Η παρακεταμόλη είναι ένα παυσίπονο (αναλγητικό) και μειώνει τον πυρετό (μειώνει τη θερμοκρασία σας όταν έχετε πυρετό).
- Η υδροχλωρική φαινυλεφρίνη είναι ένα ρινικό αποσυμφορητικό. Ξεμπλοκάρει τη βουλωμένη μύτη σας και σας βοηθά να αναπνέετε ευκολότερα μειώνοντας το πρήξιμο στις ρινικές οδούς.
- Η γουαϊφενεσίνη είναι ένα αποχρεμπτικό που ρευστοποιεί τη βλέννα (φλέγμα) και ανακουφίζει τον παραγωγικό βήχα.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough

MHN πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough

- σε περίπτωση αλλεργίας στην παρακεταμόλη, την υδροχλωρική φαινυλεφρίνη, την γουαϊφενεσίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- εάν έχετε καρδιακή νόσο ή υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)
- εάν έχετε διαβήτη
- εάν έχετε υπερδραστήριο θυρεοειδή
- εάν έχετε γλαύκωμα κλειστής γωνίας (αυξημένη πίεση στο μάτι)
- εάν έχετε φαιοχρωμοκύττωμα (ένα είδος όγκου των επινεφριδίων που βρίσκονται πλησίον των νεφρών)
- εάν παίρνετε ή έχετε πάρει τις τελευταίες 14 ημέρες, αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAOIs) (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή της νόσου του Parkinson)
- εάν παίρνετε τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
- εάν παίρνετε β-αναστολείς (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών προβλημάτων)
- εάν παίρνετε άλλα συμπαθομιμητικά φάρμακα όπως αποσυμφορητικά, κατασταλτικά της όρεξης και ψυχοδιεγερτικά παρόμοια της αμφεταμίνης

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το Panadol Cold & Flu & Cough ΜΟΝΟ εάν πάσχετε από ΟΛΑ τα ακόλουθα συμπτώματα: πόνο ή/και πυρετό, βουλωμένη μύτη και παραγωγικό βήχα.

Περιέχει παρακεταμόλη. **MHN το πάρετε με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που περιέχουν παρακεταμόλη.**

Μην πάρετε μεγαλύτερη δόση από τη συνιστώμενη καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρή ηπατική βλάβη.

Γενικά, η συνήθης πρόσληψη των παυσίπονων, και ιδιαίτερα ο συνδυασμός πολλών αναλγητικών ουσιών, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη νεφρική βλάβη με κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας.

Μην πίνετε αλκοολούχα ποτά, ενώ παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Μην πάρετε αυτό το φάρμακο με οποιοδήποτε άλλο προϊόν για το βήχα, το κρυολόγημα ή αποσυμφορητικά.

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 3 ημέρες, επιδεινωθούν ή αν ο βήχας σας συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, δερματικό εξάνθημα ή επίμονο πονοκέφαλο.

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough, αν έχετε:

- προβλήματα στο ήπαρ
- προβλήματα στα νεφρά
- διογκωμένο προστάτη, καθώς μπορεί να έχετε κατακράτηση ούρων και δυσκολία στην ούρηση
- πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος (όπως το σύνδρομο του Raynaud)
- ήπιο ίκτερο (σύνδρομο Gilbert)
- σοβαρή λοίμωξη, είστε σοβαρά υποσιτισμένοι, σοβαρά λιποβαρείς ή είστε χρόνιοι, βαρείας μορφής, χρήστες αλκοόλ
- χρόνια βήχα (όπως συμβαίνει με το κάπνισμα), άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα ή εμφύσημα (νόσος των πνευμόνων).

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Panadol Cold & Flu & Cough, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν:

- Πάσχετε από σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής νεφρικής δυσλειτουργίας ή σήψης (όταν τα βακτήρια και οι τοξίνες τους κυκλοφορούν στο αίμα με

αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στα όργανα), ή εάν πάσχετε από υποσιτισμό, χρόνιο αλκοολισμό ή εάν λαμβάνετε επίσης φλουκλοξακιλλίνη (αντιβιοτικό). Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει αναφερθεί μια σοβαρή πάθηση που ονομάζεται μεταβολική οξέωση (ανωμαλία του αίματος και των υγρών) όταν η παρακεταμόλη χρησιμοποιείται σε τακτικές δόσεις για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή όταν η παρακεταμόλη λαμβάνεται σε συνδυασμό με φλουκλοξακιλλίνη. Τα συμπτώματα της μεταβολικής οξέωσης μπορεί να περιλαμβάνουν: σοβαρή δυσκολία αναπνοής με βαθιά ταχεία αναπνοή, υπνηλία, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) και έμετο.

Παιδιά και έφηβοι

Μη δίνετε αυτό το φάρμακο σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 16 ετών ή σε εφήβους ηλικίας 16 έως 18 ετών που ζυγίζουν λιγότερο από 50 kg.

Άλλα φάρμακα και Panadol Cold & Flu & Cough

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Panadol Cold & Flu & Cough εάν παίρνετε:

- ή έχετε πάρει τις τελευταίες 14 ημέρες αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAOIs), που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης και της νόσου του Πάρκινσον
- τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της κατάθλιψης
- φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως βήτα-αναστολείς
- φάρμακα που περιέχουν συμπαθομιμητικά φάρμακα όπως αποσυμφορητικά, κατασταλτικά της όρεξης και ψυχοδιεγερτικά παρόμοια της αμφεταμίνης.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, συγκεκριμένα:

- φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και τις ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό (διγοξίνη και άλλες καρδιακές γλυκοσίδες)
- φάρμακα για την αραιώση του αίματος (αντιπηκτικά), όπως η βαρφαρίνη ή άλλες κουμαρίνες
- φάρμακα για τη ναυτία και τον έμετο, όπως η μετοκλοπραμίδα ή η δομπεριδόνη
- φάρμακα για τη φυματίωση (ριφαμπικίνη και ισονιαζίδη), για βακτηριακές λοιμώξεις (χλωραμφαινικόλη)
- φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων, όπως η λαμοτριγίνη, η φαινοτοΐνη, η φαινοβαρβιτάλη και η καρβαμαζεπίνη
- χολεστυραμίνη, που χρησιμοποιείται για τη μείωση της χοληστερόλης
- ζιδοβουδίνη (AZT), που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της λοίμωξης HIV (AIDS)
- προβενεσίδη, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας
- εργοταμίνη και μεθυσεργίδη, που χρησιμοποιούνται για την ημικρανία
- φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του πυρετού ή του ήπιου πόνου (σαλικυλικά, σαλικυλαμίδιο)
- φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη ή αποσυμφορητικά για το κρυολόγημα και τη γρίπη
- αλογονωμένα αναισθητικά που χρησιμοποιούνται στην αναισθησία πριν το χειρουργείο
- φλουκλοξακιλλίνη (αντιβιοτικό), λόγω σοβαρού κινδύνου ανωμαλίας του αίματος και των υγρών (που ονομάζεται μεταβολική οξέωση) που χρήζει επείγουσας θεραπείας (βλ. παράγραφο 2)
- ενημερώστε τον γιατρό σας ότι παίρνετε αυτό το φάρμακο εάν θα υποβληθείτε σε εξετάσεις ούρων.

Το Panadol Cold & Flu & Cough με τροφή, ποτό και οινόπνευματώδη

Μην πίνετε αλκοόλ ενώ παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Αυτό το φάρμακο μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή.

Κύηση και θηλασμός

Μην παίρνετε το Panadol Cold & Flu & Cough εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ζάλη. Αν σας επηρεάζει, μην οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανήματα.

3. Πώς να πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι:

Για ενήλικες, ηλικιωμένους και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω, που ζυγίζουν πάνω από 50 κιλά:

- Καταπίνετε 2 καψάκια με νερό κάθε 4 έως 6 ώρες, όπως απαιτείται.
- Μην παίρνετε περισσότερα από 6 καψάκια (3 δόσεις των 2 καψακίων) σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών (αντιστοιχεί σε 3000 mg παρακεταμόλης, 36,6 mg υδροχλωρικής φαινυλεφρίνης και 600 mg γουαϊφενεσίνης).
- Αφήνετε πάντα 4 ώρες, τουλάχιστον, μεταξύ των δόσεων. Χρησιμοποιείτε τη μικρότερη δόση που χρειάζεστε για τη θεραπεία των συμπτωμάτων σας και χρησιμοποιείτε το φάρμακο για το συντομότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται.
- Μην το χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 3 ημέρες. Ενημερώστε τον γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμένουν μετά από 3 ημέρες ή επιδεινώνονται ή αν ο βήχας συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, δερματικό εξάνθημα ή επίμονο πονοκέφαλο.

Τα καψάκια Panadol Cold & Flu & Cough δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ενήλικες, ηλικιωμένους και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω, που ζυγίζουν λιγότερο από 50 κιλά.

Μην υπερβαίνετε την αναφερόμενη δόση.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Μην δίνετε σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Μην δίνετε σε εφήβους ηλικίας 16 έως 18 ετών που ζυγίζουν λιγότερο από 50 kg.

Ασθενείς με ηπατική νόσο

Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, η δόση θα πρέπει να μειωθεί ή **το μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων να παραταθεί**. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο. Η συνολική ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 καψάκια ανά 24 ώρες (με ελάχιστο χρονικό διάστημα 8 ωρών μεταξύ των δόσεων).

Ασθενείς με νεφρική νόσο

Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, **το μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων** θα πρέπει να παραταθεί. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο. Καταλληλότερες φαρμακευτικές μορφές είναι διαθέσιμες προς χρήση στην αγορά.

Τρόπος χορήγησης:

Για από στόματος χρήση.

Καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο με νερό. Μην μασάτε το καψάκιο.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Panadol Cold & Flu & Cough από την κανονική

Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά καψάκια, αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα, ακόμα κι αν αισθάνεστε καλά, λόγω του κινδύνου καθυστερημένης, σοβαρής ηπατικής βλάβης.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough

Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε εκτός και αν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας. Έπειτα συνεχίστε τη θεραπεία όπως συνιστάται. Αφήνετε πάντα ένα διάστημα τουλάχιστον 4 ωρών ανάμεσα σε δύο δόσεις. Ποτέ μην πάρετε διπλή δόση (4 καψάκια) για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό, ή

τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Panadol Cold & Flu & Cough μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να παίρνετε το Panadol Cold & Flu & Cough και ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε:

- αλλεργικές αντιδράσεις, όπως συρίττουσα αναπνοή (συριγμός), δύσπνοια, πρήξιμο του προσώπου ή του στόματος
- δερματικό εξάνθημα (συμπεριλαμβανομένων κνίδωσης, φαγούρας), ερυθρότητα του δέρματος
- ξεφλούδισμα δέρματος, φλύκταινες (φουσκάλες), πληγές, έλκη στόματος
- προβλήματα στο αίμα συμπεριλαμβανομένης της ασυνήθιστης αιμορραγίας ή μώλωπες
- κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος). Αυτά είναι ενδείξεις ηπατικών προβλημάτων.

Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα) ή πολύ σπάνιες. Ειδικότερα, οι σοβαρές δερματικές αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα).

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανισθούν σε σπάνιες ή πολύ σπάνιες περιπτώσεις (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 ή 1 στα 10.000 άτομα). Εάν εκδηλώσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, ενημερώστε τον γιατρό σας:

- πόνο στο στομάχι ή δυσφορία (διάρροια, ναυτία, έμετο)
- πονοκέφαλος, ζάλη
- αυξημένη αρτηριακή πίεση του αίματος, αίσθημα παλμών, γρήγορο καρδιακό παλμό
- διαταραχή ύπνου, ανησυχία, νευρικότητα, ευερεθιστότητα και σύγχυση
- δυσκολία στην αναπνοή
- διαστολή της κόρης του οφθαλμού, αυξημένη πίεση στο μάτι
- επώδυνη ούρηση, αδυναμία ούρησης.

Ηπατικά προβλήματα, περιλαμβανομένων των μη φυσιολογικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων ηπατικής λειτουργίας μπορεί να εμφανισθούν σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

«Μη γνωστής συχνότητας» (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):

Μια σοβαρή πάθηση που μπορεί να αυξήσει την οξύτητα του αίματος (η οποία ονομάζεται μεταβολική οξέωση), σε ασθενείς με σοβαρή ασθένεια στους οποίους χορηγείται παρακεταμόλη (βλ. παράγραφο 2)

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας

- στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 + 30 21 32040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>, για την Ελλάδα, ή
- στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs, για την Κύπρο.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Panadol Cold & Flu & Cough

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη και

το κουτί μετά το «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Panadol Cold & Flu & Cough

Οι **δραστικές ουσίες** είναι η παρακεταμόλη, η υδροχλωρική φαινyleφρίνη και η γουαϊφενεσίνη. Κάθε καψάκιο περιέχει 500 mg παρακεταμόλης, 6,1 mg υδροχλωρικής φαινyleφρίνης (που αντιστοιχεί σε 5 mg βάσης φαινyleφρίνης) και 100 mg γουαϊφενεσίνης.

Τα **άλλα συστατικά** είναι: καρμελλόζη νατρίουχος διασταυρούμενη, άμυλο αραβοσίτου, νάτριο λαουρυλοθεικό, τάλκης και μαγνήσιο στεατικό.

Το **κέλυφος του καψακίου** περιέχει: ζελατίνη, ινδικοκαρμίνιο (E132), διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινο κινολίνης (E104), ερυθροσίνη (E127).

Εμφάνιση του Panadol Cold & Flu & Cough και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Panadol Cold & Flu & Cough είναι καψάκια ζελατίνης, σκληρά με ημιδιαφανές πράσινο σώμα και αδιαφανές μπλε κάλυμμα, μεγέθους 0, πληρούμενο με υπόλευκη κόνι, ελεύθερο μεγάλων συσσωματωμάτων και σωματιδιακής επιμόλυνσης.

Το Panadol Cold & Flu & Cough είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 8 ή 16 καψακίων.

Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Haleon Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο Haleon Ελλάς,
Λεωφόρος Κηφισίας 11,
151 23 Μαρούσι Αττικής,
Ελλάδα,
Τηλ.: 2102217200

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας: στην Κύπρο:

C.A. Papaellinas Ltd., Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2234 Λατσία, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. 22741741

Παρασκευαστής

Haleon Alcala, S.A.
Ctra. de Ajalvir, Km. 2,500
Alcalá de Henares,
28806 Madrid, Ισπανία

Haleon Germany GmbH,
Barthstraße 4
80339 München
Γερμανία

Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Βουλγαρία	Терафлу Форте Простуда и Кашлица 500 mg/6,1 mg/100 mg твърди капсули
Κροατία	Theraflu 500 mg/6,1 mg/100mg tvrde kapsule
Κύπρος	Panadol Cold & Flu & Cough
Τσεχία	Panadol chřipka a kašel
Εσθονία	Theraflu
Γερμανία	OtriComplex Erkältungskapseln 500 mg / 6,1 mg / 100 mg Hartkapseln
Ελλάδα	Panadol Cold & Flu & Cough
Ουγγαρία	Neo Citran megfázásra és köhögésre kemény kapszula
Λετονία	Theraflu 500mg/ 100mg/ 6,1mg cietās kapsulas
Λιθουανία	Theraflu 500mg/ 100mg/ 6,1mg kietosios kapsulės
Πολωνία	Theraflu Total Grip
Πορτογαλία	Panadol Gripus
Ρουμανία	THERAFLU RĂCEALĂ ȘI TUSE 500 mg/ 100 mg/ 6,1 mg capsule
Σλοβενία	Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg trde kapsule

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Ελλάδα: 13/08/2025

Κύπρος: 10/07/2025