

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

VOLTADOL 24-HOURS 140 mg φαρμακούχο έμπλαστρο νατριούχος δικλοφαινάκη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 7 ημέρες.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το VOLTADOL 24-HOURS και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το VOLTADOL 24-HOURS
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το VOLTADOL 24-HOURS και ποια είναι η χρήση του

Το VOLTADOL 24-HOURS είναι ένα φάρμακο το οποίο ανακουφίζει τον πόνο. Ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων τα οποία είναι γνωστά ως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ).

Το VOLTADOL 24-HOURS χρησιμοποιείται για τη βραχυχρόνια (να μην υπερβαίνει τις 7 ημέρες), τοπική συμπτωματική θεραπεία του πόνου σε οξείες κακώσεις μυών ή τενόντων, διαστρέμματα ή μώλωπες των χεριών και των ποδιών ως αποτέλεσμα τραυματισμών, σε ενήλικες και εφήβους άνω των 16 ετών.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS

Μη χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS

- σε περίπτωση **αλλεργίας** στη **δικλοφαινάκη** ή σε οποιοδήποτε **άλλο από τα συστατικά** αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6),
- σε περίπτωση **αλλεργίας** σε οποιοδήποτε **άλλο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο** (ΜΣΑΦ, π.χ. ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή ιβουπροφαίνη),
- σε περίπτωση που **έχετε εμφανίσει άσθμα, κνίδωση ή οίδημα και ερεθισμό στο εσωτερικό της μύτης** μετά από τη λήψη ακετυλοσαλικυλικού οξέος ή οποιουδήποτε άλλου ΜΣΑΦ,
- σε περίπτωση που πάσχετε από **ενεργό έλκος στομάχου ή δωδεκαδάκτυλου**,
- σε περίπτωση που **το δέρμα είναι τραυματισμένο** (π.χ. εκδορές, ανοιχτά τραύματα, εγκαύματα), όταν υπάρχουν **λοιμώξεις του δέρματος ή δέρμα που έχει προσβληθεί από φλεγμονή (εξιδρωματική δερματίτιδα) ή έκζεμα**
- σε περίπτωση που βρίσκεστε στους τελευταίους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης.
- σε περίπτωση που είστε παιδί ή έφηβος ηλικίας μικρότερης των 16 ετών.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS

- εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν βρογχικό άσθμα ή αλλεργίες, μπορεί να παρουσιάσετε σπασμωδική συστολή βρόγχων (βρογχόσπασμο), που οδηγεί σε δυσκολία στην αναπνοή.
- εάν παρατηρήσετε **δερματικό εξάνθημα** που εμφανίζεται μετά την εφαρμογή του φαρμακούχου εμπλάστρου. Εάν συμβεί αυτό, αφαιρέστε αμέσως το έμπλαστρο και σταματήστε τη θεραπεία.
- εάν πάσχετε από διαταραχές των **νεφρών**, της **καρδιάς** ή του **ήπατος**, ή αν είχατε παλαιότερα **έλκος στομάχου ή εντέρου ή εντερική φλεγμονή ή τάση προς αιμορραγία**.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να μειωθούν χρησιμοποιώντας την ελάχιστη αποτελεσματική δόση για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Σημαντικές προφυλάξεις

- Το φαρμακούχο έμπλαστρο δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με ή να εφαρμοστεί στα μάτια ή στις βλεννογόνους μεμβράνες.
- Οι ηλικιωμένοι ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν το VOLTADOL 24-HOURS με προσοχή, γιατί είναι πολύ πιθανότερο να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Μετά από την αφαίρεση του φαρμακούχου εμπλάστρου, αποφύγετε την έκθεση της περιοχής στην οποία εφαρμόστηκε το έμπλαστρο στο άμεσο ηλιακό φως ή την ακτινοβολία από σολάριουμ προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ευαισθησίας στο φως.

Μη χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS ταυτόχρονα με κανένα άλλο φάρμακο που περιέχει δικλοφαινάκη ή άλλα μη στεροειδή αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται εξωτερικά ή λαμβάνονται από το στόματος.

Παιδιά και έφηβοι

Η δικλοφαινάκη αντενδείκνυται για χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 16 ετών. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών (βλέπε παράγραφο «**Μη χρησιμοποιείτε το VOLTADOL 24-HOURS**»).

Άλλα φάρμακα και VOLTADOL 24-HOURS

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή ενδέχεται να πάρετε άλλα φάρμακα.

Δεδομένης της σωστής χρήσης του VOLTADOL 24-HOURS, μόνο μία μικρή ποσότητα δικλοφαινάκης απορροφάται στο σώμα, με αποτέλεσμα οι αλληλεπιδράσεις που περιγράφονται για τα φάρμακα που περιέχουν δικλοφαινάκη και λαμβάνονται από το στόματος να είναι απίθανο να εμφανιστούν.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.

Κύηση

Στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης, το VOLTADOL 24-HOURS δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, γιατί δεν μπορεί να αποκλειστεί ο αυξημένος κίνδυνος επιλοκών για τη μητέρα και το παιδί (βλέπε παράγραφο «**Μη χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS**»).

Στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης ή εάν επιθυμείτε να μείνετε έγκυος, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS. Εάν χρειάζεστε θεραπεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Οι από του στόματος μορφές (π.χ. δισκία) της δικλοφαινάκης μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες στο αγέννητο μωρό σας. Δεν είναι γνωστό εάν ο ίδιος κίνδυνος ισχύει για το VOLTADOL 24-HOURS όταν χρησιμοποιείται στο δέρμα.

Θηλασμός

Μικρή ποσότητα δικλοφαινάκης περνά στο μητρικό γάλα.

Μιλήστε με τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Σε κάθε περίπτωση, εάν θηλάζετε, το VOLTADOL 24-HOURS δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί απευθείας στην περιοχή του μαστού.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το VOLTADOL 24-HOURS δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Το VOLTADOL 24-HOURS περιέχει βουτυλδροξυανισόλη (E320)

Η βουτυλδροξυανισόλη μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής) ή ερεθισμό στα μάτια και τις βλεννογόνους μεμβράνες.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι ένα φαρμακούχο έμπλαστρο μία φορά την ημέρα.


Εφαρμόστε ένα φαρμακούχο έμπλαστρο στην πάσχουσα περιοχή. Η μέγιστη συνολική ημερήσια δόση είναι 1 φαρμακούχο έμπλαστρο, ακόμη και αν υπάρχουν παραπάνω από μία τραυματισμένες περιοχές. Εφαρμόστε μόνο σε μία επώδυνη περιοχή τη φορά.

Τρόπος χορήγησης

Για εφαρμογή σε δέρμα (δερματική χρήση).


Οδηγίες χρήσης:

1. Ανοίξτε τον φακελίσκο στην εγκοπή και αφαιρέστε το φαρμακούχο έμπλαστρο.




Για να εφαρμόσετε το έμπλαστρο:

2. Αφαιρέστε ένα από τα δύο προστατευτικά φιλμ.



3. Εφαρμόστε στην πάσχουσα περιοχή και αφαιρέστε το υπόλοιπο προστατευτικό φιλμ.



4. Εφαρμόστε ελαφριά πίεση με την παλάμη του χεριού σας μέχρι να προσκολληθεί πλήρως στο δέρμα.



Για να αφαιρέσετε το έμπλαστρο:

5. Υγράνετε το έμπλαστρο με νερό, τραβήξτε την άκρη του εμπλάστρου και ξεκολλήστε το από το δέρμα.

6. Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος, πλύνετε με νερό την προσβεβλημένη περιοχή τρίβοντας με ήπιες, κυκλικές κινήσεις την περιοχή με τα δάκτυλά σας.

Εάν είναι απαραίτητο, το φαρμακούχο έμπλαστρο μπορεί να σταθεροποιηθεί με έναν δικτυωτό επίδεσμο.

Χρησιμοποιήστε το φαρμακούχο έμπλαστρο μόνο σε άθικτο, υγιές δέρμα.

Μη χρησιμοποιείτε το φαρμακούχο έμπλαστρο μαζί με αεροστεγή (αποφρακτικό) επίδεσμο. Μην το φοράτε όταν κάνετε μπάνιο ή ντους.

Δεν θα πρέπει να κόψετε το έμπλαστρο σε κομμάτια.

Διάρκεια χρήσης

Μη χρησιμοποιείτε το VOLTADOL 24-HOURS για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών.

Εάν για την ανακούφιση του πόνου το φάρμακο αυτό χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 7 ημέρες ή εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν, πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση VOLTADOL 24-HOURS από την κανονική

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν εμφανιστούν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τη λανθασμένη χρήση αυτού του φαρμάκου ή την ακούσια υπερδοσολογία (π.χ. σε παιδιά). Εκείνος θα μπορέσει να σας συμβουλευτεί για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνετε.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας και σταματήστε να χρησιμοποιείτε το έμπλαστρο εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

αιφνίδιο κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση), οίδημα των χεριών, των ποδιών, των αστραγάλων, του προσώπου, των χειλιών, του στόματος ή του φάρυγγα, δυσκολία κατά την αναπνοή, μείωση της αρτηριακής πίεσης ή αδυναμία.

Μπορεί να εμφανίσετε τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα):

τοπικές δερματικές αντιδράσεις, όπως δερματική ερυθρότητα, αίσθημα καύσου, κνησμός, φλεγμονώδης δερματική ερυθρότητα, δερματικό εξάνθημα, ορισμένες φορές με φλύκταινες ή πομφούς.

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10.000 άτομα):

αντιδράσεις υπερευαισθησίας ή τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις (δερματίτιδα εξ επαφής).

Σε ασθενείς που κάνουν εξωτερική χρήση φαρμάκων που ανήκουν στην ίδια φαρμακευτική κατηγορία με τη δικλοφαινάκη, έχουν υπάρξει μεμονωμένες αναφορές γενικευμένου δερματικού εξανθήματος, αντιδράσεων υπερευαισθησίας, όπως είναι το οίδημα του δέρματος και των βλεννογόνων μεμβρανών, αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεων με οξείες διαταραχές της ρύθμισης της κυκλοφορίας, και αντιδράσεων ευαισθησίας στο φως.

Η απορρόφηση της δικλοφαινάκης στο σώμα από το δέρμα είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά με τη συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο αίμα μετά από την από του στόματος χρήση της δικλοφαινάκης. Επομένως, η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών στο σώμα συνολικά (όπως είναι οι γαστρεντερικές, ή οι νεφρικές διαταραχές ή η δυσκολία στην αναπνοή) είναι πολύ χαμηλή.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
<http://www.kittrlinikarta.gr>

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το VOLTADOL 24-HOURS

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο εξωτερικό κουτί και στον φακελίσκο μετά την ένδειξη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τη φύλαξή του. Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.

Μη χρησιμοποιήσετε το VOLTADOL 24-HOURS, εάν παρατηρήσετε ότι έχει καταστραφεί.

Τα χρησιμοποιημένα έμπλαστρα θα πρέπει να διπλώνονται στη μέση με την αυτοκόλλητη πλευρά προς τα μέσα.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το VOLTADOL 24-HOURS

- Η δραστική ουσία είναι η νατριούχος δικλοφαινάκη.
Κάθε φαρμακούχο έμπλαστρο περιέχει 140 mg νατριούχου δικλοφαινάκης.
- Τα άλλα συστατικά είναι:
Υποστηρικτικό στρώμα:
Μη πλεγμένο ύφασμα από πολυεστέρα

Αυτοκόλλητο στρώμα:
Πολυακρυλική διασπορά
Κιτρικός τριβουτυλεστέρας
Βουτυλυδροξυανισόλη

Προστατευτικό στρώμα:
Χαρτί επενδεδυμένο με μονό φύλλο σιλικόνης

Εμφάνιση του VOLTADOL 24-HOURS και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το VOLTADOL 24-HOURS είναι ένα λευκό αυτοκόλλητο φαρμακούχο έμπλαστρο μεγέθους 10×14 cm που φτιάχνεται από μη πλεγμένο ύφασμα στη μία πλευρά και από χαρτί στην άλλη πλευρά. Μόλις αφαιρεθεί το προστατευτικό στρώμα, η αυτοκόλλητη μεμβράνη είναι ημιδιαφανής φωτεινή.

Το VOLTADOL 24-HOURS είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 2, 5, 7 και 10 φαρμακούχων εμπλάστρων, ένα σε κάθε φακελίσκο.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστές

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Haleon Romania S.R.L.
Strada Costache Negri, Nr. 1-5,
Opera Center One (Zona 2), Etajul 6, Sector 5,
Bucuresti, 050552,
Ρουμανία

Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

Haleon Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο Haleon Ελλάς,
Λεωφόρος Κηφισίας 11,

151 23 Μαρούσι Αττικής,
Ελλάδα,
Τηλ.: 2102217200

Παρασκευαστές:

Fidia farmaceutici S.p.A.,
Via Ampere 29,
20037 Paderno Dugnano (MI)
Ιταλία

Haleon Germany GmbH,
Barthstraße 4,
80339 München,
Γερμανία

Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία:	Voltadol 24 Stunden Schmerzpfaster 140 mg wirkstoffhaltiges Pflaster
Βέλγιο:	Voltaren Patch Once Daily, 140 mg pleister emplâtre médicamenteux / Wirkstoffhaltiges Pflaster.
Βουλγαρία:	Волтарен 140 mg лечебен пластир.
Γαλλία:	Voltarenactigo 140 mg, emplâtre médicamenteux.
Γερμανία:	Voltaren 24 Stunden Schmerzpfaster 140 mg wirkstoffhaltiges Pflaster.
Ελλάδα:	VOLTADOL 24-HOURS.
Εσθονία:	Voltanum.
Ισπανία:	Voltadol 140 mg apósito adhesivo medicamentoso.
Ιταλία:	Voltadol Unidie 140 mg cerotto medicato.
Λετονία:	Voltanum 140 mg ārstnieciskais plāksteris.
Λιθουανία:	Voltinex 140 mg vaistinis pleistras.
Λουξεμβούργο:	Voltaren Patch Once Daily, 140 mg emplâtre médicamenteux / Wirkstoffhaltiges Pflaster.
Ολλανδία:	Voltaren Pleister 140 mg.
Ουγγαρία:	Voltaren 140 mg gyógyszeres tapasz.
Πολωνία:	Voltaren Forte.
Πορτογαλία:	Voltaren 24h, 140 mg, emplastro medicamentoso.
Ρουμανία:	Voltaren 140 mg emplastru medicamentos.
Σλοβακία:	Voltaren 1x denne 140 mg liečivá náplastʹ.
Τσεχία:	Voltaren 1x denně.

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Απρίλιο 2025.