



IMPORTANT: PLEASE READ

PART III: CONSUMER INFORMATION
ADVIL® DAY/NIGHT CONVENIENCE PACK**Advil Liqui-Gels**
Ibuprofen Capsules
(as free acid and potassium salt)**Advil Nighttime**

Ibuprofen and Diphenhydramine Hydrochloride Capsules
This leaflet is part of a three-part "Product Monograph" published when **Advil Day/Night Convenience Pack** was approved for sale in Canada and is designed specifically for Consumers. This leaflet is a summary and will not tell you everything about **Advil Day/Night Convenience Pack**. Talk to your doctor or pharmacist. If you have any questions about the drug.

ABOUT THIS MEDICATION**Advil Liqui-Gels (Daytime)**

Temporary relief of mild to moderate migraine headaches including associated symptoms of nausea, and sensitivity to light and sound.
Fast and effective temporary relief of muscle aches and pain, joint and body pain, backache, muscle sprains and strains, pain of inflammation associated with conditions including arthritis and physical or athletic overexertion (e.g. sprains or strains), headache including tension headache, dental pain and menstrual pain.

Advil Nighttime

For fast and effective temporary relief of occasional mild to moderate nighttime pain and accompanying sleeplessness, due to minor aches and pains associated with joints, muscles, backache, headache and toothache as well as pain of migraine and arthritis. For longer sleep, uninterupted by temporary pain.

Pain relief from **Ibuprofen** helps to ease sleeplessness. It is not the case, do not use.

What it does:

Contains **Ibuprofen** (a pain reliever for short term use), **Advil Nighttime** contains one extra ingredient, **diphenhydramine hydrochloride** (a sleep-aid for sleeplessness). Pain relief from **Ibuprofen** helps to ease sleeplessness. It is not the case, do not use.

When it should not be used:

Do not use if you have any:

• Allergic hypersensitivity to **Ibuprofen** or other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), acetylsalicylic acid (ASA) or other salicylates, diphenhydramine or to any ingredient in the formulation or component of the container, or any of **Advil Nighttime** ingredients. (Refer to the nonmedicinal ingredients on other carton or composition sheet) and/or peptic ulcer or recurrent stomach ulcer, gastrointestinal (GI) bleeding or active inflammatory bowel disease (e.g. Crohn's, colitis).

• Heart problems (swelling of the ankle of the nose), or allergic manifestations such as asthma, angioedema (swelling severe life threatening allergic reaction), urticaria/hives, rhinitis (stuffed or runny nose that may be due to allergies), skin rash or other allergic symptoms.

• Taking ASA, acetaminophen, or other NSAIDs, such as naproxen or other **Ibuprofen** product, celecoxib (significant fluid loss) due to vomiting, diarrhea or lack of fluid intake.
• Heart problems, such as high blood pressure or severe coronary artery disease.
• High blood pressure or heart surgery.
• Severe liver or kidney disease, high potassium in the blood.
• Systemic Lupus Erythematosus, 4th year third trimester of pregnancy.
Do not use **Advil Nighttime** if you have any:
• Pain that does not keep you from sleeping.
• Sleeplessness that are not in pain.
• Taking anticholinergics and/or diphenhydramine containing products (e.g. for cough & cold, sleep aids, etc.), monoamine oxidase inhibitors (MAOIs).

What the medicinal ingredients are:

Advil Liqui-Gels: **Ibuprofen** (present as free acid and potassium salt)

Advil Nighttime: **Ibuprofen** (present as free acid and potassium salt) and diphenhydramine hydrochloride.

What the nonmedicinal ingredients are:

Advil Liqui-Gels: FD&C green no. 3, gelatin, lecithin (soy), medium chain triglycerides, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, potassium hydroxide, purified water, sorbitan, sorbitol.

Advil Nighttime: Coconut oil, D&C red no. 33, FD&C blue no. 1, gelatin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, potassium hydroxide, purified water, sorbitan, and sorbitol.

What dosage forms it comes in:

Advil Liqui-Gels: Each liquid filled capsule contains **Ibuprofen** 200 mg (present as free acid and potassium salt).

Advil Nighttime: Each Liqui-Gel (gelatin capsule) contains **Ibuprofen** 200 mg (as free acid and potassium salt) and diphenhydramine hydrochloride 25 mg.

WARNINGS AND PRECAUTIONS**Serious Warnings and Precautions**

• Caution in patients prone to gastrointestinal tract irritation, including those with a history of peptic ulcers. The chance of stomach bleeding is higher if you are age 60 or older, have had stomach ulcers or bleeding problems, take a blood thinner or steroid drug, take with other drugs containing an NSAID (ASA, **Ibuprofen**, naproxen, or prescription anti-inflammatory drugs), have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product, • Patients at risk of kidney problems, including the elderly or those using diuretics. • Use during pregnancy or nursing should be avoided. • Stop use immediately if you have difficulty or pain when urinating. • **Advil Nighttime** causes sedation or sleepiness. Not for daytime use.

BEFORE use, talk to your doctor or pharmacist if you have/are:

• previous or current stomach ulcers, diabetes, thyroid disease, mild to moderate kidney disease, mild to moderate liver disease, heart disease, glaucoma, breathing problems or chronic lung disease (such as asthma, emphysema or chronic bronchitis), blood clotting disorder (such as hemophilia), difficulty in urination due to prostate enlargement or bladder neck obstruction, any other serious condition, are taking any other prescription or over-the-counter drug, including any other anti-inflammatory medication. • Autoimmune disease (e.g. lupus). • High blood pressure. • Over 65 years of age. • You are trying to conceive, in your first or second trimester of pregnancy or if you are breastfeeding. • Sleeplessness due to mild to moderate pain persists continually for more than 5 days.

Insomnia may be a symptom of a serious underlying medical condition other than pain. While taking **Advil Nighttime**, do not drive motor vehicle or operate machinery.

Use with caution in the elderly**Long-term continuous use may increase the risk of heart attack or stroke.****Stop use and ask a doctor if:**

• you show signs of stomach bleeding (stomach worsens or leads more than 5 days) • liver worsens or lasts more than 3 days • any new symptoms appear

INTERACTIONS WITH THIS MEDICATION**Do not use Advil Liqui-Gels or Advil Nighttime if you are taking:**

• Daily low dose ASA (81 – 325 mg), without talking to a doctor or pharmacist. **Ibuprofen** may interfere with the preventive benefits of ASA.

Drugs that may interact with Advil Liqui-Gels or Advil Nighttime include:

Acetaminophen, anticoagulants (blood thinners), apomorphine, alcohol, diphenhydramine, antidiabetic agents (oral and insulin), diuretics, methotrexate, lithium, probenecid, thyroxine, antiepileptics (e.g. clobazepam), phenytoin, corticosteroids, benzodiazepines, blood pressure medications, depression medications, monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), anticholinergics (such as allergy medications), tranquilizers, alcohol or other sedating drugs, NSAIDs (including naproxen and **Ibuprofen**), sleep-aids, cold medications

Tell your doctor or pharmacist what prescription drugs you are taking or plan to take.

PROPER USE OF THIS MEDICATION**Usual dose:**

Adults and children 16 to 65 years of age: **Advil Liqui-Gels (Daytime):** Take 1 green Liqui-Gel every 4 hours or 2 green Liqui-Gels every 8 hours at the first sign of symptoms as needed. **Advil Nighttime:** Take 1 or 2 blue Liqui-Gels at night, 4-6 hours after the last daytime **Ibuprofen** or diphenhydramine dose. Do not take more than 5 consecutive capsules unless directed by a doctor. Do not exceed a combined total of any 6 **Advil Liqui-Gels** or **Advil Nighttime Liqui-Gels** in 24 hours, unless directed by a doctor. Do not give to children under 16 unless directed by a doctor. Do not use longer than 3 days for a fever or 5 days for pain or cold symptoms.

Overdose:

In case of accidental overdose: stop use and contact a Poison Control Centre, doctor, healthcare practitioner, hospital emergency department immediately, even if there are no symptoms.

Missed Dose:

Take the missed dose as soon as you remember, if it is almost time for your next dose, wait until then to take your medicine and skip the missed dose. Do not take twice the recommended dose after a missed dose.

SIDE EFFECTS AND WHAT TO DO ABOUT THEM**Take with food or milk if upset stomach occurs.**

If abdominal pain, heartburn, nausea or vomiting, bloating, diarrhea or constipation, ringing or buzzing in the ears, nervousness, sleeplessness, dizziness, any change in vision, fluid retention, shortness of breath, wheezing, any trouble breathing or chest tightness, hives, swelling or itching, skin rashes, skin redness, blisters, blood in vomit, bloody or black stools, jaundice (yellowing of the eyes or skin due to liver problem), or any other side effect or unexplained symptoms develop while taking **Advil Nighttime** discontinue use immediately and contact a physician. Consult your physician if the symptoms of pain or sleeplessness persist for more than 5 days.

Side effects may be minimized by using the smallest dose for the shortest duration of time.

SERIOUS SIDE EFFECTS, HOW OFTEN THEY HAPPEN AND WHAT TO DO ABOUT THEM

STOP USE and consult your doctor immediately if you experience: abdominal pain, allergic reaction (itching, blisters, rashes, skin redness, etc.), any change in vision, blood in vomit, bloody or black stools, bladder pain, hallucinations, or difficulty swallowing.

This is not a complete list of side effects. For any unexpected effects while taking **Advil Liqui-Gels** or **Advil Nighttime**, contact your doctor or pharmacist.

REPORTING SUSPECTED SIDE EFFECTS

You can report any suspected adverse reactions associated with the use of health products to the Canada Vigilance Program by one of the following 3 ways:

- Report online at www.healthcanada.gc.ca/medeffect
- Call toll free at 1-866-234-2345
- Complete a Canada Vigilance Reporting Form and:
 - Fax toll free to 1-866-678-6788; or
 - Mail to: Canada Vigilance Program, Health Canada, Postal Locator 071E, Ottawa, ON K1A 0K9

Postage paid labels, Canada Vigilance Reporting Form and the adverse reaction reporting guidelines are available on the MedEffect™ Canada Web site at www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

NOTE: Should you require information related to the management of side effects, contact your health professional. The Canada Vigilance Program does not provide medical advice.

HOW TO STORE IT

Store at room temperature (15°–30°C). Keep out of reach of children. This package contains enough medicine to seriously harm a child.

MORE INFORMATION

This document plus the full product monograph, prepared for health professionals can be found by contacting the sponsor, **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC**, Mississauga, ON, L4R 4B2, at 1-888-275-3938 or www.advil.ca. This leaflet was prepared by **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC**. Product monograph available to doctors and pharmacists upon request. Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. ©2021 GSK group of companies or its licensees. Last revised: November 4, 2020

**IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT****PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR
DUO PRATIQUE ADVIL® JOUR/NUIT****Advil Liqui-Gels
Capsules d'ibuprofène
(sous forme d'acide libre et de sel de potassium)****Advil Nuit****Capsules d'ibuprofène et de chlorhydrate de diphenhydramine**

Le présent document contribue à l'évaluation et à la surveillance de la « monographie de produit » publiée par suite de l'homologation de ce produit **Advil Jour/Nuit** sur le territoire du Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent document n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit **Advil Jour/Nuit**. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Advil Liqui-Gels (jour) : Pour le soulagement temporaire des migraines légères ou modérées et des symptômes qui y sont associés tels que les nausées et la sensibilité à la lumière et au bruit.

Pour le soulagement rapide, efficace et temporaire des courbatures et douleurs musculaires, des douleurs corporelles et articulaires, des maux de dos, des entorses et foulures, des douleurs inflammatoires associées à des troubles cornéens (arthritis) et le surmenage physique ou athlétique (entorses et foulures), des maux de tête, y compris les maux de tête de tension, des maux de dents et des crampes menstruelles.

Advil Nuit : Pour le soulagement rapide, efficace et temporaire de la douleur occasionnelle légère ou modérée ressentie pendant la nuit et de l'insomnie qui en découle, lorsqu'elle n'est attribuée aux douleurs et/ou courbatures dans les articulations et les muscles, aux maux de dos, aux maux de tête, aux maux de dents, à la migraine et à l'arthrite.

Pour augmenter la durée du sommeil sans interruption causée par une douleur temporaire.

À utiliser **seulement** dans les cas de douleur temporaire légère ou modérée causant de l'insomnie. Ne pas utiliser ce médicament souvent d'autres circonstances.

Les effets de ce médicament :

Contient de l'ibuprofène (médicament servant à soulager la douleur) et utilisant pendant une courte durée, Advil Nuit contient un médicament sédatif, le chlorhydrate de diphenhydramine (un aide-sommeil pour soulager l'insomnie).

L'ibuprofène contribue à soulager la douleur et aide à s'endormir et la diphenhydramine aide à rester endormi.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Vous ne devez pas prendre ce médicament si :

- vous souffrez d'hypertension ou êtes allergique à l'ibuprofène ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), à l'acide acétylsalicylique (ASA) ou à d'autres salicylates, à la diphenhydramine, à l'un ou l'autre des ingrédients d'Advil Nuit ou aux composants du contenant (voir la section des ingrédients non médicamenteux de la boîte ou la section sur la composition);
- vous avez un ulcère gastro-intestinal, ou des ulcères d'estomac récurrents, des saignements gastro-intestinaux ou une maladie hépatobiliaire (incluant la « maladie de Crohn, colite »);
- vous avez des problèmes nasaux (enflure de l'intérieur du nez) ou une manifestation allergique comme l'asthme, l'angioedème (réaction allergique soudaine, grave et pouvant être mortelle), l'urticaire, la rhinite (gonflement nasal) ou écoulement nasal pouvant être causés par des allergies);
- des éruptions cutanées ou d'autres symptômes d'allergie; vous prenez de l'ASA, de l'acétaminophène, l'acide ASA (p. ex., le naproxène) ou d'autres produits contenant de l'ibuprofène; vous souffrez de dysfonctionnement (importante perte de fluxes) causés par des vomissements, de la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquide; vous avez des problèmes cardiaques, comme l'hypertension ou une maladie coronarienne sévère; vous êtes sur le point de subir ou avez récemment subi une chirurgie cardiaque; vous souffrez d'une maladie grave du foie ou des reins;
- vous avez un taux élevé de potassium dans le sang;
- vous avez le lupus érythémateux disséminé; vous êtes au troisième trimestre de votre grossesse.

Vous ne devez pas prendre Advil Nuit si :

- vous avez une douleur qui ne vous amène pas de sommeil;
- vous faites de l'insomnie en l'absence de douleur;
- vous prenez des produits contenant des antihistaminiques ou de la diphenhydramine (p. ex., produits contre la toux et le rhume, aide-sommeil) ou des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO).

Les ingrédients médicamenteux :

Advil Liqui-Gels : Ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium)

Advil Nuit : Ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium) et chlorhydrate de diphenhydramine

Les ingrédients non médicamenteux :

Advil Liqui-Gels : « voir l'1 FDC », gelatine, licitidine (sucre), triglycérides à chaîne moyenne, encre pharmaceutique, polyéthylène glycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée, sorbitane, sorbitol

Advil Nuit : « voir le 2 FDC », gelatine, licitidine (sucre), triglycérides à chaîne moyenne, encre pharmaceutique, polyéthylène glycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée, sorbitane, sorbitol

La présentation :

Advil Liqui-Gels : Une capsule remplie de liquide contenant 200 mg d'ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium).

Advil Nuit : Un Liqui-Gel (capsule de gelatine) contenant 200 mg d'ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium) et 25 mg de chlorhydrate de diphenhydramine.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**Mises en garde et précautions importantes**

« La prudence est de mise chez les patients qui sont sujets aux irritations de l'estomac ou des intestins, y compris ceux qui ont des antécédents d'ulcères gastro-intestinaux. Le risque de saignement dans l'estomac est plus élevé chez les personnes de 60 ans et plus, celles qui ont déjà eu des ulcères d'estomac ou des troubles hémorragiques, celles qui prennent un anticoagulant, des corticostéroïdes, des médicaments qui contiennent un AINS comme l'ASA, l'ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires sur ordonnance, et celles qui consomment 3 verres d'alcool ou plus par jour en même temps que ce produit. »

« La prudence est de mise chez les patients qui risquent de souffrir de troubles rénaux, y compris les personnes âgées et celles prenant des diurétiques. »

« Évitez d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitée. »

« Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si vous avez de la difficulté à uriner ou ressentez de la douleur lorsque vous urinez. »

« Advil Nuit cause de la sédation ou de la somnolence. Ne pas utiliser ce produit pendant la conduite. »

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser ce produit si :

vous avez ou avez déjà eu un ulcère de l'estomac; êtes atteint de diabète; êtes atteint d'un trouble thyroïdien; avez une maladie des reins légère ou modérée; avez une maladie du foie légère ou modérée; avez une maladie cardiaque; avez un glaucome; avez des troubles respiratoires ou une maladie pulmonaire chronique (comme l'asthme, l'emphysème ou la bronchite chronique); avez des troubles de la coagulation (comme l'hémophilie); avez de la difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate, d'une obstruction du col vésical ou de toute autre maladie grave; prenez d'autres médicaments d'ordonnance ou en vente libre, y compris d'autres anti-inflammatoires;

vous avez une maladie auto-immune (comme le lupus);

vous faites de l'hypertension;

vous avez plus de 65 ans; vous faites de la grossesse ou êtes enceinte; êtes à votre premier ou deuxième trimestre de grossesse ou allaitée;

vous faites de l'insomnie en raison d'une douleur légère ou modérée qui persiste pendant plus de cinq jours;

l'insomnie peut-être un symptôme d'un problème de santé sous-jacent autre que la douleur.

Évitez de conduire un véhicule ou d'être aux commandes d'une machine lorsque vous prenez Advil Nuit.

Faire preuve de prudence chez les personnes âgées.

L'emploi prolongé continu peut accroître le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

Cessez d'utiliser ce médicament et consultez un médecin si :

vous observez des signes de saignement dans l'estomac; « la douleur s'aggrave ou persiste pendant plus de 5 jours; »

« la douleur s'aggrave ou persiste pendant plus de 5 jours; »

« vous observez des symptômes non désirés. »

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

N'utilisez pas Advil Liqui-Gels ni Advil Nuit si vous prenez :

« une dose faible d'ASA (81-325 mg) chaque jour, sans consulter un médecin ou un pharmacien, car l'ibuprofène peut compromettre les bénéfices prévus de l'ASA. »

Produits (ou substances) qui peuvent interagir avec Advil Liqui-Gels et Advil Nuit :

l'acétaminophène, les anticoagulants, l'apomorphine, l'alcool, la digoxine, les antidépresseurs (tricycliques et tétracycliques), les diurétiques, le méthotrexate, le lithium, le probénécide, la thyroïde, les antidiabétiques (p. ex., la cyclosporine), la phénylalanine, les corticostéroïdes, les benzodiazépines, les médicaments contre l'hypertension, les médicaments contre la dépression, les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), les antihistaminiques (comme les médicaments contre les allergies), les tranquillisants, l'alcool ou autres sédatifs, les AINS (y compris le naproxène et l'ibuprofène), les antidépresseurs, les médicaments contre le rhume.

Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, des médicaments ou à votre pharmacien.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT**Posologie habituelle :**

Adultes et enfants de 16 à 65 ans : **Advil Liqui-Gels (jour) :** Prendre 1 Liqui-Gel vert toutes les 4 heures ou 2 Liqui-Gels verts toutes les 6 à 8 heures dès l'apparition des premiers symptômes, au besoin **Advil Nuit**. Prendre 1 ou 2 Liqui-Gels bleus le soir de 4 à 6 heures après la dernière dose de jour d'ibuprofène ou de diphenhydramine. Ne pas utiliser ce produit pendant plus de 5 jours consécutifs.

Ne pas utiliser ce produit pendant plus de 5 jours consécutifs.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 16 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

Ne pas utiliser plus de 2 doses par le jour ou plus de 5 doses par la nuit et les symptômes du rhume.

Surdose :

En cas de surdose accidentelle, cessez d'utiliser ce produit et appelez immédiatement un centre antipoison, un médecin, un professionnel de la santé ou le service des urgences à un hôpital, même en l'absence de symptômes.

Doce oubliée :

Prenez la dose oubliée dès que vous y pensez. Si l'heure de votre prochaine dose approche, attendez jusqu'à ce moment pour prendre votre médicament et ne prenez pas la dose que vous avez oubliée. Si vous oubliez de prendre une dose, ne doublez pas la dose recommandée.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Prenez avec de la nourriture ou du lait en cas de maux d'estomac.

Si des effets secondaires, de réaction allergique (démangeaisons, cloques, éruptions cutanées, rougeurs, etc.), de tout changement de la vessie, de sang dans les vomissements, de selles noires ou contenant du sang, de douleurs à la vessie, d'hématuries ou de difficultés à uriner.

Consultez votre médecin si la douleur ou l'insomnie persistent pendant plus de 5 jours.

On peut diminuer le risque d'effets secondaires en prenant la dose la plus faible pendant la plus courte période de temps possible.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES - FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE**À PRENDRE**

CESSEZ D'UTILISER ce produit et consultez immédiatement votre médecin en cas de douleurs abdominales, de réaction allergique (démangeaisons, cloques, éruptions cutanées, rougeurs, etc.), de tout changement de la vessie, de sang dans les vomissements, de selles noires ou contenant du sang, de douleurs à la vessie, d'hématuries ou de difficultés à uriner.

Cette liste d'effets indésirables n'est pas complète. Pour tout effet indésirable, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes :

• En ligne sur www.santecanada.gc.ca/medinfo

• Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345

• En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :

– par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6788, ou

– par la poste à :

Programme Canada Vigilance, Santé Canada, Indus postal 0701E, Ottawa (Ontario) K1A 0N9

Les étiquettes d'affiliations, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffect[®] Canada à www.santecanada.gc.ca/medinfo

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conserver à la température ambiante (15-30 °C).

Garder hors de portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour être administré à un enfant.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit, disponible pour les professionnels de la santé, en communiquant avec le promoteur, **GlaxoSmithKline** Soins de santé aux consommateurs SRI, Mississauga, ON L5R 4G2, au 1-866-275-8626 ou à l'adresse www.advil.ca.

GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI a rédigé ce document. Monographie offerte sur demande aux médecins et aux pharmaciens.

Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.

©2020 Groupe de sociétés GSK ou son coauteur de licence.

Dernière édition : 4 novembre 2020



IMPORTANT: PLEASE READ

PART III: CONSUMER INFORMATION
ADVIL® DAY/NIGHT CONVENIENCE PACK**Advil Liqui-Gels**
Ibuprofen Capsules
(as free acid and potassium salt)**Advil Nighttime**

Ibuprofen and Diphenhydramine Hydrochloride Capsules
This leaflet is part of a three-part "Product Monograph" published when **Advil Day/Night Convenience Pack** was approved for sale in Canada and is designed specifically for Consumers. This leaflet is a summary and will not tell you everything about **Advil Day/Night Convenience Pack**. Talk to your doctor or pharmacist. If you have any questions about the drug.

ABOUT THIS MEDICATION**Advil Liqui-Gels (Daytime)**

Temporary relief of mild to moderate migraine headaches including associated symptoms of nausea, and sensitivity to light and sound.
Fast and effective temporary relief of muscle aches and pain, joint and body pain, backache, muscle sprains and strains, pain of inflammation associated with conditions including arthritis and physical or athletic overexertion (e.g. sprains or strains), headache including tension headache, dental pain and menstrual pain.

Advil Nighttime

For fast and effective temporary relief of occasional mild to moderate nighttime pain and accompanying sleeplessness, due to minor aches and pains associated with joints, muscles, backache, headache and toothache as well as pain of migraine and arthritis. For longer sleep, uninterupted by temporary pain.

Pain relief from **Ibuprofen** helps to ease sleeplessness. It is not the case, do not use.

What it does:

Contains **Ibuprofen** (a pain reliever for short term use), **Advil Nighttime** contains one extra ingredient, **diphenhydramine hydrochloride** (a sleep-aid for sleeplessness). Pain relief from **Ibuprofen** helps to ease sleeplessness. It is not the case, do not use.

When it should not be used:

Do not use if you have any:

• Allergic/hypersensitive to **Ibuprofen** or other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), acetylsalicylic acid (ASA) or other salicylates, diphenhydramine or to any ingredient in the formulation or component of the container, or any of **Advil Nighttime** ingredients. (Refer to the nonmedicinal ingredients on other carton or composition booklet) • recent peptic ulcer or recurrent stomach ulcer, gastroenteritis (all bleeding or active inflammatory bowel disease (e.g. Crohn's, colitis).

• Heart problems (swelling of the ankle of the nose), or allergic manifestations such as asthma, angioedema (swelling severe life threatening allergic reaction), urticaria/hives, rhinitis (stuffed or runny nose that may be due to allergies), skin rash or other allergic symptoms.

• Taking ASA, acetaminophen, or other NSAIDs, such as naproxen or other **Ibuprofen** product, celecoxib (significant fluid loss) due to vomiting, diarrhea or lack of fluid intake • Heart problems, such as high blood pressure or severe coronary artery disease, • High blood pressure or heart surgery, • recent liver or kidney disease, high potassium in the blood, • Systemic Lupus Erythematosus, • In your third trimester of pregnancy Do not use **Advil Nighttime** if you have any: • Pain that does not keep you from sleeping • Sleeplessness that are not in pain • Taking anticholinergics and/or diuretics containing products (e.g. for cough & cold, sleep aids, etc.), monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)

What the medicinal ingredients are:

Advil Liqui-Gels: **Ibuprofen** (present as free acid and potassium salt)

Advil Nighttime: **Ibuprofen** (present as free acid and potassium salt) and diphenhydramine hydrochloride.

What the nonmedicinal ingredients are:

Advil Liqui-Gels: FD&C green no. 3, gelatin, lecithin (soy), medium chain triglycerides, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, potassium hydroxide, purified water, sorbitan, sorbitol.

Advil Nighttime: Coconut oil, D&C red no. 33, FD&C blue no. 1, gelatin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, potassium hydroxide, purified water, sorbitan, and sorbitol.

What dosage forms it comes in:

Advil Liqui-Gels: Each liquid filled capsule contains **Ibuprofen** 200 mg (present as free acid and potassium salt).

Advil Nighttime: Each Liqui-Gel (gelatin capsule) contains **Ibuprofen** 200 mg (as free acid and potassium salt) and diphenhydramine hydrochloride 25 mg.

WARNINGS AND PRECAUTIONS**Serious Warnings and Precautions**

• Caution in patients prone to gastrointestinal tract irritation, including those with a history of peptic ulcers. The chance of stomach bleeding is higher if you are age 60 or older, have had stomach ulcers or bleeding problems, take a blood thinner or steroid drug, take with other drugs containing an NSAID (ASA, **Ibuprofen**, naproxen, or prescription anti-inflammatory drugs), have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product, • Patients at risk of kidney problems, including the elderly or those using diuretics. • Use during pregnancy or nursing should be avoided. • Stop use immediately if you have difficulty or pain when urinating. • **Advil Nighttime** causes sedation or sleepiness. Not for daytime use.

BEFORE use, talk to your doctor or pharmacist if you have/are:

• previous or current stomach ulcers, diabetes, thyroid disease, mild to moderate kidney disease, mild to moderate liver disease, heart disease, glaucoma, breathing problems or chronic lung disease (such as asthma, emphysema or chronic bronchitis), blood clotting disorder (such as hemophilia), difficulty in urination due to prostate enlargement or bladder neck obstruction, any other serious condition, are taking any other prescription or over-the-counter drug, including any other anti-inflammatory medication • Autoimmune disease (e.g. lupus) • High blood pressure • Over 65 years of age • You are trying to conceive, in your first or second trimester of pregnancy or if you are breastfeeding • Sleeplessness due to mild to moderate pain persists continually for more than 5 days.

Insomnia may be a symptom of a serious underlying medical condition other than pain. While taking **Advil Nighttime**, do not drive motor vehicle or operate machinery.

Use with caution in the elderly

Long-term continuous use may increase the risk of heart attack or stroke.

Stop use and ask a doctor if:

• you show signs of stomach bleeding • pain worsens or lasts more than 5 days • fever worsens or lasts more than 3 days • any new symptoms appear

INTERACTIONS WITH THIS MEDICATION**Do not use Advil Liqui-Gels or Advil Nighttime if you are taking:**

• Daily low dose ASA (81 – 325 mg), without talking to a doctor or pharmacist. **Ibuprofen** may interfere with the preventive benefits of ASA.

Drugs that may interact with Advil Liqui-Gels or Advil Nighttime include:

Acetaminophen, anticoagulants (blood thinners), apomorphine, alcohol, diphenhydramine, antidiabetic agents (oral and insulin), diuretics, methotrexate, lithium, probenecid, thyroxine, antibiotics (e.g. cyclosporine), phenytoin, corticosteroids, benzodiazepines, blood pressure medications, depression medications, monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), anticholinergics (such as allergy medications), tranquilizers, alcohol or other sedating drugs, NSAIDs (including naproxen and **Ibuprofen**), sleep-aids, cold medications

Tell your doctor or pharmacist what prescription drugs you are taking or plan to take.

PROPER USE OF THIS MEDICATION**Usual dose:**

Adults and children 16 to 65 years of age: **Advil Liqui-Gels (Daytime):** Take 1 green Liqui-Gel every 4 hours or 2 green Liqui-Gels every 8 hours at the first sign of symptoms as needed. **Advil Nighttime:** Take 1 or 2 blue Liqui-Gels at night, 4-6 hours after the last daytime **Ibuprofen** or diphenhydramine dose. Do not take more than 5 consecutive capsules unless directed by a doctor. Do not exceed a combined total of any 6 **Advil Liqui-Gels** or **Advil Nighttime Liqui-Gels** in 24 hours, unless directed by a doctor. Do not give to children under 16 unless directed by a doctor. Do not use longer than 3 days for a fever or 5 days for pain or cold symptoms.

Overdose:

In case of accidental overdose: stop use and contact a Poison Control Centre, doctor, healthcare practitioner, hospital emergency department immediately, even if there are no symptoms.

Missed Dose:

Take the missed dose as soon as you remember, if it is almost time for your next dose, wait until then to take your medicine and skip the missed dose. Do not take twice the recommended dose after a missed dose.

SIDE EFFECTS AND WHAT TO DO ABOUT THEM

Take with food or milk if upset stomach occurs.

If abdominal pain, heartburn, nausea or vomiting, bloating, diarrhea or constipation, ringing or buzzing in the ears, nervousness, sleeplessness, dizziness, any change in vision, fluid retention, shortness of breath, wheezing, any trouble breathing or chest tightness, hives, swelling or itching, skin rashes, skin redness, blisters, blood in vomit, bloody or black stools, jaundice (yellowing of the eyes or skin due to liver problem), or any other side effect or unexplained symptoms develop while taking **Advil Nighttime** discontinue use immediately and contact a physician. Consult your physician if the symptoms of pain or sleeplessness persist for more than 5 days.

Side effects may be minimized by using the smallest dose for the shortest duration of time.

SERIOUS SIDE EFFECTS, HOW OFTEN THEY HAPPEN AND WHAT TO DO ABOUT THEM

STOP USE and consult your doctor immediately if you experience: abdominal pain, allergic reaction (itching, blisters, rashes, skin redness, etc.), any change in vision, blood in vomit, bloody or black stools, bladder pain, hallucinations, or difficulty swallowing.

This is not a complete list of side effects. For any unexpected effects while taking **Advil Liqui-Gels** or **Advil Nighttime**, contact your doctor or pharmacist.

REPORTING SUSPECTED SIDE EFFECTS

You can report any suspected adverse reactions associated with the use of health products to the Canada Vigilance Program by one of the following 3 ways:

- Report online at www.healthcanada.gc.ca/medeffect/
- Call toll free at 1-866-234-2345
- Complete a Canada Vigilance Reporting Form and:
 - Fax toll free to 1-866-678-6788; or
 - Mail to: Canada Vigilance Program, Health Canada, Postal Locator 071E, Ottawa, ON K1A 0K9

Postage paid labels, Canada Vigilance Reporting Form and the adverse reaction reporting guidelines are available on the MedEffect™ Canada Web site at www.healthcanada.gc.ca/medeffect/.

NOTE: Should you require information related to the management of side effects, contact your health professional. The Canada Vigilance Program does not provide medical advice.

HOW TO STORE IT

Store at room temperature (15°–30°C). Keep out of reach of children. This package contains enough medicine to seriously harm a child.

MORE INFORMATION

This document plus the full product monograph, prepared for health professionals can be found by contacting the sponsor, **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC**, Mississauga, ON, L4R 4B2, at 1-888-275-3938 or www.advil.ca. This leaflet was prepared by **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC**. Product monograph available to doctors and pharmacists upon request. Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. ©2021 GSK group of companies or its licensees. Last revised: November 4, 2020



IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR
DUO PRATIQUE ADVIL® JOUR/NUIT

Advil Liqui-Gels
Capsules d'ibuprofène
(sous forme d'acide libre et de sel de potassium)
Advil Nuit
Capsules d'ibuprofène et de chlorhydrate de diphenhydramine

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Advil Liqui-Gels (jour) : Pour le soulagement temporaire des migraines légères ou modérées et des symptômes qui y sont associés tels que les nausées et la sensibilité à la lumière et au bruit.
Pour le soulagement rapide, efficace et temporaire des courbatures et douleurs musculaires, des douleurs corporelles et articulaires, des maux de dos, des entorses et foulures, des douleurs inflammatoires associées à des troubles cornéens (arbores) et le surmenage physique ou athlétique (entorses et foulures), des maux de tête, y compris les maux de tête de tension, des maux de dents et des crampes menstruelles.
Advil Nuit : Pour le soulagement rapide, efficace et temporaire de la douleur occasionnelle légère ou modérée ressentie pendant la nuit et de l'insomnie qui en découle, lorsqu'elle n'est attribuée aux douleurs et/ou courbatures dans les articulations et les muscles, aux maux de dos, aux maux de tête, aux maux de dents, à la migraine et à l'arthrite.

C'est un médicament temporaire et ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
Contient de l'ibuprofène (médicament servant à soulager la douleur) et utilisant pendant une courte durée, Advil Nuit contient un médicament sédatif, le chlorhydrate de diphenhydramine (un aide-sommeil pour soulager l'insomnie).
L'ibuprofène contribue à soulager la douleur et aide à s'endormir et la diphenhydramine aide à rester endormi.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :
Vous ne devez pas prendre ce médicament si :
• vous souffrez d'hypertension ou avez allergie à l'ibuprofène ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), à l'acide acétylsalicylique (ASA) ou à d'autres salicylates, à la diphenhydramine, à l'un ou l'autre des ingrédients d'Advil Nuit ou aux composants du contenant (voir la section des ingrédients non médicamenteux de la boîte ou la section sur la composition);
• vous avez un ulcère gastro-intestinal, ou des ulcères d'estomac récurrents, des saignements gastro-intestinaux ou une maladie hépatolésionnelle (incluant la cirrhose, maladie de Crohn, colite);
• vous avez des problèmes nasaux (enflure de l'intérieur du nez) ou une manifestation allergique comme l'asthme, l'anaphylaxie (réaction allergique soudaine, grave et pouvant être mortelle), l'urticaire, la rhinite (gonflement nasal) ou écoulement nasal pouvant être causés par des allergies), des éruptions cutanées ou d'autres symptômes d'allergie;
• vous prenez de l'ASA, de l'acétaminophène, d'autres AINS (p. ex., le naproxène) ou d'autres produits contenant de l'ibuprofène;
• vous souffrez de dysfonctionnement (importante perte de flux) causés par des vomissements, de la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquide;
• vous avez des problèmes cardiaques, comme l'hypertension ou une maladie coronarienne sévère;
• vous êtes sur le point de subir ou avez récemment subi une chirurgie cardiaque;
• vous souffrez d'une maladie grave du foie ou des reins;
• vous avez un taux élevé de potassium dans le sang;
• vous avez le lupus érythémateux disséminé;
• vous êtes au troisième trimestre de votre grossesse.
Vous ne devez pas prendre Advil Nuit si :
• vous avez une douleur qui ne vous amène pas à dormir;
• vous faites de l'insomnie en l'absence de douleur;
• vous prenez des produits contenant des antihistaminiques ou de la diphenhydramine (p. ex., produits contre la toux et le rhume, aide-sommeil) ou des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO).

Les ingrédients médicamenteux :
Advil Liqui-Gels : ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium)
Advil Nuit : ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium) et chlorhydrate de diphenhydramine

Les ingrédients non médicamenteux :
Advil Liqui-Gels : vent 173 FDCB, gélatine, lactose (sans), triglycérides à chaîne moyenne, encre pharmaceutique, polyéthylène glycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée, sorbitane, sorbitol
Advil Nuit : huile de noix de coco, rouge n° 33 D&C, bleu n° 1 FDCB, gélatine, encre pharmaceutique, polyéthylène glycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée, sorbitane, sorbitol

La présentation :
Advil Liqui-Gels : Une capsule remplie de liquide contient 200 mg d'ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium).
Advil Nuit : Un Liqui-Gel (capsule de gélatine) contient 200 mg d'ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium) et 25 mg de chlorhydrate de diphenhydramine.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes
«La prudence est de mise chez les patients qui sont sujets aux irritations de l'estomac ou des intestins, y compris ceux qui ont des antécédents d'ulcères gastro-intestinaux. Le risque de saignement dans l'estomac est plus élevé chez les personnes de 60 ans et plus, celles qui ont déjà eu des ulcères d'estomac ou des troubles hémorragiques, celles qui prennent un anticoagulant, des corticostéroïdes, des médicaments qui contiennent un AINS comme l'ASA, l'ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires sur ordonnance, et celles qui commencent 2 verres d'alcool ou plus par jour en même temps que ce produit.
«La prudence est de mise chez les patients qui risquent de souffrir de troubles rénaux, y compris les personnes âgées et celles prenant des diurétiques.
«Évitez d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitée.
«Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si vous avez de la difficulté à uriner ou ressentez de la douleur lorsque vous urinez.
«Advil Nuit cause de la sédation ou de la somnolence. Ne pas utiliser ce produit pendant la conduite.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser ce produit si :
• vous avez ou avez déjà eu un ulcère de l'estomac;
• vous êtes atteint de diabète;
• vous êtes atteint d'un trouble thyroïdien;
• vous avez une maladie des reins légère ou modérée;
• vous avez une maladie du foie légère ou modérée;
• vous avez une maladie cardiaque;
• vous avez un glaucome;
• vous avez des troubles respiratoires ou une maladie pulmonaire chronique (comme l'asthme, l'emphysème ou la bronchite chronique);
• vous avez des troubles de la coagulation (comme l'hémophilie);
• vous avez de la difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate, d'une obstruction du col vésical ou de toute autre maladie grave;
• vous prenez d'autres médicaments d'ordonnance ou en vente libre, y compris d'autres anti-inflammatoires;
• vous avez une maladie auto-immune (comme le lupus);
• vous faites de l'hypertension;
• vous avez plus de 65 ans;
• vous faites de l'insomnie enfant, êtes à votre premier ou deuxième trimestre de grossesse ou allaité;
• vous faites de l'insomnie en raison d'une douleur légère ou modérée qui persiste pendant plus de cinq jours.
L'insomnie peut être un symptôme d'un problème de santé sous-jacent autre que la douleur.

Évitez de conduire un véhicule ou d'être aux commandes d'une machine lorsque vous prenez Advil Nuit.
Faire preuve de prudence chez les personnes âgées.
L'emploi prolongé continu peut accroître le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.
Cessez d'utiliser ce médicament et consultez un médecin si :
• vous observez des signes de saignement dans l'estomac;
• vous observez une douleur d'aggrave ou persiste pendant plus de 5 jours;
• vous observez une douleur d'aggrave ou persiste pendant plus de 5 jours;
• vous observez de nouveaux symptômes se manifester.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

N'utilisez pas Advil Liqui-Gels ni Advil Nuit si vous prenez :
• une dose faible d'ASA (81-325 mg) chaque jour, sans consulter un médecin ou un pharmacien, car l'ibuprofène peut compromettre les bénéfices prévus de l'ASA.
Produits (ou substances) qui peuvent interagir avec Advil Liqui-Gels et Advil Nuit :
l'acétaminophène, les anticoagulants, l'apomorphine, l'alcool, la digoxine, les antidépresseurs (certains) et l'insuline, les diurétiques, le méthotrexate, le lithium, le probénécide, la thyroïde, les antidiabétiques (p. ex., la cyclosporine), la phénylalanine, les corticostéroïdes, les benzodiazépines, les médicaments contre l'hypertension, les médicaments contre la dépression, les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), les antihistaminiques (comme les médicaments contre les allergies), les tranquillisants, l'alcool ou autres sédatifs, les AINS (y compris le naproxène et l'ibuprofène), les antidépresseurs, les médicaments contre le rhume.
Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, des médicaments ou à votre pharmacien.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Posologie habituelle :
Adultes et enfants de 16 à 65 ans : Advil Liqui-Gels (jour) : Prendre 1 Liqui-Gel vert toutes les 4 heures ou 2 Liqui-Gels verts toutes les 6 à 8 heures dès l'apparition des premiers symptômes, au besoin Advil Nuit. Prendre 1 ou 2 Liqui-Gels bleus le soir de 4 à 6 heures après la dernière dose de jour d'ibuprofène ou de diphenhydramine. Ne pas utiliser ce produit pendant plus de 5 jours consécutifs, sauf sur l'avis d'un médecin. Ne pas dépasser un total de 2 Liqui-Gels Advil ou Liqui-Gels Advil Nuit par période de 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin.
Ne pas administrer aux enfants de moins de 16 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.
Ne pas utiliser plus de 2 jours pour le bleus ou plus de 5 jours pour la douleur et les symptômes du rhume.

Surdose :
En cas de surdose accidentelle, cessez d'utiliser ce produit et appelez immédiatement un centre antipoison, un médecin, un professionnel de la santé ou le service des urgences à un hôpital, même en l'absence de symptômes.

Doce oubliée :
Prenez la dose oubliée dès que vous y pensez. Si l'heure de votre prochaine dose approche, attendez jusqu'à ce moment pour prendre votre médicament et ne prenez pas la dose que vous avez oubliée. Si vous oubliez de prendre une dose, ne doublez pas la dose recommandée.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Prenez garde de la nourriture ou du lait en cas de maux d'estomac.
Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des éternuements ou des bourdonnements dans les oreilles, de la nervosité, de l'insomnie, des étourdissements, des changements de vision, de la difficulté à respirer, des essoufflements, une respiration sifflante, de la difficulté à respirer ou une sensation de serrement dans la poitrine, de l'urticaire, de l'enflure ou des démangeaisons, des éruptions cutanées, des rougeurs, des cloques ou du sang dans les urinoirs ou dans les selles, des selles noires, une jaunisse (jaunissement du blanc des yeux) ou de la peau causé par des problèmes de foie, ou tout autre effet secondaire ou symptôme inhabituel se manifestent pendant la prise d'Advil Nuit, cessez immédiatement l'utilisation du produit et communiquez avec un médecin.
Consultez votre médecin si la douleur ou l'insomnie persistent pendant plus de 5 jours.
On peut diminuer le risque d'effets secondaires en prenant la dose la plus faible pendant la plus courte période de temps possible.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES - FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

CESSEZ D'UTILISER ce produit et consultez immédiatement votre médecin en cas de douleurs abdominales, de réaction allergique (démangeaisons, cloques, éruptions cutanées, rougeurs, etc.), de tout changement de la vessie, de sang dans les vomissements, de selles noires ou contenant du sang, de douleurs à la vessie, d'hématuries ou de difficultés à uriner.

Cette liste d'effets indésirables n'est pas complète. Pour tout effet inhabituel, ressenti avec ou sans prise d'Advil Liqui-Gels ou d'Advil Nuit, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes :
• En ligne sur www.santecanada.gc.ca/medinfo
• Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345
• En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :

- par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6788, ou
- par la poste à :
Programme Canada Vigilance, Santé Canada,
Indus postal 0701E, Ottawa (Ontario) K1A 0N9
Les étiquettes d'affiliations, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffect® Canada à www.santecanada.gc.ca/medinfo
REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conserver à la température ambiante (15-30 °C).
Garder hors de portée des enfants.
L'emballage contient suffisamment de médicaments pour être administrés à un enfant.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit, disponible pour les professionnels de la santé, en communiquant avec le promoteur, GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI, Mississauga, ON L5R 4G2, au 1-866-275-2626 ou à l'adresse : www.advil.ca.
GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI a rédigé ce dépliant.
Monographie offerte sur demande aux médecins et aux pharmaciens.
Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2023 Groupe de sociétés GSK ou son coconsort de licence.
Dernière édition : 4 novembre 2020