

This product is not safe for children under 12 years of age.
Ne pas administrer à des enfants de moins de douze ans.
Consult your doctor if symptoms persist.
Consulter votre médecin si les symptômes persistent.
Do not use if blister seal is broken.
Ne pas utiliser si le scellé de la plaquette est rompu.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC, Mississauga, ON L5R 4B2
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2023 GSK group of companies or its licensor. Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in each caplet)	**Purposes**
Acetaminophen (extra strength) 500 mg	Pain reliever
Methocarbamol 400 mg	Muscle relaxant
Ingrédients actifs (dans chaque caplet)	**Utilités**
500 mg d'acétaminophène (extra fort)	Analgésique
400 mg de méthocarbamol	Relaxant musculaire

Uses • For temporary relief of pain associated with muscle spasm such as • back pain • tense neck muscles • strains and sprains.

Usages • Pour le soulagement temporaire des douleurs associées aux spasmes musculaires telles que • les maux de dos • la tension dans les muscles du cou • les entorses et les foulures.

Warnings **Liver warning** Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take: • more than the recommended dose in 24 hours • with other drugs containing acetaminophen • while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include: • yellow skin or eyes • dark urine • vomiting • nausea • vomiting • stomach pain • unusual tiredness • loss of appetite.

Allergy alert Acetaminophen may cause serious skin reactions. Stop use and get medical help right away if you have: • skin reddening • blisters • rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.**

Do not use • with other drugs containing **acetaminophen** or methocarbamol • if allergic to acetaminophen. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. ▶

0 62107 39150 4

66000000101266

80 mm

42 mm

Ingrédients inactifs Acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, bleu n° 1 FD&C, croscarmellose, dioxyde de silicium, glycolate d'amidon sodique, hypromellose, lactose monohydraté, laurylsulfate de sodium, méthylcellulose, polyéthylèneglycol, povidone, stéarate de magnésium.

Questions? 1-866-275-4938 www.ocala.ca

T2018 FDA Provides Survey for Oral Decongestants

Source: **FDA** Préliminaire sur les médicaments oraux contre les maux de tête 2018

Ask a doctor or pharmacist before use if you
• have liver or kidney disease, • diabetes • the blood thinning drug warfarin, • trouble sleeping, • high blood pressure, • an enlarged prostate or difficulty in urinating, or • are pregnant or breastfeeding.

When using this product • drowsiness, dizziness, nausea or light-headedness may occur • do not drive or operate machinery • do not drink alcohol.

Stop use and ask a doctor if • symptoms worsen or persist for more than 7 days or fever lasts more than 3 days, • new symptoms occur, or if pain, nervousness, or sleeplessness develop.

Keep out of reach of children. This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical for adults as well as children even if you do not notice any signs or symptoms.

Mise en garde Avertissement – foie
L'acétaminophène peut causer des **dommages sévères au foie qui peuvent être mortels** si vous prenez une quantité supérieure à la dose recommandée en 24 heures. • **Ne** prenez en même temps que d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène. • **Ne** consommez pas d'alcooliques ou plus chaque jour. Symptômes possibles en dommages au foie: • jaunissement de la peau ou des yeux • urines foncées • transpiration • nausées • vomissements • douleurs

Alerte aux allergies Ces pastilles peuvent provoquer des réactions cutanées graves. Cessez d'utiliser ce produit et consultez immédiatement un médecin si vous éprouvez l'un des symptômes suivants: • rougeur de la peau • ampoules

Arrêtez immédiatement et consultez un médecin si vous ressentez: **Si vous êtes atteint de ces symptômes, arrêtez immédiatement ce produit et consultez un médecin**
• éruption cutanée, • **Si vous** ressentez des symptômes de la peau ou des yeux, • pantoufflement de la peau ou des yeux • urines foncées • transpiration • nausées • vomissements • douleurs

PAA133120 **Peel Here / Tirez ici**

Ne pas utiliser • avec d'autres médicaments contenant de l'**acétaminophène** ou du paracétamol • **Ne** prenez pas avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène si vous ne savez pas s'ils contiennent de l'acétaminophène ou du paracétamol.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous • avez un malaise du foie • consumez régulièrement de l'alcool • prenez un autre médicament qui contient la warfarine • prenez des médicaments contre la dépression • des sédatifs • tout autre médicament • êtes enceinte ou allaitez.

Lorsque vous utilisez ce produit • vous pourriez souffrir de vertiges, de nausées ou de somnolence • ne buvez pas d'alcool.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si • les symptômes s'aggravent ou la douleur persiste pendant plus de 7 jours • des symptômes inhabituels se manifestent • une éruption cutanée ou des démangeaisons se manifestent.

Garder hors de la portée des enfants. Ce produit contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant. En cas de surdose, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Il est essentiel que les adultes et les enfants consultent sans délai un médecin en l'absence de signes et de symptômes.

Directions • Adults and children 12 years & over: • Take 2 caplets every 6 hours or as needed. Do not take more than 8 caplets in 24 hours. Do not take more than directed (see **Over** warnings). Use only on the advice of a doctor.

Mode d'emploi Adultes et enfants de 12 ans et plus: • Prendre 2 caplets toutes les 6 heures au besoin. • Ne pas prendre plus de 8 caplets en 24 heures. Ne pas prendre plus que le dose indiquée (voir la mises pour **le** foie). A n'utiliser que sur recommandation d'un médecin.

Other information Store at room temperature (15-30°C).

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C).

Inactive Ingredients Corn starch, croscarmellose, D&C Yellow No. 10, FD&C Blue No. 1, hypromellose, magnesium stearate, methylcellulose, polyethylene glycol, povidone, pregelatinized starch, sodium stearic acid, sodium lauryl sulfate, sodium starch glycolate, stearic acid.

81 mm