Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in each capsule) / **Ingrédients actifs** (dans chaque capsule)	**Purposes / Utilités**
Acetaminophen 325 mg	Pain reliever, fever reducer
Acétaminophène à 325 mg	Analgésique et antipyrétique
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg	Cough suppressant
Bromhydrate de dextrométhorphane à 15 mg	Antitussif
Doxylamine succinate 6.25 mg	Antihistamine
Succinate de doxylamine à 6,25 mg	Antihistaminique
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg	Nasal decongestant
Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 30 mg	Décongestionnant nasal ▼

Uses / Usages •Temporary relief from the following symptoms due to cold and flu: •headache •minor aches and pain •fever and chills •sinus and nasal congestion •sinus pressure •sore throat pain •dry cough •sneezing •runny nose •itchy & watery eyes / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume et la grippe : •maux de tête •courbatures et douleurs légères •fièvre et frissons •congestion nasale et des sinus •pression sinusale •maux de gorge •toux sèche •éternuements •écoulement nasal •larmoiement et picotement des yeux.

Warnings / Mises en garde

Liver warning / Avertissement – foie Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite / L'acétaminophène peut causer de **graves lésions au foie pouvant entraîner la mort** si vous prenez ce médicament •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions au foie peuvent comprendre •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit.

Allergy alert / Alerte aux allergies Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include •skin reddening •blisters •rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.** / L'acétaminophène peut causer de graves réactions cutanées. Les symptômes peuvent comprendre •rougeur •cloques •éruption cutanée. **Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus survient, cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin immédiatement.**

Do not use / Ne pas utiliser •with any other drug containing **acetaminophen** or any other cough and cold product •if you are allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. / •avec d'autres médicaments contenant de l'**acétaminophène** ou d'autres médicaments contre la toux ou le rhume •en cas d'allergie à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments pour le traitement de la dépression ou de la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines après avoir cessé de prendre un IMAO.

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •have liver, kidney, heart or thyroid disease, high blood pressure, diabetes, glaucoma, difficulty urinating •are taking blood thinning drug warfarin •are pregnant or breastfeeding •have a persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •have a cough with excessive phlegm (mucus) •have difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •take sedatives or tranquilizers •are taking medication for weight control •have any other serious medical condition. / •avez une maladie du foie, des reins, du cœur ou de la thyroïde; une tension artérielle élevée, un glaucome, le diabète ou de la difficulté à uriner •prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •êtes enceinte ou allaitez •avez une toux persistante comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou une autre maladie pulmonaire chronique (ces symptômes pourraient indiquer un problème grave) •prenez des sédatifs ou des tranquillisants •prenez des médicaments pour la régulation du poids •avez tout autre problème médical grave.

When using this product / Lorsque vous utilisez ce produit •drowsiness may occur •alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness •do not drive or engage in activities requiring alertness •avoid alcoholic drinks •excitability may occur, especially in children / •vous pourriez éprouver de la somnolence •la consommation d'alcool, de sédatifs et de tranquillisants peut accroître la somnolence •ne pas conduire ou participer à des activités exigeant de la vigilance •évitez de consommer des boissons alcoolisées •ce produit peut causer de l'excitabilité, en particulier chez les enfants.

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •new symptoms appear •symptoms worsen or last for more than 7 days •pain lasts for more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat lasts for more than 2 days •you develop a high fever (>38°C), rash or a headache that won't go away •you are nervous, dizzy, can't sleep / •de nouveaux symptômes apparaissent •vos symptômes s'aggravent ou durent plus de 7 jours •la douleur dure plus de 5 jours •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •vous avez de la fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste •vous êtes nerveux, étourdi ou incapable de dormir. ▼

● **Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants.** This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à la santé d'un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi

Adults and children 12 years and over: •Take 2 capsules every 4-6 hours. Do not exceed 8 capsules in 24 hours. Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings). / Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Prendre 2 capsules toutes les 4 à 6 heures. Ne pas dépasser 8 capsules en 24 heures. Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ne pas dépasser la dose recommandée (voir Avertissement – foie).

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 25°C. Do not use if child-resistant, sealed blister unit is broken. / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. ▶

Contains acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

Liquid Gels
Gélules liquides

Buckley's

Sore throat pain and dry cough	Maux de gorge et toux sèche
Sinus and nasal congestion	Congestion nasale et des sinus
Minor aches and pain	Courbatures et douleurs légères
Fever and chills	Fièvre et frissons
Headache	Maux de tête
Runny nose and sneezing	Écoulement nasal et éternuements
Itchy and watery eyes	Larmoiement et picotement des yeux

COMPLETE | COMPLET

NIGHTTIME SOFTGELS | NUIT GÉLULES MOLLES

LETS YOU REST | VOUS PERMET DE VOUS REPOSER

DIN 02335239

24 CAPSULES

•Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). Ne pas utiliser si la plaquette alvéolée scellée à l'épreuve des enfants est brisée.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs FD&C Blue #1, gelatin, glycerin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, povidone, propylene glycol, sorbitol, water / Bleu FD&C n° 1, eau, encre pharmaceutique, gélatine, glycérine, polyéthylèneglycol, povidone, propylèneglycol, sorbitol.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

P104696

0 58478 10906 0

The Buckley's Company Mississauga, ON L5N 6L4
Trademarks owned or licensed by GSK. /
M. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK.
©2020 GSK or licensor. GSK ou son concédant de licence.

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in each capsule) / **Ingrédients actifs** (dans chaque capsule) — **Purposes / Utilités**

Acetaminophen 325 mg	Pain reliever, fever reducer
Acétaminophène à 325 mg	Analgésique et antipyrétique
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg	Cough suppressant
Bromhydrate de dextrométhorphane à 15 mg	Antitussif
Doxylamine succinate 6.25 mg	Antihistamine
Succinate de doxylamine à 6,25 mg	Antihistaminique
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg	Nasal decongestant
Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 30 mg	Décongestionnant nasal

Uses / Usages •Temporary relief from the following symptoms due to cold and flu: •headache •minor aches and pain •fever and chills •sinus and nasal congestion •sinus pressure •sore throat pain •dry cough •sneezing •runny nose •itchy & watery eyes / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume et la grippe : •maux de tête •courbatures et douleurs légères •fièvre et frissons •congestion nasale et des sinus •pression sinusale •maux de gorge •toux sèche •éternuements •écoulement nasal •larmoiement et picotement des yeux.

Warnings / Mises en garde

Liver warning / Avertissement – foie Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite / L'acétaminophène peut causer de **graves lésions au foie pouvant entraîner la mort** si vous prenez ce médicament •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions au foie peuvent comprendre •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit.

Allergy alert / Alerte aux allergies Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include •skin reddening •blisters •rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.** / L'acétaminophène peut causer de graves réactions cutanées. Les symptômes peuvent comprendre •rougeur •cloques •éruption cutanée. **Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus survient, cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin immédiatement.**

Do not use / Ne pas utiliser •with any other drug containing **acetaminophen** or any other cough and cold product •if you are allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. / •avec d'autres médicaments contenant de l'**acétaminophène** ou d'autres médicaments contre la toux ou le rhume •en cas d'allergie à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments pour le traitement de la dépression ou de la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines après avoir cessé de prendre un IMAO.

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •have liver, kidney, heart or thyroid disease, high blood pressure, diabetes, glaucoma, difficulty urinating •are taking blood thinning drug warfarin •are pregnant or breastfeeding •have a persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •have a cough with excessive phlegm (mucus) •have difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •take sedatives or tranquilizers •are taking medication for weight control •have any other serious medical condition. / •avez une maladie du foie, des reins, du cœur ou de la thyroïde; une tension artérielle élevée, un glaucome, le diabète ou de la difficulté à uriner •prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •êtes enceinte ou allaitez •avez une toux persistante comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou une autre maladie pulmonaire chronique (ces symptômes pourraient indiquer un problème grave) •prenez des sédatifs ou des tranquillisants •prenez des médicaments pour la régulation du poids •avez tout autre problème médical grave.

When using this product / Lorsque vous utilisez ce produit •drowsiness may occur •alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness •do not drive or engage in activities requiring alertness •avoid alcoholic drinks •excitability may occur, especially in children / •vous pourriez éprouver de la somnolence •la consommation d'alcool, de sédatifs et de tranquillisants peut accroître la somnolence •ne pas conduire ou participer à des activités exigeant de la vigilance •évitez de consommer des boissons alcoolisées •ce produit peut causer de l'excitabilité, en particulier chez les enfants.

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •new symptoms appear •symptoms worsen or last for more than 7 days •pain lasts for more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat lasts for more than 2 days •you develop a high fever (>38°C), rash or a headache that won't go away •you are nervous, dizzy, can't sleep / •de nouveaux symptômes apparaissent •vos symptômes s'aggravent ou durent plus de 7 jours •la douleur dure plus de 5 jours •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •vous avez de la fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste •vous êtes nerveux, étourdi ou incapable de dormir. ▼

● **Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants.** This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à la santé d'un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi

Adults and children 12 years and over: •Take 2 capsules every 4-6 hours. Do not exceed 8 capsules in 24 hours. Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings). / Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Prendre 2 capsules toutes les 4 à 6 heures. Ne pas dépasser 8 capsules en 24 heures. Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ne pas dépasser la dose recommandée (voir Avertissement – foie).

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 25°C. Do not use if child-resistant, sealed blister unit is broken. / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. ▸

•Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). Ne pas utiliser si la plaquette alvéolée scellée à l'épreuve des enfants est brisée.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs FD&C Blue #1, gelatin, glycerin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, povidone, propylene glycol, sorbitol, water / Bleu FD&C nº 1, eau, encre pharmaceutique, gélatine, glycérine, polyéthylèneglycol, povidone, propylèneglycol, sorbitol.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

Contains acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

Liquid Gels
Gélules liquides

Buckley's

Sore throat pain and dry cough	Maux de gorge et toux sèche
Sinus and nasal congestion	Congestion nasale et des sinus
Minor aches and pain	Courbatures et douleurs légères
Fever and chills	Fièvre et frissons
Headache	Maux de tête
Runny nose and sneezing	Écoulement nasal et éternuements
Itchy and watery eyes	Larmoiement et picotement des yeux

COMPLETE | COMPLET

NIGHTTIME SOFTGELS | NUIT GÉLULES MOLLES

LETS YOU REST | VOUS PERMET DE VOUS REPOSER

DIN 02335239

24 CAPSULES

The Buckley's Company Mississauga, ON L5N 6L4
Trademarks owned or licensed by GSK. / M.C. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK.
©2020 GSK or licensor. GSK ou son concédant de licence.

P104696

0 58478 10906 0