Buckley's

0 58478 10713 4

Buckley's

EXPECTORANT

Fast relief of:
Soulage rapidement :

- Cough
  la toux
- Mucus & Phlegm
  les mucosités
- Nasal Congestion
  la congesion nasale

Get the Mucus Out!
Expulsez les mucosités!

MUCUS & PHLEGM
ANTI-MUCOSITÉS

DIN 02346451

250 mL Syrup / Sirop

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients actifs** (par cuillère à thé ou 5 mL)	**Purposes / Utilités**
Guaifenesin 100 mg / Guaïfénésine à 100 mg	Cough expectorant / Expectorant
Menthol 10 mg / Menthol à 10 mg	Nasal decongestant / Décongestionnant nasal

Uses / Usages •Temporarily relieves the following symptoms due to common cold: •wet cough or chest congestion •dry cough •nasal congestion. Helps loosen phlegm or mucus and thin lung secretions. / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume : •toux grasse ou congestion de la poitrine •toux sèche •congestion nasale. Aide à déloger et à éclaircir les mucosités des poumons.

Warnings / Mises en garde
Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •are pregnant or breastfeeding •have a persistent cough that has not gone away •difficulty breathing •asthma or other chronic lung conditions •take any other cough and cold medication / •êtes enceinte ou allaitez •avez une toux persistante •avez de la difficulté à respirer •souffrez d'asthme ou d'une autre maladie pulmonaire chronique •prenez d'autres médicaments contre la toux et le rhume.
▼

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •symptoms worsen or last for more than 7 days •you have a high fever (>38°C) or a headache that does not go away •you develop a rash •you cough up thick yellow or green mucus / •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •vous avez une forte fièvre (> 38 °C) ou des maux de tête qui persistent •vous présentez une éruption cutanée •votre toux s'accompagne d'épaisses mucosités jaunes ou vertes.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. / En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement.

Directions / Mode d'emploi
•Adults and children 12 years and over: •Shake well before using. •Take 2 to 3 teaspoons (10 to 15 mL) every 6 hours. Do not take more than 4 doses (60 mL) in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •If preferred, mix with equal parts honey. / •Adultes et enfants de 12 ans et plus : •Bien agiter avant d'utiliser. •Prendre de 2 à 3 cuillères à thé (de 10 à 15 mL) toutes les 6 heures. Ne pas prendre plus de 4 doses (60 mL) en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Si désiré, mélanger en parts égales avec du miel.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 25°C •Security Feature: Do not use if sealed carton ends are broken or torn / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). •Dispositif de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Acesulfame K, ammonium carbonate, camphor, Canada balsam, carrageenan, glycerin, pine needle oil, propylene glycol, propylparaben, tincture of capsicum, water. / Acésulfame-K, baume du Canada, camphre, carbonate d'ammonium, carraghénane, eau, glycérine, huile d'aiguille de pin, propylèneglycol, propylparabène, teinture de piment sec.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The Buckley's Company Mississauga, ON L5N 6L4
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies./Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2020 GSK group of companies or its licensor./Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

PAA144092

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •symptoms worsen or last for more than 7 days •you have a high fever (>38°C) or a fever that lasts more than 3 days •you develop a rash or persistent headache •cough produces yellow or green mucus •you have difficulty breathing •you have yellow skin or eyes •you have a persistent sore throat •you have a fever (>38 °C) or a fever that lasts more than 3 days •you develop a rash or persistent headache •cough produces yellow or green mucus •you have difficulty breathing •you have yellow skin or eyes •you have a persistent sore throat •you have a fever (>38 °C) or a fever that lasts more than 3 days •you develop a rash or persistent headache •cough produces yellow or green mucus •you have difficulty breathing •you have yellow skin or eyes •you have a persistent sore throat •you have a fever (>38 °C) ou des maux de tête qui persistent •vous présentez une éruption cutanée •votre toux s'accompagne d'épaisses mucosités jaunes ou vertes.

Keep out of reach of children. / **Garder hors de la portée des enfants.** In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. / En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement.

Directions / Mode d'emploi
•Adults and children 12 years and over: -Shake well before using. -Take 2 to 3 teaspoons (10 to 15 mL) every 6 hours. Do not take more than 4 doses (60 mL) in 24 hours. -Children under 12: Do not use. -If preferred, mix with equal parts honey. / •Adultes et enfants de 12 ans et plus : -Bien agiter avant d'utiliser. -Prendre de 2 à 3 cuillères à thé (10 à 15 mL) toutes les 6 heures. Ne pas prendre plus de 4 doses (60 mL) en 24 heures. -Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. -Si désiré, mélanger en parts égales avec du miel.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 - 25°C •Security Feature: Do not use if sealed carton or/and its blister is broken or torn / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). •Dispositif de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Acesulfame K, ammonium carbonate, camphor, Canada balsam, carrageenan, glycerin, pine needle oil, propylene glycol, propylparaben, tincture of capsicum, vanilla / Acésulfame-K, baume du Canada, camphre, carbonate d'ammonium, carraghénane, eau, glycérine, huile d'aiguille de pin, paraben de propyle, propylène glycol, teinture de piment fort, vanille

Questions? Call / Composez le 1-800-431-1034 www.buckleys.ca

The Buckley's Company Mississauga, ON L5N 8L4
The Buckley's Company is a member of the GSK group of companies./Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2020 GSK group of companies or its licensor/Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

Buckley's

0 58478 10713 4

Buckley's

Get the Mucus Out! Expulsez les mucosités!

EXPECTORANT

Fast relief of:
Soulage rapidement :

- Cough
  la toux
- Mucus & Phlegm
  les mucosités
- Nasal Congestion
  la congesion nasale

MUCUS & PHLEGM
ANTI-MUCOSITÉS

DIN 02346451

250 mL Syrup / Sirop

PAA144092

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients actifs** (par cuillère à thé ou 5 mL) — **Purposes / Utilités**
Guaifenesin 100 mg / Guaifénésine à 100 mg ..... Cough expectorant / Expectorant
Menthol 10 mg / Menthol à 10 mg ..... Nasal decongestant / Décongestionnant nasal

Uses / Usages •Temporarily relieves the following symptoms due to common cold: •wet cough or chest congestion •dry cough •nasal congestion. / Aide à libérer et à éliminer les mucosités des poumons. •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume : •toux grasse ou congestion de la poitrine •toux sèche •congestion nasale. Aide à dégager et à éliminer les mucosités des poumons.

Warnings / Mises en garde
Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •are pregnant or breastfeeding. •have a persistent or chronic cough that may accompany smoking, asthma, or emphysema. •have a cough that occurs with excessive phlegm (mucus). •have a cough that lasts or recurs. / •êtes enceinte ou allaitez. •avez une toux persistante •avez de la difficulté à respirer •souffrez d'asthme ou d'une autre maladie pulmonaire chronique •prenez d'autres médicaments contre la toux et le rhume.