

Drug Facts	Info-médicament
Active ingredients (in each pouch of 10.1 g powder) Acetaminophen 650 mg (extra strength)Pain reliever, fever reducer Dextromethorphan hydrobromide 20 mgCough suppressant	Utilités (dans chaque sachet contenant 10,1 g de poudre) Acétaminophène à 650 mg (extra fort).....Analgésique et antipyrétique Bromhydrate de dextrométhorphane à 20 mg.....Antitussif
Uses •Temporarily relieves cough, cold and flu symptoms: •fever •minor body aches and pain •sore throat pain •headache •dry cough	Usages •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par la toux, le rhume et la grippe : •fièvre •douleurs et courbatures légères •maux de gorge •maux de tête •toux sèche
Warnings Liver warning Acetaminophen may cause severe or possibly fatal liver damage if you take: •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include: •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite Allergy alert Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include: •skin reddening •blisters •rash. If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away. Do not use •with any other drug containing acetaminophen or dextromethorphan •if you are allergic to acetaminophen, dextromethorphan or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. Ask a doctor or pharmacist before use if you •have •persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •cough with excessive phlegm (mucus) •difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •liver or kidney disease •take •the blood thinning drug warfarin •any other cough and cold medication •are pregnant or breastfeeding Stop use and ask a doctor if •pain lasts for more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat pain lasts more than 2 days •symptoms worsen or last for more than 7 days •you develop a fever (>38°C), rash or persistent headache • Keep out of reach of children. This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.	Mises en garde Avertissement – foie L'acétaminophène peut causer de graves lésions au foie pouvant entraîner la mort si vous prenez ce médicament : •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions au foie peuvent comprendre : •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit Alerte aux allergies L'acétaminophène peut provoquer des réactions cutanées graves. Les symptômes peuvent comprendre : •rougeur de la peau •cloques •éruption cutanée. Si l'un ou l'autre de ces symptômes apparaît, cessez de prendre ce produit et obtenez des soins médicaux immédiatement. Ne pas utiliser •avec un autre médicament contenant de l'acétaminophène ou du dextrométhorphane •si vous êtes allergique à l'acétaminophène, au dextrométhorphane ou à tout autre ingrédient dans ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines qui suivent la fin d'un tel traitement. Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •avez une toux persistante (comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème) •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou souffrez d'une autre maladie pulmonaire chronique. Ces symptômes pourraient indiquer un problème grave. •avez une maladie du foie ou des reins •prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •prenez d'autres médicaments contre la toux et le rhume •êtes enceinte ou allaitez Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •les douleurs persistent plus de 5 jours •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •vous avez de la fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste

Info-médicament (suite)
● Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes. Mode d'emploi Adultes et enfants de 12 ans et plus : •Dissoudre le contenu de 1 sachet dans 225 mL (1 tasse) d'eau bouillante. •Prendre toutes les 4 à 6 heures, au besoin. •Ne pas prendre plus de 4 sachets en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ne pas dépasser la quantité indiquée (voir Avertissement – foie). •Il s'agit d'une unité posologique non standard. Autres renseignements • Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation • Conserver les sachets inviolables à l'épreuve des enfants à la température ambiante (15 – 25 °C) Ingrédients inactifs Acésulfame de potassium, acide citrique, arômes (contient du soya), aspartame (contient de la phénylalanine), bleu n° 1 (FD&C), citrate de sodium, dioxyde de silicium, jaune n° 10 (D&C), maltodextrine, phosphate tricalcique, rouge n° 40 (FD&C), saccharose Questions? Composer le 1-888-788-8181 www.neocitran.ca

NEOCITRAN

EXTRA STRENGTH COLD & COUGH EXTRA FORT RHUME ET TOUX DAY FOUR

Contains Acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

NEW! NOUVEAU! DIN 02552515

HALEON

NEOCITRAN

EXTRA STRENGTH COLD & COUGH EXTRA FORT RHUME ET TOUX DAY FOUR

/ Dry cough

/ Sore throat pain & headache

/ Fever & minor body aches

/ Toux sèche

/ Maux de gorge et maux de tête

/ Fièvre et courbatures légères

Honey Ginger Miel et gingembre

10 SINGLE DOSE POUCHES (POWDER) SACHETS À DOSE UNIQUE (POUDRE)

LOT

EXP

60815 40348 9

Drug Facts (continued)
Directions Adults and children 12 years and over: •Dissolve the contents of 1 pouch into 225 mL (one cup) of boiling water. •May be taken every 4-6 hours. •Do not take more than 4 pouches in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings). •This is not a standard dosage unit. Other information • Keep and consult carton for important information before each use • Store tamper evident, child-resistant pouches at room temperature 15 – 25°C Inactive ingredients Acesulfame potassium, aspartame (contains phenylalanine), citric acid, D&C Yellow No.10, FD&C Blue No.1, FD&C Red No.40, flavours (contains soy), maltodextrin, silicon dioxide, sodium citrate, sucrose, tribasic calcium phosphate Questions? Call 1-888-788-8181 www.neocitran.ca

Haleon Canada ULC/SRI, Mississauga, ON L5R 4B2
Trademarks are owned by or licensed to the Haleon group of companies. / Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés Haleon.
©2025 Haleon group of companies or its licensor. / Groupe de sociétés Haleon ou son concédant de licence.