Drug Facts

Active ingredients — **Purpose**

In each pouch of 15.2 g (powder)

Acetaminophen 500 mg ——— Pain reliever, fever reducer

Phenylephrine hydrochloride 10 mg ——— Nasal decongestant

Dichlorhydrate de chlorphénamine 2 mg ——— Antihistamine, cough suppressant

Uses

- Temporarily relieves cough, cold and flu symptoms
- fever
- mild body aches and pain
- sore throat pain
- headache
- dry cough
- nasal and sinus congestion
- sneezing
- runny nose
- itchy watery eyes

Warnings

Liver warning: Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take:

- more than the recommended dose (4 hours)
- with other drugs containing acetaminophen
- if you drink alcohol while taking more than 3 drinks every day. Symptoms of liver damage may include:
- nausea
- vomiting
- stomach pain
- yellow skin
- bleeding
- rash
- loss of appetite

Allergy alert: Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include:

- skin reddening
- blisters
- rash

If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.

Do not use

- with any other drug containing **acetaminophen**
- if you are allergic to acetaminophen. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist.
- with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric or emotional conditions, or Parkinson's disease), or within 2 weeks after stopping the MAOI drug.
- with any other product containing diphenhydramine, even one used on skin

Ask a doctor or pharmacist before use if you

- have
- liver disease
- heart disease
- high blood pressure
- thyroid disease
- breathing problems such as emphysema or chronic bronchitis
- difficulty urinating
- take
- medicine for high blood pressure or thyroid disease
- medicine for depression, psychiatric or emotional conditions, or Parkinson's disease
- the blood thinning drug warfarin
- are pregnant or breastfeeding

When using this product

- drowsiness may occur
- alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness
- avoid alcoholic drinks
- be careful when driving or operating machinery
- excitability may occur, especially in children

Info-médicament

Ingrédients actifs — **Utilités**

Par sachet de 15,2 g (poudre)

Acétaminophène à 500 mg ——— Analgésique et antipyrétique

Chlorhydrate de phénylephrine à 10 mg ——— Décongestionnant nasal

Chlorhydrate de chlorphénamine à 2 mg ——— Antihistaminique et antitussif

Usages

- Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par la toux, la fièvre et la grippe
- fièvre
- courbatures légères
- maux de gorge
- maux de tête
- congestion nasale et sinusale
- écoulement nasal
- éternuement et picotement des yeux

Mises en garde

Avertissement – foie: L'acétaminophène peut causer de **graves lésions au foie pouvant entraîner la mort** si vous prenez ce médicament :

- en une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures
- avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène
- si vous buvez de l'alcool au cours de ces 24 heures, cela pourrait augmenter le risque de lésions au foie pouvant compromettre
- soulagement de la peau ou des yeux
- urines foncées
- coloration jaunâtre
- nausées
- vomissements
- douleur à l'estomac
- fatigue inhabituelle
- perte d'appétit

Avertissement – allergie: L'acétaminophène peut causer de graves réactions cutanées. Ces symptômes peuvent comprendre :

- éruption cutanée
- rougeur de la peau
- cloques
- éruption cutanée. **S'il vous faute de ces symptômes apparaît, cessez de prendre ce produit et obtenez des soins médicaux immédiatement.**

Ne pas utiliser

- avec un autre médicament contenant de l'acétaminophène
- si vous êtes allergique à l'acétaminophène. Si vous ne savez pas si un médicament contient de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien.
- avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson émotionnels ou psychiatriques, ou dans les 2 semaines suivant l'arrêt du traitement par un IMAO
- diphenhydramine, même si ce produit est appliqué sur la peau

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous

- avez
- une maladie du foie, des reins ou du cœur
- des effets dérivés ou de glaucome, ou avez une pression oculaire élevée
- avez des problèmes respiratoires comme l'emphysème ou la bronchite chronique
- avez de la difficulté à uriner
- prenez
- un médicament pour la haute pression sanguine
- un médicament pour la dépression, des troubles psychiatriques ou émotionnels, ou la maladie de Parkinson
- de la warfarine, un médicament qui fluidifie le sang
- prenez des sédatifs ou des tranquillisants
- buvez de l'alcool, consommez régulièrement de l'alcool
- êtes enceinte ou allaitez

Lorsque vous utilisez ce produit

- vous pourriez éprouver de la somnolence
- la consommation d'alcool, de sédatifs et de tranquillisants peut accroître la somnolence
- évitez les boissons alcoolisées
- soyez prudent lorsque vous conduisez un véhicule ou actionnez une machine
- une excitabilité peut survenir, surtout chez les enfants

Info-médicament (suite)

Causes d'utiliser et consultez un médecin si

- les douleurs persistent plus de 7 jours ou la fièvre persiste plus de 3 jours
- des maux de gorge graves durent plus de 2 jours
- des symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours
- vous avez de la fièvre (+ 38 °C)
- vous remarquez des rougeurs ou des enflures

Gardez hors de la portée des enfants. Ce emballage contient suffisamment de médicament pour plusieurs enfants. En cas de surdose, comme le fait avec un centre antipoison ou un médecin. Même si le médicament remarquement, il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Mode d'emploi

Adultes et enfants de 12 ans et plus : Dissoudre le contenu d'un sachet dans 250 mL (1 tasse) d'eau bouillante. • Prendre toutes les 4 à 6 heures, au besoin. • Ne pas prendre plus de 6 sachets en 24 heures. • Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. • Ne pas dépasser la quantité indiquée sans avertissement • Lire. • Il s'agit d'une simple posologique non étendard.

Autres renseignements

- Garder le boîte hors de portée de la lumière directe du soleil et à température ambiante (15 – 25 °C)

Ingrédients inactifs Acide fumarique, acide citrique, arôme d'agrumes, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium, citrate de sodium, docusate de sodium, glycine, jaune n° 6 (FD&C), saccharine, saccharine sodique, saccharose, silice, sucralose, talc.

Questions?

Composez le 1-800-567-543 ou www.neocitran.ca

Contains Acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

HALSON

NEOCITRAN

TOTAL COLD
TOTAL RHUME

NIGHT TIME

- Dry cough
- Sore throat pain & headache
- Fever & minor body aches
- Sinus & nasal congestion
- Toux sèche
- Maux de gorge et maux de tête
- Fièvre et courbatures légères
- Congestion nasale et sinusale

SO YOU CAN REST
POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOUS REPOSER

10 SINGLE DOSE POUCHES POWDER / 10 SACHETS DOSE UNIQUE POUDRE

Citrus Infusions
Infusions aux agrumes

LOT:

EXP:

Drug Facts (continued)

Stop use and ask a doctor if

- sore throat pain lasts more than 3 days
- fever lasts more than 3 days
- sore throat pain lasts more than 2 days
- symptoms worsen or last for more than 7 days
- you
- are
- drowsy or have dizziness
- are nervous, dizzy, or sleepless

Keep out of reach of children. In case of overdose, seek medical help or contact a Poison Control Center right away. Quick medical attention is critical for adults as well, but may not show any signs or symptoms.

Directions

- adults and children 12 years and over
- dissolve the contents of 1 pouch into 250 mL (one cup) of boiling water
- stir until dissolved
- may be taken every 4 – 6 hours, as needed
- do not take more than 6 pouches in 24 hours
- children under 12: Do not use.
- do not take more than directed (see overdosage)
- this is not a standard dosage unit.

Other information

- keep and carry it carton for important information before each use
- store between 15 – 25°C (59 – 77°F)
- avoid excessive heat (above 40°C or 104°F)

Inactive ingredients Acesulfame potassium, ascorbate (sodium), phenylalanine), citric acid, FD&C Yellow No. 6, flavours (contains soy), hydrogenated soy, maltodextrin, sodium chloride, sucrose, talc, and other processed

Questions?

Call 1-800-567-5432 or www.neocitran.ca

Non-Drowsy (NDN) Manufactured by Halson Inc. Mississauga, ON, L5T 2E1 Distributed by Halson Inc. Mississauga, ON, L5T 2E1 Made in Canada with domestic and imported ingredients. Fabriqué au Canada avec des ingrédients canadiens et importés.

Store at room temperature (15 – 25°C). Ensure to avoid heat above 40°C (104°F).