

| Drug Facts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Info-médicament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Active ingredients</b><br>(in each pouch of 11.3 g powder)<br><b>Acetaminophen 1000 mg</b> (ultra strength).....Pain reliever, fever reducer<br>Dextromethorphan hydrobromide 30 mg.....Cough suppressant<br>Chlorpheniramine maleate 4 mg.....Antihistamine                                                                                                                                                                                                         | <b>Utilités</b><br><b>Ingrédients actifs</b><br>(dans chaque sachet contenant 11,3 g de poudre)<br><b>Acétaminophène à 1000 mg</b> (ultra fort).....Analgésique et antipyrétique<br>Bromhydrate de dextrométhorphane à 30 mg.....Antitussif<br>Maléate de chlorphéniramine à 4 mg.....Antihistaminique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Uses</b><br>•Temporarily relieves cough, cold and flu symptoms:<br>•fever •minor body aches and pain •sore throat pain •headache<br>•dry cough •sneezing •runny nose •itchy, watery eyes                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Usages</b><br>•Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par la toux, le rhume et la grippe : •fièvre •douleurs et courbatures légères •maux de gorge •maux de tête •toux sèche •éternuements •écoulement nasal •larmoiement et picotement des yeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Warnings</b><br><b>Liver warning</b> Acetaminophen may cause <b>severe or possibly fatal liver damage</b> if you take: •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include: •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite                                            | <b>Mises en garde</b><br><b>Avertissement – foie</b> L'acétaminophène peut causer <b>de graves lésions au foie pouvant entraîner la mort</b> si vous prenez ce médicament : •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions au foie peuvent comprendre : •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit                                                             |
| <b>Allergy alert</b> Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include: •skin reddening •blisters •rash. <b>If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Alerte aux allergies</b> L'acétaminophène peut provoquer des réactions cutanées graves. Les symptômes peuvent comprendre : •rougeur de la peau •cloques •éruption cutanée. <b>Si l'un ou l'autre de ces symptômes apparaît, cessez de prendre ce produit et obtenez des soins médicaux immédiatement.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Do not use</b> •with any other drug containing <b>acetaminophen</b> , dextromethorphan or chlorpheniramine maleate •if you are allergic to acetaminophen, dextromethorphan or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug.                     | <b>Ne pas utiliser</b> •avec un autre médicament contenant de l' <b>acétaminophène</b> , du dextrométhorphane ou du maléate de chlorphéniramine •si vous êtes allergique à l'acétaminophène, au dextrométhorphane ou à tout autre ingrédient de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines qui suivent la fin d'un tel traitement.                                              |
| <b>Ask a doctor or pharmacist before use if you</b> •have •persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •cough with excessive phlegm (mucus) •difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •liver or kidney disease •glaucoma •difficulty urinating •take •the blood thinning drug warfarin •sedatives or tranquilizers •any other cough and cold medication •are pregnant or breastfeeding | <b>Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous</b> •avez une toux persistante (comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème) •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou une autre maladie pulmonaire chronique (ces symptômes pourraient indiquer un problème grave) •avez une maladie du foie ou des reins •un glaucome •de la difficulté à uriner •prenez •de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •des sédatifs ou des tranquillisants •d'autres médicaments contre la toux et le rhume •êtes enceinte ou allaitez |
| <b>When using this product</b> •drowsiness may occur •alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness •do not drive or engage in activities requiring alertness •avoid alcoholic drinks •excitability may occur, especially in children                                                                                                                                                                                                                    | <b>Lorsque vous utilisez ce produit</b> •vous pourriez éprouver de la somnolence •la consommation d'alcool, de sédatifs et de tranquillisants peut accroître la somnolence •abstenez-vous de conduire un véhicule ou d'entreprendre des activités exigeant de la vigilance •évitiez les boissons alcoolisées •il existe un risque d'excitabilité, en particulier chez les enfants                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stop use and ask a doctor if</b> •pain lasts for more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat pain lasts more than 2 days •symptoms worsen or last for more than 7 days •you develop a fever (>38°C), rash or persistent headache                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Info-médicament (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cessez d'utiliser et consultez un médecin si</b><br>•les douleurs persistent plus de 5 jours<br>•la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •vous avez de la fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste                                                                                                                                 |
| <b>● Garder hors de la portée des enfants.</b><br>Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.                                                                                                                  |
| <b>Mode d'emploi</b><br>Adultes et enfants de 12 ans et plus :<br>•Dissoudre le contenu de 1 sachet dans 225 mL (1 tasse) d'eau bouillante. •Prendre toutes les 6 heures, au besoin. •Ne pas prendre plus de 4 sachets en 24 heures.<br>•Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser.<br>•Ne pas dépasser la quantité indiquée (voir Avertissement – foie). •N'utiliser que sur l'indication d'un médecin. •Il s'agit d'une unité posologique non standard. |
| <b>Autres renseignements</b><br>• Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation.<br>• Conserver les sachets inviolables à l'épreuve des enfants à la température ambiante (15 à 25 °C).                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ingrédients inactifs</b> Acésulfame potassique, acide citrique, arômes (contient du soja), aspartame (contient de la phénylalanine), citrate de sodium, dioxyde de silicium, D&C jaune n° 10, FD&C bleu n° 1, FD&C rouge n° 40, maltodextrine, phosphate de calcium tribasique, saccharose.                                                                                                                                                               |
| <b>Questions?</b><br>Composer le 1-888-788-8181<br>www.neocitran.ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

NEOCITRAN

ULTRA STRENGTH FLU & COLD  
ULTRA FORT GRIPPE ET RHUME

NIGHT NUIT

Contains Acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

NEW! NOUVEAU!

DIN 02554593

HALEON

NEOCITRAN

ULTRA STRENGTH FLU & COLD  
ULTRA FORT GRIPPE ET RHUME

NIGHT NUIT

Headache & fever  
Sore throat pain  
Minor body aches & pain  
Dry cough  
Runny nose & sneezing

Maux de tête et fièvre  
Maux de gorge  
Douleurs et courbatures légères  
Toux sèche  
Écoulement nasal et éternuements

SO YOU CAN REST  
POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOUS REPOSER

10 SINGLE DOSE POUCHES (POWDER) / 10 SACHETS À DOSE UNIQUE (POUDRE)

Honey Lemon  
Miel et citron



LOT  
EXP



0 60815 40411 0

| Drug Facts (continued)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>● Keep out of reach of children.</b><br>This package contains enough drug to seriously harm a child.<br>In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.                                                                                                   |
| <b>Directions</b><br>Adults and children 12 years and over:<br>•Dissolve the contents of 1 pouch into 225 mL (one cup) of boiling water. •May be taken every 6 hours. •Do not take more than 4 pouches in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings). •Use only on the advice of a doctor. •This is not a standard dosage unit. |
| <b>Other information</b><br>• Keep and consult carton for important information before each use<br>• Store tamper evident, child-resistant pouches at room temperature 15 – 25°C                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inactive ingredients</b> Acesulfame potassium, aspartame (contains phenylalanine), citric acid, D&C Yellow No.10, FD&C Blue No.1, FD&C Red No.40, flavours (contains soy), maltodextrin, silicon dioxide, sodium citrate, sucrose, tribasic calcium phosphate                                                                                                                    |
| <b>Questions?</b><br>Call 1-888-788-8181<br>www.neocitran.ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Haleon Canada ULC/SRI, Mississauga, ON L5R 4B2<br>Trademarks are owned by or licensed to the Haleon group of companies. / Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés Haleon. ©2025 Haleon group of companies or its licensor. / Groupe de sociétés Haleon ou son concédant de licence.                                               |