


Robitussin Robitussin

CHILDREN'S COLD RHUME POUR ENFANTS

Dye Free

- Temporarily Relieves:
- ✓ Runny Nose
- ✓ Sneezing
- ✓ Stuffy Nose
- Due to colds




Sweetened with Sorbitol Sugar Free • Alcohol Free 100 mL Syrup

DIN 02394693

GRAPE

SANS COLORANT

- Soulage temporairement :
- ✓ L'écoulement nasal
- ✓ Les éternuements
- ✓ La congestion nasale associée au rhume



Édulcoré avec du sorbitol Sans sucre • Sans alcool 100 mL sirop

DIN 02394693

RAISIN

Robitussin

CHILDREN'S COLD RHUME POUR ENFANTS

Drug Facts / Info-médicament

| Active ingredients (in 1 teaspoon or 5 mL) | Purpose |
|--|---------------|
| Brompheniramine Maleate 2 mg | Antihistamine |
| Phenylephrine Hydrochloride (PE) 5 mg | Decongestant |

| Ingédients actifs (dans 1 cuillère à thé [5 mL]) | Utilité |
|--|------------------|
| 2 mg de maleate de bromphéniramine | Antihistaminique |
| 5 mg de chlorhydrate de phényléphrine (PE) | Décongestionnant |

Warnings Do not use with other cough and cold drugs with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI), drugs for depression or for 2 weeks after stopping these drugs if child is allergic to any of the ingredients.

Ask a doctor or pharmacist before use if you have a child with heart or thyroid disease, high blood pressure, diabetes, difficulty breathing, chronic lung disease (i.e. chronic bronchitis, asthma, or emphysema), glaucoma, difficulty urinating, taking any other drugs, natural health products, sedatives, tranquilizers or sympathomimetics.

When using this product drowsiness or excitability may occur do not use when child is engaged in activities requiring mental alertness.

Stop use and ask a doctor if symptoms worsen/last more than 7 days child has a high fever (38°C) or a cough with thick yellow/green phlegm allergic reactions (e.g. wheezing/rash/itching), breathing difficulties, convulsions, drowsiness, hallucinations, rapid heart rate, nervousness, dizziness or insomnia develop.

Keep out of reach of children. In case of overdose, call a Poison Control Centre or doctor right away even if the user does not notice any signs and symptoms.

Mises en garde Ne pas utiliser avec d'autres médicaments contre la toux et le rhume pendant la prise d'un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO) ou d'un médicament contre la dépression, ainsi que dans les 2 semaines suivant un tel traitement si l'enfant est allergique à l'un des ingrédients.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare U.S., Mississauga, ON L5R 4E2. Trademarks owned or licensed by GSK. M, de détenir ou liées sous licence par GSK. ©2021 GSK or licensee, GSK ou son concédant de licence.



PAA186813



• Children under 6 years: do not use. • Use only measuring device provided.

Mode d'emploi • Enfants de 6 à moins de 6 ans : ne pas utiliser. • Utilisez que la mesure graduée fournie.

Les 4,3,6 heures. • Ne pas dépasser la dose unique ni prendre plus de 6 doses (30 mL) en 24 heures. En cas de surdosage, ce produit peut se révéler très nocif. • Enfants de moins de 6 ans : ne pas utiliser. • Utilisez que la mesure graduée fournie.

Other information Store at room temperature (15°C - 30°C). This package has a child resistant cap. (Child carton and cap is tamper resistant.) Caloric content: 7.7 kcal/5 mL.

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C). Cet emballage est muni d'un bouchon à l'épreuve des enfants. Ne pas utiliser si le rabat encolle est brisé. Apport calorique : 7,7 kcal/5 mL.

Inactive ingredients Citric acid, flavour, propylene glycol, sodium benzoate, sorbitol, water.

Ingédients inactifs Acide citrique, arôme, benzoate de sodium, eau, propylène glycol, sorbitol.

Questions? 1-888-275-8888
www.robitussin.ca

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous

- avez un enfant atteint/avant une maladie cardiaque ou thyroïdienne
- d'hypertension • de diabète • une maladie pulmonaire chronique (c.-à-d. bronchite chronique, asthme, emphyseme) • de la difficulté à uriner • avez un enfant qui prend tout autre médicament, produit de santé naturel, sédatif, tranquillisant ou sympathomimétique.

Lorsque vous utilisez ce produit • de la somnolence ou de l'excitation peuvent survenir • les enfants ne doivent pas conduire ou opérer des machines s'adonnant à des activités qui nécessitent une certaine vigilance.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si • les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours • l'enfant a une forte fièvre (> 38 °C) ou une toux avec d'épaisses expectorations jaunâtres/verdâtres • l'enfant a des difficultés respiratoires (respiration sifflante/éouffon, cyanose/démangeaisons), des difficultés respiratoires, des convulsions, de la somnolence, des hallucinations, une accélération du rythme cardiaque, de la nervosité, des étourdissements ou de l'insomnie se manifestent.

Ne donner pas ce produit aux enfants. En cas de surdosage, consultez immédiatement un médecin ou un centre antipoison même si l'utilisateur ne ressent pas de signes ni de symptômes.

Directions • Children 6 to under 12 years: give 1 tsp (5 mL) every 4 to 6 hours. • Do not exceed single dose and maximum 6 doses (30 mL) in 24 hours. Overdose may result in serious harm

