

Robitussin Robitussin


**CHILDREN'S
COUGH
& COLD**
BEDTIME

**TOUX ET
RHUME
POUR ENFANTS**
BONNE NUIT

DYE FREE

Temporarily Relieves:

- ✓ Dry Coughs
 - ✓ Runny Nose
 - ✓ Sneezing
 - ✓ Stuffy Nose
- Due to colds



Sweetened
with Cyclamate, Maltol
& Sorbitol
Sugar Free • Alcohol Free
100 mL Syrup
DIN 02394707

CHERRY

SANS COLORANT

Soulage temporairement :

- ✓ La toux sèche
- ✓ L'écoulement nasal
- ✓ Les éternuements
- ✓ La congestion nasale associée au rhume



Édulcoré
avec du cyclamate,
du maltol et du sorbitol
Sans sucre • Sans alcool
100 mL sirop
DIN 02394707

CERISE

Robitussin

**CHILDREN'S
COUGH & COLD
TOUX ET RHUME
POUR ENFANTS**
BEDTIME/BONNE NUIT

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in 1 teaspoon or 5 mL)	Purpose
Brompheniramine Maleate 2 mg	Antihistamine
Dextromethorphan Hydrobromide 10 mg	Cough Suppressant
Phenylephrine Hydrochloride 5 mg	Decongestant
Ingédients actifs (dans 1 cuillère à thé [5 mL])	Utilité
2 mg de maléate de bromphéniramine	Antihistaminique
10 mg de bromhydrate de dextrométhorphane	Antitussif
5 mg de chlorhydrate de phényléphrine	Décongestionnant

Warnings

Do not use • with other cough and cold drugs
• a monoamine oxidase inhibitor (MAOI), a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) or other drugs for depression, psychiatric, or emotional conditions, or Parkinson's disease, or for 2 weeks after stopping these drugs • if child is allergic to any of the ingredients.

Ask a doctor or pharmacist before use if you have a child with • a chronic cough • a cough with excessive thick yellow / green mucus • difficulty breathing • chronic lung disease (i.e. chronic bronchitis, asthma, or emphysema). These could be signs of a serious condition.

• heart or thyroid disease, high blood pressure, diabetes • glaucoma • difficulty urinating • taking any other drugs, natural health products, sedatives, tranquilizers or sympathomimetics.

When using this product • drowsiness or excitability may occur • sedatives and tranquilizers may increase drowsiness. Do not use when child is engaged in activities requiring mental alertness.

Stop use and ask a doctor if • symptoms worsen/last more than 7 days • child has a high fever (>38°C), rash, persistent headache • child is nervous, dizzy, can't sleep • allergic reactions (e.g. wheezing / rash / itching), breathing difficulties, convulsions, drowsiness, hallucinations & rapid heart rate develop.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare LLC, Mississauga, ON L5R 4G2. Trademarks owned or licensed by GSK. M. de r. détenus ou utilisés sous licence par GSK. ©2021 GSK or licensee, GSK ou son concédant de licence.



0 62107 48700 9

PAA166816



Robitussin Robitussin


**CHILDREN'S
COUGH
& COLD**
BEDTIME

**TOUX ET
RHUME
POUR ENFANTS**
BONNE NUIT

DYE FREE

Temporarily Relieves:

- ✓ Dry Coughs
 - ✓ Runny Nose
 - ✓ Sneezing
 - ✓ Stuffy Nose
- Due to colds



Sweetened
with Cyclamate, Maltol
& Sorbitol
Sugar Free • Alcohol Free
100 mL Syrup
DIN 02394707

CHERRY

SANS COLORANT

Soulage temporairement :

- ✓ La toux sèche
- ✓ L'écoulement nasal
- ✓ Les éternuements
- ✓ La congestion nasale associée au rhume



Édulcoré
avec du cyclamate,
du maltol et du sorbitol
Sans sucre • Sans alcool
100 mL sirop
DIN 02394707

CERISE

Robitussin

**CHILDREN'S
COUGH & COLD
TOUX ET RHUME
POUR ENFANTS**
BEDTIME/BONNE NUIT

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in 1 teaspoon or 5 mL)	Purpose
Brompheniramine Maleate 2 mg	Antihistamine
Dextromethorphan Hydrobromide 10 mg	Cough Suppressant
Phenylephrine Hydrochloride 5 mg	Decongestant
Ingédients actifs (dans 1 cuillerée à thé [5 mL])	Utilité
2 mg de maléate de bromphéniramine	Antihistaminique
10 mg de bromhydrate de dextrométhorphane	Antitussif
5 mg de chlorhydrate de phényléphrine	Décongestionnant

Warnings

Do not use • with other cough and cold drugs
• a monoamine oxidase inhibitor (MAOI), a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) or other drugs for depression, psychiatric, or emotional conditions, or Parkinson's disease, or for 2 weeks after stopping these drugs • if child is allergic to any of the ingredients.

Ask a doctor or pharmacist before use if you have a child with • a chronic cough • a cough with excessive thick yellow / green mucus • difficulty breathing • chronic lung disease (i.e. chronic bronchitis, asthma, or emphysema). These could be signs of a serious condition.

• heart or thyroid disease, high blood pressure, diabetes • glaucoma • difficulty urinating

• taking any other drugs, natural health products, sedatives, tranquilizers or sympathomimetics.

When using this product • drowsiness or excitability may occur • sedatives and tranquilizers may increase drowsiness. Do not use when child is engaged in activities requiring mental alertness.

Stop use and ask a doctor if • symptoms worsen/last more than 7 days • child has a high fever (>38°C), rash, persistent headache • child is nervous, dizzy, can't sleep • allergic reactions (e.g. wheezing / rash / itching), breathing difficulties, convulsions, drowsiness, hallucinations & rapid heart rate develop.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare LLC, Mississauga, ON L5R 4G2. Trademarks owned or licensed by GSK. M. de r. détenus ou utilisés sous licence par GSK. ©2021 GSK or licensee, GSK ou son concédant de licence.



0 62107 48700 9

PAA166816



Caloric Content: 10.3 kcal / 5 mL

Autres renseignements
 Conserver à la température ambiante (15-30 °C). Cet emballage est muni d'un bouchon à l'épreuve des enfants. Ne pas utiliser s'il y a un rabat encollé est brisé. Apport calorique : 10.3 kcal / 5 mL.

Inactive ingredients Citric acid, flavour, maltol, propylene glycol, sodium benzoate, sodium cyclamate, sorbitol, water.

Ingredients inactifs Acide citrique, arôme, benzoate de sodium, cyclamate de sodium, eau, maltol, propylène glycol, sorbitol.

Questions? 1-888-275-6938
www.cobitusin.ca

plus de 7 jours. ● une forte fièvre (> 38 °C), des éruptions cutanées ou des maux de tête persistants surviennent. ● l'enfant se sent nerveux ou ébroué, ou fait de la toux, de la fièvre, ou présente une éruption cutanée / démangeaisons, des difficultés respiratoires, des convulsions, de la somnolence, des hallucinations et une accélération du rythme cardiaque surviennent.

Garder hors de la portée des enfants. En cas de surdosage, appeler un médecin ou un pharmacien ou un centre antipoison, même en l'absence de signes et de symptômes.

Directions ● Children 6 to under 12 years: ● 6 to 11 years: ● 2 to 5 years: ● 1 to 6 years: ● Do not exceed single dose and maximum 6 doses (30 mL) in 24 hours. Overdose may result in serious harm ● Children under 6 years: Do not use. ● Use only measuring device provided.

Mode d'emploi ● Enfants de 6 à moins de 12 ans : 1 c. à thé (5 mL), toutes les 4 à 6 heures. ● Ne pas dépasser la dose unique et ne pas prendre plus de 6 doses (30 mL) en 24 heures. En cas de surdosage, ce produit peut se révéler très nocif. ● Enfants de moins de 6 ans : ne pas utiliser. ● N'utiliser que la mesure graduée fournie.

Other information Store at room temperature (15° C - 30° C). This package has a child resistant cap. If glued carton end flap is broken, do not use.

Keep out of reach of children. In case of overdose, call a Poison Control Centre or doctor right away, even if you do not notice any signs or symptoms.

Mises en garde
 Ne pas utiliser ● avec d'autres médicaments contre la toux et le rhume ● pendant la prise d'un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO), d'un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (RS) ou d'autres médicaments contre la dépression, un trouble psychiatrique, un trouble de l'humeur ou la maladie de Parkinson, ainsi que dans les 2 semaines suivant un tel traitement. ● si l'enfant est allergique à l'un des ingrédients.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous présentez l'un des symptômes suivants: ● chronique ou une toux accompagnée d'une production excessive de mucus épais jaunâtre / verdâtre ● une maladie pulmonaire chronique (c.-à-d. bronchite chronique, asthme ou emphysème) ● de la difficulté à respirer, ces signes pourraient indiquer un problème grave ● de la difficulté à uriner ● de la difficulté à uriner ● de l'hypertension ou du diabète ● le glaucome ● de la difficulté à uriner ● utilisez tout autre médicament, des produits de santé naturels, des sédatifs, des tranquillisants ou des sympathomimétiques.

Lorsque vous utilisez ce produit
 ● Les somnolence et la somnolence peuvent accroître la somnolence. Les enfants ne doivent pas prendre ce produit lorsqu'ils s'adonnent à des activités qui nécessitent une certaine vigilance.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si ● les symptômes s'aggravent ou persistent



100 parts
 100 parts

Caloric Content: 10.3 kcal / 5 mL

Autres renseignements
 Conserver à la température ambiante (15-30 °C). Cet emballage est muni d'un bouchon à l'épreuve des enfants. Ne pas utiliser s'il y a un rabat encollé est brisé. Apport calorique : 10.3 kcal / 5 mL.

Inactive ingredients Citric acid, flavour, maltol, propylene glycol, sodium benzoate, sodium cyclamate, sorbitol, water.

Ingredients inactifs Acide citrique, arôme, benzoate de sodium, cyclamate de sodium, eau, maltol, propylène glycol, sorbitol.

Questions? 1-888-275-6938
www.cobitusin.ca

plus de 7 jours. ● une forte fièvre (> 38 °C), des éruptions cutanées ou des maux de tête persistants surviennent. ● l'enfant se sent nerveux ou ébroué, ou fait de la toux, de la fièvre, ou présente une éruption cutanée / démangeaisons, des difficultés respiratoires, des convulsions, de la somnolence, des hallucinations et une accélération du rythme cardiaque surviennent.

Garder hors de la portée des enfants. En cas de surdosage, appeler votre médecin ou un centre antipoison, même en l'absence de signes et de symptômes.

Directions ● Children 6 to under 12 years: ● Use only the measuring device provided. ● Do not exceed single dose and maximum 6 doses (30 mL) in 24 hours. Overdose may result in serious harm ● Children under 6 years: Do not use. ● Use only measuring device provided.

Mode d'emploi ● Enfants de 6 à moins de 12 ans : 1 c. à thé (5 mL), toutes les 4 à 6 heures. ● Ne pas dépasser la dose unique et ne prendre plus de 6 doses (30 mL) en 24 heures. En cas de surdosage, ce produit peut se révéler très nocif. ● Enfants de moins de 6 ans : ne pas utiliser. ● N'utiliser que la mesure graduée fournie.

Other information Store at room temperature (15°C - 30°C). This package has a child resistant cap. If glued carton end flap is broken, do not use.

Keep out of reach of children. In case of overdose, call a Poison Control Centre or doctor right away, even if you do not notice any signs or symptoms.

Mises en garde
 ● Ne pas utiliser ● avec d'autres médicaments contre la toux et le rhume ● pendant la prise d'un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO), d'un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (RS) ou d'autres médicaments psychotropes. ● En cas de trouble psychiatrique, un trouble de l'humeur ou la maladie de Parkinson, ainsi que dans les 2 semaines suivant un tel traitement. ● si l'enfant est allergique à l'un des ingrédients.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous présentez l'un des symptômes suivants : ● chronique ou une toux accompagnée d'une production excessive de mucus épais jaunâtre / verdâtre ● une maladie pulmonaire chronique (c.-à-d. bronchite chronique, asthme ou emphysème) ● de la difficulté à respirer, ces signes pourraient indiquer un problème grave, tel qu'une infection des voies respiratoires, de l'hyperension ou du diabète. ● le glaucome ● de la difficulté à uriner ● utilisez tout autre médicament, des produits de santé naturels, des sédatifs, des tranquillisants ou des sympathomimétiques.

Lorsque vous utilisez ce produit
 ● Les somnolence et la somnolence peuvent accroître la somnolence. Les enfants ne doivent pas prendre ce produit lorsqu'ils s'adonnent à des activités qui nécessitent une certaine vigilance.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si ● les symptômes s'aggravent ou persistent



100 parts
 100 parts