

Robitussin

EXTRA STRENGTH/EXTRA FORT

COUGH & COLD
TOUX ET RHUME

Robitussin

EXTRA STRENGTH

COUGH
& COLD



- ✓ Loosens Mucus & Phlegm
- ✓ Relieves Chest Congestion
- ✓ Controls Dry Cough
- ✓ Relieves Stuffy Nose
- ✓ Soothes Throat

Alcohol Free
100 mL Syrup
DIN 02172380




Cherry Flavour

Robitussin

EXTRA FORT

TOUX ET
RHUME



- ✓ Déloge le mucus et le flegme
- ✓ Soulage la congestion bronchique
- ✓ Contrôle la toux sèche
- ✓ Soulage la congestion nasale
- ✓ Apaise la gorge

Sans alcool
100 mL sirop
DIN 02172380



Saveur de cerise

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in 1 Teaspoon or 5 mL)	Purpose
Dextromethorphan Hydrobromide (DM) 15 mg	Cough Suppressant
Guafenesin (extra strength) 200 mg	Expectorant
Pseudoephedrine Hydrochloride (PSE) 30 mg	Decongestant

Ingrédients actifs (dans 1 cuillère à thé [5 mL])	Utilité
15 mg de bromhydrate de dextrométhorphan (DM)	Antitussif
200 mg de guaifénésine (extra fort)	Expectorant
30 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine (PSE)	Décongestionnant

Warnings

Do not use with other cough and cold drugs
 • a monoamine oxidase inhibitor (MAOI), a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), or other drugs for depression, psychiatric, or emotional conditions, or Parkinson's disease, or for 2 weeks after stopping these drugs
 • if you have an allergy to dextromethorphan or any of the listed ingredients.

Ask a doctor or pharmacist before use if you have/are
 • a persistent/chronic cough (as occurs with smoking)
 • a cough with excessive mucus
 • shortness of breath or chronic lung disease (e.g. asthma or emphysema) These could be signs of a serious condition
 • high blood pressure
 • heart or thyroid disease
 • diabetes
 • glaucoma
 • difficulty or pain when urinating
 • taking a high blood pressure drug
 • pregnant or breastfeeding
 • are taking medication for weight control
 • have any other serious medical condition.

Stop use and ask a doctor if
 • symptoms worsen or last more than 7 days
 • you develop a fever (>38°C), rash, persistent headache or thick yellow or green mucus is present
 • are nervous, dizzy or can't sleep
 • have difficulty or pain when urinating
 • you have: allergic reaction, wheezing, itching, breathing difficulties, convulsions, drowsiness, hallucinations, and rapid heart rate
 • any new symptoms appear.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare LLC, Mississauga, ON L5R 4B2
 Trademarks owned or licensed by GSK.
 M, de c, dérivées ou utilisées sous licence par GSK.
 ©2021 GSK or its associated GSK ou son concédant de licence.



0 62107 48100 7

PAA172320



Ingédients actifs: Acide citrique, arôme, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, eau, glycérine, polyéthylène glycol, propylène glycol, poudr. n. 40 FD&C, saccharine sodique, sirop de ment et Sorbitol.

Questions? 1-888-275-8938
www.robitussin.ca

● vous avez de la difficulté à uriner ou ressentez une douleur lorsque vous urinez ● un des symptômes suivants se manifeste : réaction allergique, gonflement de la gorge, difficultés respiratoires, convulsions, somnolence, hallucinations ou accélération du rythme cardiaque ● tout nouveau symptôme se manifeste.

Garder hors de la portée des enfants ● Ne pas utiliser sans l'avis d'un médecin ● Appelez immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Directions ● Adultes (12 years & over): 2 tsp (10 mL) ● Take every 4 hours ● Do not use more than 4 doses/day ● Children under 12 years: do not use.

Mode d'emploi ● Adultes (12 ans et plus) : 2 c. à thé (10 mL) ● Prendre toutes les 6 heures ● Ne pas prendre plus de 4 doses par jour ● Enfants de moins de 12 ans : ne pas utiliser.

Other information Store at room temperature (15°C - 30°C). If glued carton end flap is broken, do not use.

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C). Ne pas utiliser si le rabat encolle est brisé.

Inactive ingredients Citric acid, corn syrup, FD&C Red No. 40, flavour, glycerin, polyethylene glycol, propylene glycol, sodium benzoate, sodium carboxymethylcellulose, sodium saccharin, sorbitol and water.

Keep out of reach of children. In case of overdose, call a Poison Control Centre or doctor right away.

Ni se pas utiliser ● avec d'autres médicaments contre la toux et le rhume ● pendant la prise d'un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO), d'un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS) ou d'autres médicaments contre le stress, le trouble psychiatrique, un trouble de l'humeur ou la maladie de Parkinson, ainsi que dans les 2 semaines suivant l'arrêt d'un tel traitement ● en cas d'allergie au dextrométhorphan ou à un autre des ingrédients du produit.

Consultez un médecin ou un pharmacien immédiatement si vous ● souffrez ● d'un toux persistante chronique (comme la toux des fumeurs) ● d'une toux accompagnée d'une production excessive de mucus ● d'essoufflement ou d'une maladie pulmonaire chronique (p. ex., asthme ou emphyseme) ● ces signes pourraient indiquer ● une maladie ● d'hypertension ● d'une maladie cardiaque ou thyroïdienne ● de diabète ● de glaucome ● avez de la difficulté à uriner ou ressentez une douleur lorsque vous urinez ● prenez un médicament contre l'hypertension ● êtes enceinte ou envisagez d'être enceinte ● souffrez de tout autre problème grave.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si ● les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours ● de la fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée, des maux de tête persistants, d'aggravation des symptômes ● jaunissement de la peau ● vous sentez nerveux ou étourdi, ou fatigué de l'insomnie



PA4172621

100% pain relief