

Robitussin

MUCUS ET FLEGME

Sirop de guaifénésine USP



- ✓ Déloge le mucus et le flegme
- ✓ Soulage la congestion bronchique
- ✓ Apaise la gorge

250 mL sirop
DIN 01931032

Saveur de cerise



Robitussin

MUCUS & PHLEGM MUCUS ET FLEGME

Guaifenesin Syrup USP/Sirop de guaifénésine USP

Robitussin

MUCUS & PHLEGM

Guaifenesin Syrup USP



- ✓ Loosens Mucus & Phlegm
- ✓ Relieves Chest Congestion
- ✓ Soothes Throat

250 mL Syrup
DIN 01931032

Cherry Flavour



Info-médicament

Ingrédient actif (dans 1 cuillerée à thé [5 mL])	Utilité
100 mg de guaifénésine.....	Expectorant

Mises en garde
Ne pas utiliser avec : d'autres médicaments contre la toux et le rhume.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous : souffrez d'une toux persistante/chronique (comme la toux des fumeurs) d'une autre maladie pulmonaire chronique (p. ex., asthme ou emphyseme) avez de la difficulté à respirer êtes sous les soins d'un médecin êtes enceinte ou allaitez.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si : les symptômes persistent plus de 7 jours de la fièvre, une éruption cutanée ou des maux de tête persistants surviennent vos crachats sont épais et jaunâtres ou verdâtres.

● Garder hors de la portée des enfants. En cas de surdoses, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Mode d'emploi
● Adultes (12 ans et plus) : 2 à 4 c. à thé (10 à 20 mL)
● Enfants de moins de 12 ans : **NE PAS UTILISER**
● Prendre toutes les 6 heures
● Ne pas prendre plus de 4 doses par jour.

Autres renseignements
Conserver à la température ambiante (15-30 °C).
Ne pas utiliser si le rabat encoilé est brisé.

Ingrédients inactifs
Acide citrique, alcool, arôme, benzoate de sodium, chlorure de sodium, colorant caramel, eau, glycérine, rouge n° 40 FD&C et sucre inverti.

Questions? 1-888-275-9938 www.robitussin.ca

Drug Facts

Active ingredient (in 1 teaspoon or 5 mL)	Purpose
Guaifenesin 100 mg.....	Expectorant

Warnings
Do not use with other cough and cold medication.
Ask a doctor or pharmacist before use if you have/are :
● a persistent/chronic cough (as occurs with smoking)
● difficulty breathing ● other chronic lung disease (e.g. asthma or emphysema) ● under a doctor's care
● pregnant or breastfeeding.

Stop use and ask a doctor if : ● symptoms last more than 7 days ● a fever, rash, persistent headache is present ● you cough up thick yellow or green mucus.
● Keep out of reach of children. In case of overdose, call a Poison Control Centre or doctor right away.

Directions
● Adults (12 years & over): 2-4 tsp. (10-20 mL)
● Children under 12 years: **DO NOT USE**
● Take every 6 hours
● Do not exceed maximum 4 doses/day.

Other information
Store at room temperature (15°-30°C).
If glued carton end flap is broken, do not use.

Inactive ingredients
Alcohol, caramel colour, citric acid, FD&C Red No. 40, flavour, glycerin, invert sugar, sodium benzoate, sodium chloride and water.

Questions? 1-888-275-9938 www.robitussin.ca

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC,
Mississauga, ON L5R 4B2
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2021 GSK group of companies or its licensors.
Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.



PAA169885

