

PRIMARIO: SOBRE/ SACHET

Frente	Frente
Polvo Efervescente SAL ANDREWS Clásica 5 g	Sparkling Salts ANDREWS SALTS Original 5 g
Claims	Claims
Alivio al instante	Instant Relief
Información del Producto	Drug Facts
Cada sobre de 5 g de contiene: Bicarbonato de Sodio 2,18 g. Sulfato de Magnesio 0,88 g. Sacarina Sódica 2,50 mg. Ácido Cítrico 1,835 g. Carbonato de Sodio 0,1 g.	Each 5 g sachet of powder contains: Sodium Bicarbonate 2,18 g. Magnesium Sulfate 0,88 g. Sodium Saccharin 2,50 mg. Citric Acid 1,835 g. Sodium Carbonate 0,1 g.
Usos	Uses
Alivio rápido del malestar estomacal, la acidez, la sensación de llenura, la indigestión y otras molestias por excesos en el comer o beber.	Quickly settles the stomach, relieves heartburn, biliousness and acid indigestion.
Dosis	Dose
Adultos y niños mayores de 12 años. Como antiácido: Disuelva un sobre en medio vaso de agua. Repita si es necesario. Como digestivo y para restaurar la regularidad intestinal: Disuelva dos sobres en medio vaso de agua antes de acostarse o antes del desayuno. No exceda la dosis máxima de 2 sobres en 24 horas. Puede ser tomado mientras esté efervescente o dejándolo reposar según el gusto.	Adults and children 12 years and older. As antacid: Dissolve one sachet in half a glass of water. Repeat if necessary. As digestive and to recover bowel regularity: Dissolve two sachets in half a glass of water before going to bed or before breakfast. Do not exceed the maximum dose of 2 sachets in 24 hours. May be taken while effervescent or after settling according to your preference.
Advertencias y Precauciones	Warnings and Precautions
NO USE SI EL SOBRE ESTÁ ROTO. No usar si tiene dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de apendicitis. No exceda la dosis recomendada, ni lo utilice por más de dos semanas excepto por recomendación médica. No tomar conjuntamente con productos lácteos. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.	USE ONLY IF THE SACHET IS INTACT. Do not use if you experience stomach pain, vomiting and other symptoms of appendicitis Do not exceed the recommended dosage. Do not use for more than two weeks unless your doctor recommends it. Do not take along with dairy products. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Consulte a su Médico si:	Consult a Doctor If:
Está consumiendo otros medicamentos. Los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran. Sufrir de hipertensión o de alguna enfermedad del corazón. Está sometido a una dieta pobre en sal. (Cada sobre contiene 0,64 g de sodio). Está embarazada o en período de lactancia. En caso de sobredosis accidental.	You are taking other medication. Symptoms persist for more than 3 days or worsen. You suffer from hypertension or a heart disease. You are on a low salt diet (Each sachet contains 0,64 g of sodium). You are pregnant or breastfeeding. In case of overdose.

Contraindicaciones:	Contraindications:
Alergia a los componentes de la fórmula. No administrar en pacientes con enfermedad de riñones o de hígado, ni en pacientes con sangrado rectal.	Allergy to the formula components. Do not administer to patients with kidney or liver disease, or to patients with rectal bleeding.
Interacciones:	Interactions
No se use con anticolinérgicos, quinolonas, efedrina, litio, salicilatos y tetraciclinas.	Do not use with anticholinergics, quinolones, ephedrine, lithium, salicylates or tetracyclines.
Reacciones Adversas:	Adverse Reactions:
A dosis recomendada ninguna.	None at the recommended doses.
Información Adicional:	Other Information:
Consérvese a menos de 30°C. Vía Oral. Venta libre.	Store below 30°C. Oral Use. Free Sale.

SECUNDARIO: ESTUCHE / PACKAGE (12´s -50´s)

Frente	Frente
Polvo Efervescente SAL ANDREWS Clásica Malestar Estomacal, Acidez, Indigestión 12 sobres / 50 sobres	Sparkling Salts ANDREWS SALTS Original Upset Stomach, Heartburn, Indigestion 12 sachets / 50 sachets
Claims	Claims
Alivio al instante	Instant Relief
Información del Producto	Drug Facts
Cada sobre de 5 g de Sal Andrews Clásica contiene: Bicarbonato de Sodio 2,18 g. Sulfato de Magnesio 0,88 g. Sacarina Sódica 2,50 mg. Ácido Cítrico 1,835 g. Carbonato de Sodio 0,1 g.	Each 5 g sachet of ANDREWS Salts Original powder contains: Sodium Bicarbonate 2,18 g. Magnesium Sulfate 0,88 g. Sodium Saccharin 2,50 mg. Citric Acid 1,835 g. Sodium Carbonate 0,1 g.
Forma Farmacéutica	Pharmaceutical Form
Polvo	Powder
Usos	Uses
Alivio rápido del malestar estomacal, la acidez, la sensación de llenura, la indigestión y otras molestias por excesos en el comer o beber.	Quickly settles the stomach, relieves heartburn, biliousness and acid indigestion.
Dosis	Dose
Adultos y niños mayores de 12 años. Como antiácido: Disuelva un sobre en medio vaso de agua. Repita si es necesario. Como digestivo y para restaurar la regularidad intestinal: Disuelva dos sobres en medio vaso de agua antes de acostarse o antes del desayuno. No exceda la dosis máxima de 2 sobres en 24 horas. Sal Andrews Clásica puede ser tomado mientras esté efervescente o dejándolo reposar según el gusto.	Adults and children 12 years and older. As antacid: Dissolve one sachet in half a glass of water. Repeat if necessary. As digestive and to recover bowel regularity: Dissolve two sachets in half a glass of water before going to bed or before breakfast. Do not exceed the maximum dose of 2 sachets in 24 hours. Andrews Salts Original may be taken while effervescent or after settling according to your preference.
Advertencias y Precauciones	Warning and Precautions
NO USE SI EL SOBRE ESTÁ ROTO •No usar si tiene dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de apendicitis. •No exceda la dosis recomendada, ni lo utilice por más de dos semanas excepto por recomendación médica. •No tomar conjuntamente con productos lácteos. •MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.	• USE ONLY IF THE SACHET IS INTACT. • Do not use if you experience stomach pain, vomiting and other symptoms of appendicitis. •Do not exceed the recommended dosage. •Do not use for more than two weeks unless your doctor recommends it. •Do not take along with dairy products. • KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Consulte a su Médico si:	Consult a Doctor If:
•Está consumiendo otros medicamentos • Los	• You are taking other medication. • Symptoms

síntomas persisten por más de 3 días o empeoran. •Sufre de hipertensión o de alguna enfermedad del corazón. •Está sometido a una dieta pobre en sal. (Cada sobre contiene 0,64 g de sodio) •Está embarazada o en período de lactancia •En caso de sobredosis accidental.	persist for more than 3 days or worsen. • You suffer from hypertension or a heart disease. • You are on a low salt diet (Each sachet contains 0,64 g of sodium). • You are pregnant or breastfeeding. • In case of overdose.
Contraindicaciones:	Contraindications:
Alergia a los componentes de la fórmula. No administrar en pacientes con enfermedad de riñones o de hígado, ni en pacientes con sangrado rectal.	Allergy to the formula components. Do not administer to patients with kidney or liver disease, or to patients with rectal bleeding.
Interacciones:	Interactions
No se use con anticolinérgicos, quinolonas, efedrina, litio, salicilatos y tetraciclinas.	Do not use with anticholinergics, quinolones, ephedrine, lithium, salicylates or tetracyclines.
Reacciones Adversas:	Adverse Reactions:
A dosis recomendada ninguna.	None at the recommended doses.
Información Adicional:	Other Information:
Consérvese a menos de 30°C. Vía Oral. Venta libre.	Store below 30°C. Oral Use. Free Sale.