
## FRONT LEADING EDGE

## BACK LEADING EDGE



بالأمنوتامين). يمكن أن يودي الاستخدام المترّ أمن لفوتايل إفرين مع أمونات الأدوية المحفزة للجهاز السمياتالي إلى زيادة مخا الأكار الجانبية القلبية لو عاتبة.	gsk		
<ul> <li>تناثر الديج كسين والجليكوسيدات القلبية: إن استخدام الفيذايل إفرين المتزامن مع الديجوكسين أو جليكوسيدات القلبية يزريد م</li> <li>انتظام ضربات القلب أو حدوث الدوبات القلبية.</li> </ul>		/////	25.0
<ul> <li>تناؤل الوارفارين والأدوية المضادة للتجلط: قد يزداد التأثير المضاد للتجلط للوارفارين ومركبات الكومارين الأخرى عند الا</li> </ul>	نشرة معلومات للمريض		C
اليومي المطول للبار استِئامول مع زيادة خطر الذريف؛ بينما الجر عات العرضية ليس لها تأثير ملحوظ. - سوف يزيد الإرجونامين وموثيل سيرجيد من مخاطر الإصابة بالتسم الأرغوني.	N N		
تَناوُل مِتْبِطَاتَ المونو أمين أوكسينيز : يمكن أن يؤدي الاستخدام المتزامن لفينايل إفرين مع أمينات محاكيات الودي الأخرى إلى ز			
حدوث الآثار الجانبية القلبية الوعاتية. يمكن أن يزيد الكانبين من تخلص الجسم من الليثيوج. وإذا تم تناول الكانبين بالتزامن مع الدواء، فمن المستحسن نظيل نتاول الكانبين ا		777/	
د. الخصوبة، الحمل والرضاعة الطبيعية:			
لا يُنصح باستخدام هذا المنتج أثناء الحمل بسبب محتوى القينايل إفرين و الكانيين. هناك مخاطر محتملة متز ايدة لاتخفاض الوزن عند الولادة والإجهاض الثلقائي المرتبط بتناول الكانيين أثناء الحمل.			
لا يجب استخدام هذا المنتج أثناء الرضناعة الطبيعية دون استشارة طبية. يجب تجلب استخدام الدواء أثناء الرضناعة، إلا إذا كان تعود على الأم تقوق المخاطر على الرضيع. إذا تم استخدامه فيجب مر اعاة استخدام أثل جرعة فعالة لأنصر فترة علاج . يتم			
البار اسيتامول في لين الأم ولكن ليس يكميات ذات تأثير سرير ي يُذكر عند استخدام الجر عات الموصى بها.			
قد يكون الكاقبين ألموجود في حليب الأم تأثير محفز على الأطفال الذين يتم إرضاعهم رضَاعة طبيعية. ولكن لم يتم ملاحظة سميه كبير، إقراز فينالي إفرين في حليب الأم			
هـ القبادة م استخدام الألات:			
للصح العرضي بعد الغيادة أو تشغيل الآلات في حال الشعور بالتوخة. الآثار المجانبية المحتملة			
الهار اسيئامول	كولد & فلو		
وجب التوقف عن استخدام هذا المنتج واستشارة الطبيب على الفور في الحالات التالية؛ اضطر ابات الدو الجهاز الليمغاري فقه الصفاح الدموية و ندرة المحببات لا تقتر ن هذه الآثار بالضرورة بشكل سبيي بالبار ام	عرت به عر		
انسطر لبات الدمر الجهاز الليمفاري: قله الصفاتح المدوية و لدوة المحقيات لانتقرن هذه الآثار بالمضرورة بشكل سبهي بالباراه استطر الماني الجهوز المناسجين تقاعلات الحساسية المناوطة، بما هي ذلك الطبخ الجلدي، والوثمة الوعلية- تم الإبلاغ عن جذا من القاعلات الجلية المنظورة			
جدا من التفاعرت الجندية المصورة. الجهاز التقديمي: مشاكل في التنفس أو حدوث تشنج قصيمي ، ولكن هذه الحالات تحدث على الأرجح لدى المصابين بالربو ولد			
للأسبرين أو لمصادات الالتهاب اللاسترويدية الأخرى. اختلال وظافف الكيد: ضعف الكيد.	معلومات عن المنتج		
فنابل افرين	معلومات عل الملتج		
لوحظت آثار عكسية متكررة في التجارب السريرية التي أجريت باستختام فينايل إفرين مثل: العصبية والصداع والدوار والنوخة و (الصمعربة في الدوم)، وارتفاع ضغط الدم، والخليان والقيء. مخذلات تكرار القاعلات الخاصة بالأثار العكسية التي تم الإبلاغ عنه	پاتندول کولد ی فلو دای اَقراص	1///	
ومن المحتمل أن تكون نادرة، مثل توسع حدقة العين، جلوكوما الزاوية المغلقة الحادة (الأكثر احتمالاً أن تحدث لدي المرضى الذين	معلومات عن المنتج الزع هذا للكشف عن معلومات المنتج	/////	
جلوكوما الزاوية المغلقة)، عدم انتظام دفات القلب، والخفقان، والحساسية (مثل الطفح الجلني وارتكاريا والتهاب الجلد التحسمي)، ، واحتباس البول (الأكثر احتمالاً أن يحدث لذى المرضى الذين يُعانون من السداد المثالة، مثل تضخم غدة البروستكا).	الوصف .	////	
الكانيين	يحقوي كل قرص على: باز استالول ٥٠٠ ملجم	////	
التفاعلات العكسية التي تم رصدها من خلال استخدام الدواء مع الكافيين بعد طرح المنتج في الأسواق: العصبية و الاستثارية و محلات حدوث مثل هذه التفاعلات غير معروف.	کافیین ۲۰ ملجم	1///	
قد تزيد جرعة الكاقبين العلية النتجة عن الجمع بين نظام الجرعات الموصى به والاستهلاك الخاني للكاقبين من احتمالية حدو عكسية مرتبطة بلكاقبين، مثل الأرق والتُمَلِّق والقو والتيبج والمداع واضطر ابلت الجهاز الهضمي والخفان. في حالة تفاق	افزایل افزین هیدروکلور اید ۵ ملجم <b>مکونات آخری:</b>	1////	
الجانبية او إذا لإحظت ظهور اي اثار جانبية غير واردة في هذه النشرة، فيرجى التوقف عن استخدام هذا الدواء واستشارة طبير	وه في القرص: برجهالانبلاز د الشاء نشا الذرة، بوفيدون، سوربيت البوتاسيوم، صوديوم لور ايل سلفيت، صن ست الأصغر (E110)، حمض الستيريك، تلك، ميكروكر يستالين سليولوز.	////	
<u>الجرعة المفرطة</u> قد تتسبب جرعة البار اسينامول الزائدة في قشل كبدي، والذي قد يتطلب زرع كبد أو يودي إلى الوفات من المحتمل حدوث تلف	حمص السعريت، نلته، ميخر وهر يمد تين سنيو تور . علاف القرص: هايبر وميلوز ، ماكر وجول ٤٠٠، تأتي أكسيد التيتانيوم ، صن ست أصغر الومنيوم ليك (E110)، كوينولين أصغر ليك (E104)		
البالغين الذين تداولوا ٠ ١ هم او اكثر من البار اسيتامول.	العواد الأخرى ذات الأثر المعروف: صوديوم ٢ ملجم (في صورة صوديوم لورايل سلفيت)	/////	
قد يودي تدارل «حم أو أكثر من البار اسيتامول إلى تلف الكبد إذا كان العريض يعاني من عوامل خطورة (انظر أدناه). عوامل الخطورة	· صن ست الاصفر ٤. ٠ ملجم (E110)		
إذا كان المريض	ما هو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
<ul> <li>يتلقى علاجًا طويل المدى باستخدام الكار ياماز يبين، أو الفيفويار بيتون، أو الفينيتوين، أو البريميدون، أو الريفامييسين، أو فيتا أو غير ذلك من الأدوية التى تحفز الزيمات الكبد.</li> </ul>	البار اسيتامول، وهو مسكن للألم وخافض للحرارة.		
أو -     يتثاول الإيثانول بصورة منتظمة بما يزيد عن الكميات الموصىي بها.	الكافيين الذي ليساعد على تسكين الألم ويُمزز فعالية البار اسيةامول. فيذليل أفو بن هيدروكلور ايد، و هو يُزيل احتقان الأنف. يوصس ياستخدام بالداول كولد & فلو داي لتخفيف للم الجبوب الأنفية وأعر اض		
-     پيدون اېږيدون بضور ه منطعه ېه پر پيد عن انتمونت الموضيي په. اُو	نز لات البرد و الإنظونز ا، والتي تشمل التعب والفعاس.		
<ul> <li>من المحتمل أن يُصاب باستنفاد الجلوتائيون، على سبيل المثال اضطرابات تناول الطعام، و التايف الكيسي، و عدوى فير و مر</li> <li>لبشري، و المخمصة، و النف.</li> </ul>	کیفیة تشاول باشدول کوك کی فلو داي افر اص باشادول کوك کی فلو داي هې افر اص للتناول عن طریق الغم فقط.		
أعراض الجرعة الزائدة من البار اسيتامول	البلغين والأطفال الذين تتراوح أعدًر هم بين ١٦ سنة وما فرق وكبار السن - قرصين كل ٤ إلى ٦ ساعات حسب الحاجة.		
في أول ٢٤ ساعة هي الشحوب والغثوان والقيء وفقان الشهية وآلام البطن. وقد يصبح تلف الكبد واضحًا بعد ١٢ إلى ٤٨ سا الجرعة ويبلغ ذروته خلال ٢٠٤ أيام, وقد يحدث اختلال في عملية التنثيل الخالي الجلوكوز و عملية الحماض الايضي. وفي ح	🕒 لا تتناول أكثر من ٨ أقراص (٤٠٠٠ ملجم بار اسپتامول/ ٢٠٠ ملجم كافيين/ ٤٠ ملجم فينايل إفرين هيدروكلورايد) خلال ٢٤ ساعة.		
الحاد، قد يتطور الفشل الكبدي إلى اعتلال دماغي ونزيف ونقص سكر الدم وذمة دماغية ووفاة. وقد يتطور الفشل الكلوي الحاد	- لا پچپ تکر از هذه الجر علت اکثر من مره کل آریع ساعات. - لا نستخدمه لمدة نترید عن ۷ آیام من دون استثمارهٔ طبیبات.		
التَّبَيِينِ الحاد، و الذي ترجحه بشدة آلام القُطَّن و البيلة الدموية و البر وتينية، وذلك في حال عدم وجود تلف شديد في الكبد. وقد تم حالات عدم انتظام ضربات القلب و التهاب البنكرياس.	- لا يُنصح به للأطفال تحت سن ١٦ سنة		
ويلزم العلاج القوري في حالة تقاول جرعة زائدة من البار استِدَامول. ينبغي اللجوء إلى العلاج بالفحم المنشط عند تقاول جرعة البار استِدَامول خلال ساعة واحدة.	- لا تُنتجه أنَّرُ الجرعة المُقرَّرة. - يجب استخدام أقل جرعة ضرورية لتحقيق الفاعلية مع أقصر مدة للعلاج.	1///	
يمكن استخدام العلاج بالأسيتيل سيستين حتى ٢٤ ساعة بعد تناول البار اسيتامول، ولكن يتم الحصول على أقصى تأثير وقائي ه	فَيْلُ أَنْ تَتَقُاوِلُ بِاللَّهُ وَلَا يُحْ قُلُو دَايِ		
بحد التناول، وإذا لم يَمثَّل القيء مشكلة، فقد يكون الميثيونين القموي بديلاً مناسبًا للمناطق الناتية خارج المستشفى الكافيين:	أ- يُحظر استعمال بالنادول كولد & فقو داي في حال: - وجود تاريخ مرضى معروف أو سابق النرط الحساسية الهار اسيتامول أو الكانيين أو فينايل أفرين هيدروكلور ايد أو أي من المكن للت الأخرى للنواء.		
قد ينسبب تناول جرعة زائدة من الكافيين في الألم الشرسوفي للمحة والتقيق وإدرار البول وزيادة أو عدم انتظام ضربات الظب	- الاستخدام المترّ امن لمضادات الاحتقال الأخرى المحفز ة للجهاز السمباثاري - الإمسابة بورم القواتم (ورم قرب الكلي)		
الجهاز العصبي المركزي (الأرق والتململ والإثارة والهياج والعصبيية والرعاش والتنشجات) و الجنير بالذكر أنه كي تظهر أعراض سريرية بالغة عقب تفاول جرعة زائدة من الكافيين من هذا الدواء، سوف يصلحب هذه	- الإصابة بجلوكوما الزاوية المغلقة		
المتقاولة تسم خطير في الكيد متعلق بالبار اسيقامول. لا يوجد ترياق محدد متاح، ولكن يمكن لجراء عدة تنابير مساجدة، مثل استخدام ناهضات المستقبلات الأدرينية بيتا لعكس التأثيرات السا	<ul> <li>الإصابة باعثلال كلوي أو كيدي حاد وارتفاع ضغط الدم وفرط نشاط الغدة الدرقية والسكري وأمر اض القلب.</li> <li>تناول المرضى مضادات الاكتفاب ثلاثية الحقفات، أو عقاقر مشيطات مستقبلات البيقا والمرضى الذين يتفاولون أو تفاولوا خلال</li> </ul>		
فيذليل إفرين:	الأسبو عن المأضيين مثيطات الأكسينيز أحادية الأمين (بما أبي ذلك مو كلوبيميد) ب- يجب توخي الحذر الشديد عند تناول بالناول كولد & فلو داي في حال:		
من المرجح أن تؤدي الجرعة الزائدة من فيذليل إفرين إلى الآثار المشابهة لتلك المنرجة في قسم التأثيرات الجانبية. وقد تنشمل الأعراض التهيج، الأرق، ارتفاع ضغط الدم، والبطء المحتمل في ردة العمل. وفي الحالات الشنيدة، قد يحدث ارتباك، هلوسة، تشفجك، وعدم التف	يجب استشارة طبيبك قبل تناول هذا النواء في حال:	/////	
القلب. إلا أن الكمية المطلوبة لإنتاج سمية خطيرة بفينايل إفرين ستكون اكبر من الكمية التي تتسبب في سمية الكبد المر تبطة بالبار اسيتاه	- كنت تُعاني من قصور بالكبد أو قصور كُلوي (لأن الباراسيقامول بِتم أيضه في الكبد ويتخلص منه الجسم في البول عبر الكُلي). - ويكون الخطر من تناول جرعة زائدة لكبر لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكبد الكحولي غير التاليفي. ويزيد وجود مرض كبدي		
وينبغي أن يكون العلاج حسب الحلة الإكلينيكية. وقد يتطلب ارتفاع ضغط الدم الحاد إلى العلاج بدواء مثبطات مستقيلات ألفا مثل ال كيفية تغذين بالنافول كولد في فلو داي	كامن من مخاطر حدوث تلف كبدي بسبب البار اسيتامول.	1///	
يُخفَطُ في دَرِجَة حرارة أثّل من ٢٠ درِّجة منوية يُخفظ في الجوة الأصلية. هذا المفتح بحموه شريط فقاعي مغلق لا تستخدمه إذا كان أي من الشريط الفقاعي أو غلاف الفويل مكسورًا.	لهجب طلب المشورة الطبية قبل استخدام هذا الدواء في العرضى الذين يعانون من الحالات التالية: - تضخم غدة البروستاتا	1///	
حجم العبوة: ٢٤ قرص (٨ قرص ٣٠ شريط)	- مرض الأوعية النموية الانسدادي (مثل متلازمة رينو)	/////	
لا تَسْتَدَم الدواء بعد أنتهاء منة المسلاحية المذكورة على العبوة الخارجية والشريط، الدواء مسالح حتى لخر يوم من شهر تاريخ التهاء	- استثر أف الجار تاثيون بسبب نقص التمثيل الغذائي - الأمر اض القلبية الو عائية	////	
هذا منتج دواني	- استشر مذيبيك إذا استمرت الأعراض - لا تتجاوز الجرعة المقررة.	1///	
الدواء هو منتج له تأثير على صحتك، و تناوله بشكل مغاير للتعليمات قد يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال وتطيمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.	<ul> <li>هذا الدواء يحتوي على البار اسپتامول. لا تتناوله في الوقت نفسه مع منتجات أخرى تحتوي على البار اسپتامول أو مع الأدوية التي</li> </ul>	1///	
إنَّ الطبيب والصيدلي كلاهما خبيرين في الأدوية وفواندها و مخاطرُها.	تُستخدم لعلاج البرد و الإنظويز أو الأدوية المزيلة لأحققان أو انسداد الإثف. - استشر طبيبك إذا كنت تتناول الوار فلرين.	////	
لا توقف فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية من تلقاء نفسك. لا تكرر نفس الوصفة من دون استشارة طبيك.	<ul> <li>لا يجب استخدام هذا المنتج من قبل المرضى الذين يتدلولون الأدوية المحفزة للجهاز السمباثاوي الأخرى (مثل مضادات الاحتقان</li> </ul>	////	
احقظ الأدوية بعداً عن متناول الأطفال مجلس وزراء الصحة العرب	و مثيطات الشهيرة والمنبهات النفسية الشبيهة بالأمفيتامين) (انظر التفاعلات). - يجب تجنب الإفراط في تناول الكافيين (مثل القهوة والشاي وبعض المشروبات المعلية) أثناء تناول هذا الدواء.		
اتحاد الصيادلة العرب	- تحتري أفراص بالناول كوك & فلو داي على صن ست الأصغر (E110)، مما قد يسبب الحساسية - يحفظ الدواء يعيدا عن متدار ل ونظر الأطفال.		
العلامات التجارية معلوكة أو مرخصه لمجموعة شركات جي اس كيه	تحذيرات خاصة على الملصق:		
تم التصنيع بو اسطة: جلاكسو سميث كلاين دو نغر فان الميترد اير الذه! الشركة المالكة ألحق التسويق: جلاكسو سميث كلاين كونسيومر هولث كير (المملكة المتحدة) لتجارية المحدودة، ميديلسيكس، الممل	يحقوي على الباراسيتامول. لا تستخدم هذا المنتج بالتزامن مع أي منتجات أخرى لعلاج الإنظونز أ أو البرد أو الاحتقان. لا تتناول أي أدوية أخرى تحقوي على الباراسيتامول أثناء تناول هذا الدواء. لا تتفاول جرعة من الدواء نزيد عما ورد في الملصق. إذا لم تتحسن		
تاريخ المراجعة: يناير ٢٠٢٢	حالتك، فتحدث مع طبيبك. اطلب المشورة الطبية فورًا في حال تناول جرعة زاندة من هذا الدواء، حتى إذا كنت تشعر بأنك على ما يراء،		
نسخة: ۱ أكترير GV 7/ ۲۰۱۹	وذلك المخاطر حدوث تلف متأخر وخطير في الكبد. ج. تقاول أدوية أخرى:	1///	
	🍆 پجب الحصول على الاستشارة الطبية قبل تناول أقر اص بانادول كوك 🗞 فلو داى في حال:	1///	
	قد تتسبب العقابور الذي تصدق الإنزيمات والإهراط في تدلول الكحول في زيادة تلف الكبد. قد تزداد سرعة امتصماص البار اسيتامول بواسطة العيتوكاوبر اميد أو الدومبوريدون، ويقل الامتصاص عاد تداول الكواستر امين. في حين تعتبر هذه التفاعلات ذات تأثير سريري غير محتمل	1///	
	مع استخدام الدواء بحر من وباتباع نظام الجرعات المُقترَح. - تناول عوامل مشهلات مستقبلات البينا الأدريللية وغيرها من الأدرية الخافضة للضغط بما في ذلك ديبريسو كوين، جو انتشدين،	1////	
	ريز بربين، ميثيل دوبا. قد يقل فينايل إفرين من فعالية عقاقير مثبطات مستقبلات بيتا والأدوية الخافضة للضغط. يمكن أن تزيد مخاطر	////	
	ار تقاع ضغط الدو والأثار الجانبية الطبية الوعاتية الأخرى. - تناول مضادات الاكتتاب ثلاثية الطلقات مثل أميتر بيتهاين، والتي قد تزيد من مخاطر حدوث الأثار الجانبية الطبية الوعاتية مع فيذيل إفرين	VIII	
	- تداول المرضى الأدوية المحفزة اللجهاز السمباثاوي الأخرى (مثل مضادات الاحتقاق ومثبطات الشهية والمنبهات النفسية الشهيهة	1///	
	62000000201604	1///	
	323333201304	1///	
		V///,	
TRAILIN	G FDGF		
II V (ILII V	J J		

140.0

## > champs Artwork Information Panel HALEON X AWP No: 7155217 CHAMPS No: **Non Production Production** D2A 0000014196 Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1 Site Component No: Manufacturing Site: 62000000201604 Dungarvan Site Change Control No: Approving Market: 201221926 Product Market Trade Name: Component Type: PANADOL COLD & FLU Leaflet Black Technical Drawing No: Material Spec No: OTC.LT.002 OTC.LT.SPEC.002 Print Process: Pharma Code No: Offset - Lithography 1177 Barcode No: Bar Width Reduction: Total Special Finishes: 0 Formulation Code: Body Text Size: 4.5pt Leading: 4.55pt Micro Text: Horizontal Scale: 85% Smallest Text Size: 4.5pt Studio Location: Coimbatore, IN

AIP\_HALEON\_2022\_Version 1

## DUNGARVAN Site Additional Artwork Information Panel Varnish type: N/A Reel unwind: 5 Inside, 1 Outside

