BARCODE 10mm X 24mm


EYE MARK 2mm X 7mm

3. NO COPY PERMITTED WITHIN SHADED BORDER AREAS.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

. SUPPLIER MUST OBTAIN WRITTEN APPROVAL FROM NOVARTIS PRIOR TO MAKING CHANGES. NOTES:

1:1 04JUN2009 FLAT SIZE: 140mm X 260mm. MI P A. ADDED BAR CODE AND NO COPY AREAS. 06/04/09 TI



DIRECTION OF

أسيتيل سليسيليك أسيد ٢٥٠ملغ باراسيتامول ٢٥٠ملغ كافيين ٦٥ملغ يجب توخي الحذر في حالة تناول الباراسينامول بالنزامن مع فاركوكساسيلين بسبب زيادة خطر الإصابة بالحماض الايضي المرتفع الفرق الأنيوني (HAGMA). خاصة لدى المرضى المصابين بالقصور الكوي الحاد، والتسمم وسوء التغذية ومصادر أخرى لنقص الغلوثاتيون (على سبيل المثال، إمان الكحول المزعن) وكالله الذين يتناولون الحد الأقصى للجرعة اليومية من الباراسينامول. بنصح بالمراقبة الدقيقة، والتي تنشل قياس مستوى 6- أوكسوبرولين في البول.
الرجاء إبلاغ طبيبا أو الصبيلي إذا كنت تتناول فلوخلوكساسيلين (المضاد حيوي)، بسبب زيادة خطورة الإصابة باضطراب في الدم والسوائل (المصاف الأيضي المرتفع الفرق الأنبوني) والذي يجب أن يتم علاجه بأسرع وقت ممكن, وقد يحدث بصفة خاصة في حالة الإصابة بالقصور المراح وقت ممكن, وقد يحدث بصفة خاصة في حالة الإصابة بالقصور إلى التلك العدد الأقصى للجرءة اليومية من الباراسينامول.
إلى تلف الغضي للجرءة اليومية من الباراسينامول.
إذا كنت تخضع لرعاية طبية بسبب أي حالة مرضية خطيرة. 95.0 إقراً هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ بتناول بانادول مايجرين. تحتوي هذه النشرة على معلومات هامة لك. إتبع التعليمات للحصول على أفضل النتائج. • إحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها ثانية • أسأل الطبيب أو الصيدلاني إذا كنت بحاجة لمعرفة المزيد من المعلومات أو النصائح. • إذا كنت تستعمله لعلاج الصداع النصفي (الشقيقة): اتصل بالطبيب إذا لم تخفُ حدَّة الصداع النصفي (الشقيقة) الذي تعاني منه، أو إذا زادت شدّته . ما الـ مة الأحا بعد الجرعة الأولى. • إذا كنت تستعمله لعلاج الآلام والأوجاع البسيطة: اتصل بالطبيب إذا كان الأُلُم الذي تعاني منه شديدًا، إذا لم يتحسن خلال عشرة أيام من تناول الدواء أو إذا ازداد سوءًا، إذا لم تتخفض الحرارة خلال ثلاثة أيام أو ازادت سوءًا. • إذا أصبح أي من الثأيرت الجائبية خطيرًا أو إلا خطت تأثيرًا جانبيًا غير مذكور في هذه النشرة، فالرجاء الاتصال بالطبيب أو بالصيدلاني. 36.0 ماذا يوجد في بانادول مايجرين يحتوي كل قرص من بانادول مايجرين على ٢٥٠ملغ من باراسيتامول، ٢٥٠ملغ أسبتيل ساليسيليك أسيد و ٦ ملغ كافيين. تحتوي الأقراص أيضا على المواد غير الفعّالة التالية: بنزويك أسيد، شمع كار نوبا، الحمل والإرضاع : إذا كنت حاملاً أو مرضعةً: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال الدواء، من المهم جداً عدم استعمال الأسيتيل ساليسيلك أسيد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل ما لم يطلب الطبيب ذلك بشكل واضح لأنه قد يسبب مشاكل للجنين أو مضاعفات أثناء الولادة. ملون الطحام الآزرق #۱ هايدروكشي بروبيل سيلولوز، هايبروميلوز، مايكروكريستالين، سيلولوز، زيت معدني، بولي سولبت ۲۰، بوفيدون، بروبيلين غليكول، مستحلب سيميثكون، سوربيتان مونولوريت، ستياريك آسيد، تيتانيوم ديوكسيد. أثناً الولادة.

كيف يتم تناول بانادول مايجرين

• من أجل علاج الصداع النصفي (الشقيقة)

• من أجل علاج الصداع النصفي (الشقيقة)
البالغون: تناول قرصين مع كوب من الماء، ولا تتجاوز مقدار قرصين في ٢٤

• من أجل علاج الآلام والأوجاع البسيطة.

• من أجل علاج الآلام والأوجاع البسيطة.

تتجاوز ٨ أقراص في ٢٤ ساعة.

تتجاوز ٨ أقراص في ٢٤ ساعة.

الأطفال الأقل مر ٢٢ سنة: استشر الطبيب.

الأطفال الأقل مر ٢٢ سنة: استشر الطبيب.

تحدير من زيادة الجرعة الا تتناول أكثر من الجرعة المشار إليها. فتناول

كمية أكبر من الجرعة الموصوفة قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل أذية

كمية أكبر من الجرعة الموصوفة تد يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل أذية

الكيد الشديدة. في حال زيادة الجرعة، انصل بطبيبك فوز أو بمركز مكافحة

السموم, العناية الطبية السريعة ضرورية، وللأطفال أيضا حتى ولو لم تلاحظ

الوحود أي أعراض أو علاءات. يتوفر في عبوات تحتوي على ٢٤ قرصًا. لماذا يستعمل بانادول مايجرين يعالج بانادول مايجرين الصداع النصفي (الشقيقة). يخفف بانادول مايجرين مؤقتا الأوجاع والآلام البسيطة الحادثة بسبب الصداع، الزكام، إلتهاب المفاصل، أوجاع العضلات، إلتهاب الجيوب الأنفية، الله الأسنان، تقلصات الدورة الشهرية والسابقة لها. قبل أن تتناول بانادول مايجرين ب ال اختتاول بادادول ما يجرين.

التتتاول بادادول ما يجرين.

الاثنتاول بادادول ما يجرين.

الاثنت قد أصبت في أي وقت مضى بحساسية تجاه أي من مزيلات الألم / خافضات الحرارة.

الذا كنت قد بدأت بتتاول أي مستحضر آخر يحتوي على باراسيتامول (راجع تحذيرات زيادة الجرعة).

إذا كانت أي من هذه الحالات تنطبق عليك، فلا تتناول وتحدث إلى الطبيب أو الصدالا : سعوم، العداق الطبية السريمة الشرورية، وبد تعمل العمل حتى وبو لم حاصل رجود أي أعراض أو علامات. أذ كنت تتناول بانادول مايجرين من أجل علاج الصداع النصفي (الشقيقة): أذ كنت تتناول بانادول مايجرين من أجل علاج الصداع النصفي (الشقيقة): يجب أخذ عناية خاصة عند تناول بانادول مايجرين إن المناسبة بالدول مايجرين واستشر طبيع العلم بالمستفي (استفده). وتوقف عن تناول بانادول مايجرين واستشر طبيع إدالم بخف الصداع النصفي أو إذا زادت حدته بعد الجرعة الأولى أو إذا ظهرت أعراض جديدة / غير متوقعة. إذا كنت تنتاول بانادول مايجرين من أجل علاج الآلام والأوجاع السيطة: لا تتناول بانادول مايجرين لمدة تتجاور 10 أيام لمعالجة الآلم أو ٣ أيام لمعالجة ارتفاع الحرارة دون استشارة طبيبك. إذا استمر وجود الأعراض أو زادت حدتها، أو ظهرت أعراض جديدة، استشر طبيبك. بو تبيين يستخول من المستخضر. عند استعمال هذا المستخضر، استسبه مع مصور.
إذا ظهرت تغيرات في السلوك مع غثيان و قي، لأن غذو الأعراض قد تكون
العلامات المبكرة المتلازمة راي التي تعتبر مرضا نادرا لكن خطيرًا،
و إذا كنت مهدوا بالحساسية، قد يسبب أسيتيل ساليسيليك أسيد تفاعلات
تحسسية شديدة قد تشمل: شرى (ارتكاريا)، تورم الوجه، ربو (صفير ماً هي التأثيرات الجانبية التي يسببها بانادول مايجرين مثل بقية الأدوية، يمكن أن يسبب بانادول مايجرين أحياناً بعض التأثيرات غير المرغوب فيها لدى بعض الأفراد. صدر) وحالة صدمة. ستربون يهي ساق بلعش مدورد.
إذا عانيت من أي من التأثيرات التالية، توقف عن تناول بانادول مايجرين
واستشر طبيبك فورا:
• تفاعلات تحسسية،
• طنين في الأنتين أو تراجع السمع،
• احمرار أو توزم المنطقة المؤلمة،
• ريادة أو استمرار الم المعدة أو أضطرابها.
أخير طبيك أو الصيدلاني إذا لاحظت أي تأثير جانبي آخر تعتقد أنه حدث بسبب تناول بانادول مايجرين. في حالة:
 لم يسبق أن شُخصت بحالة الصداع النصفي من قبل طبيب مختص
 إصابتك بصداع بختلف عن حالات الصداع النصفي المألوفة بالنسبة إليك
 إصابتك بأسوأ حالة صداع في حياتك
 إصابتك الرائعا حالجرارة وتيبس الرقبة
 إصابتك بصداع بدأ بعد أو نتج عن حادث رضي في الرأس، جهد شديد،
 سعال أو إنضاء سعال او انحناء • اصابتك بأول حالة صداع من سن الخمسين • اصابتك بالصداع يوميًا، أو بصداع نصفي شديد جدًا يُلزمك على الراحة كىف تحفظ بانادول مايجرين في السرير • إصابتك بمشاكل أو تأثيرات جانبية خطيرة بسبب تناول مزيلات الألم / 36,0 ميك عصف بادون سيوبرين • عبوات وأشرطة؛ لا تحفظه في مكان تتجاوز حرارته 30 درجة مئوية. • اكياس: لا تحفظه في مكان تتجاوز حرارته ٢٥درجة مئوية لا تتناول الأقراص بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة الخارجي حافصات الحرارة • إصابتك بقيء مع نوبات الصداع النصفي. • إذا كنت تعاني من الربو، القرحات، الاضطرابات النزفية، المشاكل المُعدية كالحرقة المُعدية واضطراب المعدة، أو الألم المُعِدي الذي لا ينمب ولا يتراجع. احتفظ به بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وعن مرأى عيونهم. تمّ تصنيعه من قبل هاليون يو أس أي ُإن سي . لنكولن / الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت أي من الحالات السابقة تنطبق عليك، فلا تتناول بانادول مايجرين قبل أن تستشير طبيبك أو الصيدلاني الشركة المالكة لحق التسويق هاليون يو أس القابضة ل ل سي، وارن، الولايات المتحدة الأمريكية لتناول بانادول مايجرين مع الطعام والشراب • تحذيرها للكحول: إذاكنت تتناول لأنثة كؤوس أو أكثر من المشروبات الكحولية كل يوم، فاسال طبيعاً إذا كان بإمكانات تناول باراسينامول والاسينيل ساليسيليك أسيد أو غيرهما من مزيلات الإلم/خافضات البحرارة، تاريخ تحديث المعلومات: يوليو ٢٠٢٤ العلامات التجارية مملوكة/مرخصة لصالح مجموعة شركات هاليون باراسيتامول والأسيتيل ساليسيليك أسيد قد يسببان أذية للكبد ونزفا معديا. 95.0 • تحذير من الكافيين: تحتوي الجرءة الموصى بها من هذا المستحضر على كمية من الكافيين: تحتوي الجرءة الموصى بها من هذا المستحضر على كمية من الكافيين تقارب ما يحتويه فنجان من القهوة. حدد ما تتناوله من أدوية، أطعمة أو مشروبات تحتوي على الكافيين أثناء تناول هذا المستحضر لأن الكميات الكبيرة من القائفيين تسبب النرفزة، الاستثارة، الأقدى كما تسر، تصدء القار، أحداثا 79.0 -----ب • إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليما الأرق، كما تسبُّب تسرّع القلبُ أحياناً. لصيدلاني الذي صرفها لك ج. فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره د. لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك هــ لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية تناول أدوية أخرى إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية رب بن محرب مسيد إحرص على إخبار طبيبك أو الصيدلاني بكافة الأدوية التي تتناولها، سواء كانت من الأدوية التي يصفها الطبيب أو التي تحصل عليها من غير وصفة طبية، وخاصة: لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب • مضادات التحلّط (ممتّعات الدم) مصادات التجلط (معينات الدم)
 و الأدوية التي تستعمل لعلاج السكر ي، النقرس أو التهاب المفاصل
 أي دواء آخر، أو أي مستحضر آخر يحتوي على باراسيتامول، الأسيتيل
 ساليسيليك أسيد أو أي مزيل للألم / خافض للحرارة. 62000000214939

070036A

REVISION | DATE | BY

HAL≣ON

BACK PANEL WOUND IN

LEADING EDGE

24 - FEB -		Artwork	Infor	mation	n Panel	HALEON
Non Pro	oduction	Artwork	Pro	oduction Ar	Component No: AWP No: 62000000214939 7833551	
Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1						Manufacturing Site:
on son zon	2.	3.	4.	5.	6.	Rote: North American Artwork will have N/A in this field)   Approving Market:   Bahrain-BHR Kuwait-KWT Lebanon-LBN Oman-OMN Qatar-QAT United Arab Emirates-A   Technical Drawing No:   070036A
··	Σ.	J.	4.	3.	0.	Material Spec No: NA Note: North American Artwork will have N/A in this field) Body Text Size: 7.0pt Smallest Text Size: 6.5pt
7.	8.	9.	10.	11.	12.	Note: For North American Artwork, see Regulatory Spec box for this informate Electronic Verification Code: 00214939  Printer and User notes:
Fotal Spec	ial Finishes	: 0				
Studio Loc	ation: SGS					

WOUND OUT