



- PATCHES
- 4
- ✓ Penetrates through skin to help relief
 - ✓ Soothes Back, Neck & Muscle Pain
 - ✓ Immediate Cooling Effect

MUSCLE & JOINT

Pain Relief Patch

Panaflex

VALUE PACK

HALCON

Cut along this line to open.

Panaflex

MUSCLE & JOINT

Pain Relief Patch

Contains Medicinal Ingredients



Indications: Relief of muscular and joint pain in various part of body such as shoulder, neck, waist, back, elbow and knee.

Benefits: • Penetrates through skin to help relief • Soothes back, neck & muscle pain • Immediate cooling effect

Contraindications: Contraindicated in children below 2 years of age and in patients with known hypersensitivity to glycol salicylate, menthol, camphor or tocopherol acetate or any other ingredient of the preparation.

Warnings and Precautions: Use the product with caution in patients with history of allergic reaction to aspirin or other NSAIDs. The product should be applied only to intact, non-diseased skin and not to skin wounds. The product should not come into contact with the eyes, nostrils, and other mucous membranes. In case of accidental contact, the eyes or other mucous membranes should be rinsed well with water. The product should not be used with external heat, such as electric heating pad, as it may result in excessive skin irritations or skin burns. Some people may experience discomfort, particularly those with sensitive skin, if the product is used after a bath. If the condition does not improve or worsens within 7 days of starting treatment, patients should seek medical advice to exclude an alternative underlying cause of pain. Discontinue the treatment if skin irritation occurs. Not for use in children under 12 years of age unless directed by a healthcare professional. Seizures may occur in children with a history of seizures due to the presence of terpene derivatives (menthol and camphor). A small amount applied this way may cause immediate collapse. Keep out of the sight and reach of children. The product should not be applied near the nostrils of children due to the presence of camphor.

Interactions: If you are taking anticoagulants (eg warfarin) and antiplatelet medications, please consult your doctor before using this product as it may result in increased risk of bleeding.

Pregnancy and Lactation: Do not use during pregnancy or when breastfeeding.

Side Effects: Application site hypersensitivity, application site reaction, skin burning sensation, rash and pruritus.

Symptoms and Treatment of Overdose: Overdose after incorrect topical application or due to accidental ingestion for products containing salicylates and menthol can be associated with a number of symptoms which can include: nausea, vomiting, severe abdominal pain, sweating, tinnitus, vertigo, deafness, dizziness, ataxia, headache, confusion, drowsiness and coma. Overdose from camphor can in addition be associated with oropharyngeal burning, muscle twitching, depression of the CNS and epileptiform convulsions. Relatively large amounts of vitamin E usually cause no harm but occasionally muscle weakness, fatigue, nausea, and diarrhoea occur. In the event of overdose, supportive care may be required. Further management should be as clinically indicated or as recommended by the national poisons center, where available.

Storage Condition: Store below 30°C.

Indikasi: Memberi kelegaan sakit otot dan sendi pada badan seperti bahu, leher, pinggang, siku dan lutut.

Faedah: • Menembusi lapisan kulit untuk memberikan kelegaan • Melegakan kesakitan belakang, leher & otot • Kesan penyejukan segera

Kontraindikasi: Dikontraindikasikan untuk kanak-kanak di bawah umur 2 tahun, dan untuk pesakit yang diketahui dengan hipersensitiviti terhadap *glycol salicylate*, *mentol*, *camphor* atau *tocopherol acetate* atau ramuan lain yang terkandung dalam produk ini.

Amaran dan Perhatian: Gunakan produk ini dengan berhati-hati untuk pesakit yang mempunyai sejarah reaksi alahan terhadap aspirin atau ubat-ubatan anti radang tanpa steroid (NSAIDs) yang lain. Produk ini hanya boleh digunakan pada kulit yang utuh dan tidak berpenyakit dan bukan pada kulit yang luka. Produk ini tidak harus bersentuhan dengan mata, lubang hidung, dan membran mukus yang lain. Sekiranya terkena secara tidak sengaja, mata atau membran mukus yang lain harus dibilas dengan air. Produk ini tidak boleh digunakan bersama haba luaran, seperti pad pemanasan elektrik, yang mungkin menyebabkan kerengsaan kulit berlebihan atau kulit terbakar. Sesetengah orang mungkin mengalami ketidakelesaan, terutamanya mereka yang mempunyai kulit sensitif, jika produk ini digunakan selepas mandi. Jika keadaan tidak beransur pulih atau bertambah serius dalam masa 7 hari sejak memulakan rawatan, pesakit harus mendapatkan nasihat perubatan untuk mengecualikan penyebab alternatif kesakitan. Hentikan rawatan jika berlaku kerengsaan kulit. Tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun kecuali jika diarahkan oleh pakar kesihatan. Sawan boleh berlaku pada kanak-kanak yang pernah mengalami sawan disebabkan oleh kandungan derivatif *terpene* (mentol dan *camphor*). Sebilangan kecil yang digunakan dengan cara ini boleh menyebabkan jatuh pengan segera. Jauhkan daripada pandangan dan capaian kanak-kanak. Produk ini tidak harus digunakan berhampiran lubang hidung kanak-kanak kerana kandungan *camphor*.

Interaksi: Jika anda mengambil ubat-ubatan *anticoagulant* (seperti *warfarin*) dan *antiplatelet*, sila dapatkan nasihat doktor anda sebelum menggunakan produk ini sebab kemungkinan peningkatan risiko pendarahan.

Kehamilan dan Penyusuan: Jangan guna semasa kehamilan atau penyusuan.

Kesan Sampingan: Hipersensitiviti, reaksi, sensasi terbakar pada kulit, ruam dan *pruritus* di sekitar permukaan ubat tampalan digunakan.

Gejala-gejala dan Rawatan Terlebih Dos: Terlebih dos ubat selepas penggunaan topikal yang tidak betul atau akibat secara tidak sengaja temakan produk-produk yang mengandungi *salicylates* dan mentol diketahui berkaitan dengan beberapa gejala, termasuk loya, muntah, sakit perut yang teruk, berpeluh, *tinnitus*, *vertigo*, pekak, pening, *ataxia*, sakit kepala, kekeliruan, mengantuk dan koma. Terlebih dos akibat *camphor* boleh berkait dengan rasa mulut-hidung terbakar, kekejangan otot, kemurungan sistem saraf pusat dan sawan *epileptiform*. Jumlah vitamin E yang agak besar biasanya tidak mendatangkan kesan mudarat tetapi kadangkala kelemahan otot, keletihan, loya dan cirit-birit berlaku. Jika penggunaan dos yang berlebihan berlaku, rawatan sokongan mungkin diperlukan. Pengurusan lanjut harus seperti yang diindikasikan secara klinikal atau seperti yang disyorkan oleh pusat racun negara, jika ada.

Kedaaan Penyimpanan: Simpan di bawah 30°C.

Dosage and Administration • Dos dan Arahan Penggunaan


For topical use only. Treat only one painful area at one time. **Maximum duration of use without medical advice:** 7 days. To be applied to the affected area up to 3 or 4 times a day as required. **Maximum daily dose:** 4 patches. For use in adults and children aged 12 years and above. Children under 12 years of age: seek medical advice before use. Sweat and dirt may reduce the adhesion of the patch. Clean and dry the affected area to increase the adhesiveness.

1. Open the pouch and take out a patch. Peel off protective backing.
2. Apply sticky side to affected area.
3. Adhesive sheet is readily cut into 6 small pieces.
4. Peel off 2 small pieces of adhesive sheet, stick at the edge of patch to prevent patch from moving.

After application, wash your hands.

Untuk penggunaan topikal sahaja. Rawat hanya satu bahagian badan yang sakit pada satu masa. **Tempoh maksimum penggunaan tanpa nasihat perubatan:** 7 hari. Untuk digunakan pada bahagian badan yang sakit sehingga 3 atau 4 kali sehari mengikut keperluan. **Dos harian maksimum:** 4 ubat tampalan. Untuk penggunaan orang dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas. Kanak-kanak di bawah 12 tahun: dapatkan nasihat perubatan sebelum guna. Peluh dan kotoran boleh mengurangkan kelekatan ubat tampalan ini. Bersihkan dan keringkan kulit kawasan sakit untuk meningkatkan kelekatan ubat tampalan.

1. Buka kantung dan keluarkan satu ubat tampalan. Tanggalkan lapisan pelapik.
2. Letakkan sebelah ubat tampalan yang melekat pada bahagian yang sakit.
3. Pelekat tambahan adalah sedia dipotong kepada 6 kepingan kecil.
4. Tanggalkan 2 kepingan pelekat tambahan dan lekatkan pada hujung tampalan ubat untuk mengelakkannya daripada bergerak. Basuh tangan selepas guna.



Active Ingredients:

Glycol Salicylate	1.5% w/w
L-Menthol	1.0% w/w
DL-Camphor	0.5% w/w
DL- α -Tocopherol Acetate (Vitamin E)	0.3% w/w
Inactive Ingredients: Glycerin, tartaric acid, sorbitol solution, kaolin, titanium dioxide, purified water, sodium polyacrylate, silicon dioxide, polyvinylpyrrolidone, polysorbate 80, sorbitan monooleate, carboxymethylcellulose sodium, sodium polyacrylate starch, PVA solution.	

Manufacturer: Teh Seng Pharmaceutical Mfg. Co., Ltd. Secondary Factory, No. 42-1, Huan Gong Road, Yong Kang District, Tainan City, Taiwan, R.O.C.

Product Registration Holder: Malaysia - Haleon Malaysia Sdn. Bhd. (Registration No: 195901000115 (3467-X)), Lot 89, Jalan Enggang, Ampang/ Hulu Kelang Industrial Estate, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia.

Imported by: Brunei - Kingston Beverage & Creamery Sdn. Bhd. Plot 73, Lot 3, 4, 5 & 6, Beribi Industrial Complex, Jalan Gadong BE1118, Negara Brunei Darussalam. Tel: 673-2450102

BATCH NO:

MFG:

EXP:



Trade Marks are owned by or licensed to the Haleon group of companies.
©2024 Haleon group of companies or its licensor.

mystory.my@haleon.com 1800 88 3225