champs HALEON
Haleon Artwork Solution
Production Artwork Workflow
24-FEB-2025 11:26
EASTERN TIME ZONE (GMT-4)

FRONT

PHARMA CODE REF. IS:
2 1 6 7

1.5

50 46

HALEON

Panadol ActiFast
Paracetamol 500mg dan Sodium 173mg

20

Setiap kaplet mengandungi 500mg Paracetamol, *sodium bicarbonate, maize starch, pregelatinized starch, povidone, sodium starch glycolate, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, carnauba wax, opadry II white.*

Deskripsi Produk
Tablet bersalut lapisan licin putih ke putih pudar yang berbentuk kapsul dengan tepi rata. Tablet ditanda dengan "P" pada satu permukaan dan "--" di permukaan satu lagi.

Kegunaan
Untuk kelegaan demam dan kelegaan sakit daripada ringan hingga sederhana termasuk: sakit kepala, migrain, sakit belakang, sakit muskuloskeletal, sakit senggugut, sakit osteoarthritis, sakit gigi, sakit selepas prosedur pergigian/pencabutan gigi, sakit selepas vaksinasi dan ketidakselesaan akibat selesema dan sakit tekak.

Dos Yang Disyorkan
Orang dewasa (termasuk warga tua) dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas:
500mg-1000mg paracetamol (1-2 kaplet), setiap 4-6 jam bila perlu.

Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun:
Tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.

- Jangan melebihi dos yang disyorkan.
- Dos paling rendah yang dapat memberi keberkesanan dan tempoh rawatan yang paling singkat harus digunakan.
- Pengambilan secara oral sahaja.
- Selang antara dos minimum: 4 jam.
- Dos harian maksimum: 4000mg (8 kaplet)

Kemerosotan buah pinggang:
Pesakit yang didiagnosis mengalami masalah buah pinggang mesti mendapatkan nasihat perubatan sebelum mengambil ubat ini. Batasan yang berkaitan dengan penggunaan produk-produk paracetamol pada pesakit dengan masalah buah pinggang adalah akibat daripada kandungan paracetamol dalam ubat (sila rujuk kepada Seksyen Amaran dan Perhatian)

Kemerosotan hati:
Pesakit yang didiagnosis mengalami masalah hati mesti mendapatkan nasihat perubatan sebelum mengambil ubat ini. Batasan yang berkaitan dengan penggunaan produk-produk paracetamol pada pesakit dengan masalah hati adalah akibat daripada kandungan paracetamol dalam ubat (sila rujuk kepada Seksyen Amaran dan Perhatian).

Cara Pengambilan
Oral

Kontraindikasi
Jangan ambil ubat ini jika anda alah kepada paracetamol atau bahan-bahan lain dalam ubat ini.

Amaran dan Perhatian
Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kerana ia boleh menyebabkan kerosakan serius pada hati anda.

Rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil jika anda:

- mempunyai masalah kerosakan hati atau buah pinggang
- kurang berat badan atau kekurangan zat makanan.
- kerap minum alkohol.

Anda mungkin perlu mengelakkan penggunaan produk ini sama sekali atau menghadkan jumlah paracetamol yang anda ambil.

Rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil jika anda:

- mengalami jangkitan yang teruk, kekurangan zat makanan, kurang berat badan atau peminum alkohol kronik kerana ini boleh meningkatkan risiko asidosis metabolik. Tanda-tanda asidosis metabolik termasuk:
- Pernafasan yang mendalam, cepat dan sukar
- Rasa sakit (mual), sakit (muntah)
- Hilang selera makan

Hubungi doktor dengan segera jika anda mendapat kombinasi gejala-gejala ini.

Sila jumpa doktor jika gejala masih berlarutan.

Sentiasa membaca dan ikut arahan pada label.

Jauhkan daripada kanak-kanak. Keep out of reach of children.

Ubat ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan mengambil sebarang ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

AMARAN ALAHAN: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala-gejala termasuk kemerahan kulit, lepuh dan ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan yang serius. Jika reaksi ini berlaku, hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Setiap kaplet mengandungi 173mg sodium (346mg sodium dalam 2 biji kaplet). Pengambilan ubat ini perlu dipertimbangkan sekiranya anda mengikut diet sodium rendah untuk alasan perubatan.

Interaksi dengan Ubat-ubatan Lain
Rujuk kepada doktor anda sebelum guna jika anda mengambil warfarin atau ubatan yang serupa bagi mencairkan darah.

Kesan *anticoagulant* warfarin dan *coumarins* yang lain mungkin ditingkatkan dengan penggunaan harian paracetamol yang berpanjangan sebab peningkatan risiko pendarahan; dos sekali sekala tidak mempunyai kesan yang ketara.

Kehamilan dan Penyusuan
Kehamilan
Seperti penggunaan ubat lain semasa mengandung, wanita hamil harus mendapatkan nasihat perubatan sebelum mengambil paracetamol.
Dos efektif terendah dan tempoh rawatan terpendek harus dipertimbangkan.

Penyusuan
Paracetamol dikeluarkan dalam susu ibu tetapi tidak dalam kuantiti yang ketara secara klinikal dengan dos yang disyorkan. Data yang diterbitkan tidak menghalang penyusuan.

62000000215782

50 50 50 50 300

60
80

BACK

1.5

46 50

Kesan Sampingan
Hentikan pengambilan ubat ini dan beritahu doktor serta-merta jika anda:

- mengalami reaksi alahan seperti ruam kulit atau gatal-gatal, adakala beserta masalah pernafasan atau bengkak bibir, lidah, tekak atau muka
- mengalami ruam kulit atau pengelupasan atau ulser dalam mulut
- pernah mengalami masalah pernafasan dengan aspirin atau ubat anti-radang tanpa steroid, dan mengalami reaksi yang serupa dengan produk ini
- mengalami lebam atau pendarahan yang tidak diketahui puncanya

Reaksi-reaksi ini jarang berlaku.
Daripada data pasca pemasaran, reaksi-reaksi di bawah ini sangat jarang berlaku:

Trombositopenia, Anafilaksis, reaksi hipersensitiviti kulit termasuk, antara lain, ruam kulit, angioedema, sindrom *Stevens-Johnson* dan Nekrolisis Epidermis Toksik, Bronkospasme pada pesakit yang sensitif terhadap aspirin dan NSAID lain, disfungsi hepatik.

20

Gejala-gejala dan Rawatan Terlebih Dos
Jika terambil dos berlebihan, dapatkan nasihat doktor dengan segera walaupun anda tidak mengalami sebarang gejala kerana risiko kerosakan hati.

Gejala dan Tanda
Pengambilan dos paracetamol yang berlebihan boleh menyebabkan kegagalan hati yang mungkin memerlukan pemindahan hati atau menyebabkan kematian. Pankreatitis akut telah diperhatikan, biasanya dengan disfungsi hati dan keracunan hati.

Rawatan
Tindakan rawatan perubatan diperlukan segera sekiranya berlaku dos berlebihan, walaupun tidak ada gejala akibat terlebih dos.

Sekiranya berlebihan dos disahkan atau disyaki, dapatkan nasihat segera daripada Pusat Racun Negara dan rujuk pesakit ke Pusat Perubatan Kecemasan terdekat untuk rawatan pakar. Ini harus dilakukan walaupun pada pesakit tanpa gejala dan tanda terlebih dos kerana risiko kerosakan hati yang tertunda.

Penglibatan N-acetylcysteine atau methionine mungkin diperlukan.

Dos tinggi *sodium bicarbonate* dijangka dapat mendorong gejala-gejala gastrointestinal termasuk bersendawa dan loya. Di samping itu, dos tinggi *sodium bicarbonate* boleh menyebabkan hipernatraemia; elektrolit perlu dipantau dan pesakit harus diuruskan dengan rawatan yang sewajarnya.

Pusat Racun Negara [Telefon (Isnin-Jumaat 8am-10pm & Sabtu, Ahad, Cuti Umum 8am-5pm): +604-6536999; Laman web: https://prn.usm.my].

Kesan Keupayaan Memandu dan Menggunakan Mesin
Kurang berkemungkinan memberi kesan kepada keupayaan memandu dan menggunakan mesin.

Farmakodinamik
Mekanisme Tindakan
Paracetamol adalah sejenis analgesik dan antipiretik. Mekanisme tindakannya dipercayai termasuk perencatan sintesis prostaglandin, terutamanya di dalam pusat sistem saraf.

Kesan-kesan Farmakodinamik
Kekurangan perencatan prostaglandin periferal menghasilkan sifat farmakologi yang penting seperti pemeliharaan prostaglandin pelindung di dalam saluran gastrousus.

Oleh itu, paracetamol adalah sangat sesuai untuk pesakit yang mempunyai sejarah penyakit atau yang sedang mengambil ubat bersamaan, di mana perencatan prostaglandin periferal tidak diperlukan (seperti, sebagai contoh, mereka yang mempunyai sejarah pendarahan gastrousus atau orang-orang tua). *Sodium Bicarbonate* tidak mempunyai aktiviti analgesik yang diketahui.

Farmakokinetik
Penyerapan
Paracetamol diserap dengan pantas dan hampir keseluruhannya daripada saluran gastrousus.

Pengagihan
Pautan kepada protein plasma adalah minimum pada kepekatan terapeutik.

Metabolisme
Paracetamol dimetabolismekan di dalam hati dan dikeluarkan melalui air kencing terutamanya sebagai konjugat glukuronida dan sulfat.

Penyingkiran
Kurang daripada 5% dikeluarkan sebagai paracetamol yang tidak diubahsuai.

Dalam kajian farmakokinetik sukarelawan manusia, min kepekatan plasma maksimum dapat dicapai sekurang-kurangnya dua kali lebih cepat dengan tablet yang pantas diuraikan berbanding dengan tablet paracetamol standard dengan pengambilan kedua-dua pada dos satu dan dua tablet, dan ini adalah signifikan secara statistik.

Tahap penyerapan untuk tablet cepat larut adalah bersamaan dengan tablet paracetamol standard seperti yang ditunjukkan oleh AUC (kawasan di bawah lengkung) pada dos satu dan dua tablet.

PHARMA CODE REF. IS:
2 1 6 7

Cara Penyimpanan
Simpan di bawah suhu 30°C.

Saiz Pek
10, 20, 30, 100 dan 120 kaplet.
Bukan semua saiz pek dipasarkan.

Tarikh Dikemaskini
September 2024

Dikilangkan oleh:
Haleon Ireland Dungarvan Limited
Knockbrack, Lisfennel, Dungarvan, Co. Waterford, X35 RY76, Ireland.

Untuk Pemegang Pendaftaran Produk: Haleon Malaysia Sdn. Bhd. (Registration No: 195901000115 (3467-X)), Lot 89, Jalan Enggang, Ampang/Hulu Kelang Industrial Estate, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia.

Diedarkan di Brunei oleh: Kingston Beverage & Creamery Sdn. Bhd., Plot 73, Lot 3, 4, 5 & 6, Beribi Industrial Complex, Jalan Gadong BE1118, Negara Brunei Darussalam

mystory.my@haleon.com
1800 88 3225

Cap dagangan adalah dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kumpulan Syarikat Haleon.
©2024 kumpulan Syarikat Haleon atau pemberi lesennya.

62000000215782

50 50 50 50 300

60
80