

HALÉON

Panadol *Extra* CAPLET

Paracetamol 500mg dan Kafein 65mg

Setiap kaplet mengandung 500mg Paracetamol, 65mg Kafein, Corn Starch / Maize Starch, Pregelatinized Starch, Povidone K25, Talc, Stearic Acid, Potassium Sorbate, Croscarmellose Sodium, Pengawet: Potassium Sorbate 0.6mg/Kaplet.

Deskripsi Produk

Kaplet berwarna putih dengan type rata. Terukir tulisan "PANADOLEX" pada satu permukaan dan satu garisan pada permukaan yang sebaliknya.

Indikasi

Panadol Extra merupakan parasetamol, sejenis analgesik dan antipiretik, dan kafein, sebagai pembantu kepada kesan analgesik parasetamol. Panadol Extra disyorkan untuk merawat kesakitan ringan hingga sederhana serta melegakan demam termasuk:

- Sakit kepala, migrain, sakit otot, sakit tengguang, sakit muskuloskeletal, demam dan sakit selepas vaksinasi, sakit selepas prosedur pembedahan / pembedahan gigi, sakit gigi, sakit otot/radang serta melegakan gejala-gejala selesema, influenza dan sakit tekak.

Dos yang Disyorkan

Dewasa (termasuk wanita tua) dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas:

- Dos maksimum: 4 kaplet, 2 hingga 6 jam bila perlu. (Dos maksimum harian 8 kaplet (4000mg paracetamol) / 520mg kafein)
- Jangan melebihi dos yang disyorkan.
- Dos paling rendah yang dapat memberi keberkesanan harus digunakan untuk tempoh rawatan yang paling singkat.
- Selang minimum antara dos: 4 jam.

Kanak-Kanak:

Paracetamol kafein tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.

Paracetamol-caffeine is not recommended for children under the age of 12 years.

Cara Pengambilan

Pengambilan secara oral sahaja.

KontraIndikasi

Jangan ambil ubat ini jika anda alah kepada paracetamol, kafein atau kandungan lain dalam ubat ini.

Amaran & Perhatian

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kerana ia boleh menyebabkan kerosakan serius pada hati anda.

Jangan ambil ubat ini jika anda sedang mengambil sebarang ubat preskripsi atau tanpa preskripsi yang mengandungi paracetamol untuk merawat selesema, demam, gejala selesema dan influenza, atau untuk membantu tidur.

Rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil ubat anda:

- mempunyai masalah hati atau buah pinggang,
- kurang berat badan atau kekurangan zat makanan,
- kerap minum alkohol,
- Anda mungkin perlu mengelakkan penggunaan produk ini sama sekali atau menghadkan jumlah paracetamol yang anda ambil.
- **JANGAN kepada doktor anda sebelum mengambil ubat anda:**
- mengalami jangkitan, kekurangan zat makanan, kurang berat badan yang teruk atau peminum alkohol berat secara kronik kerana ini boleh meningkatkan risiko asidosis metabolik. Tanda-tanda asidosis metabolik termasuk:
- Penafasan yang mendalam, cepat dan sukar.
- Rasa mual, muntah
- Hilang selera makan

Hubungi doktor dengan segera jika anda mendapat kombinasi gejala-gejala ini.

Sila jumpa doktor jika gejala masih berlanjutan.

Elakkan pengambilan produk-produk yang mengandungi kafein. Terlalu banyak kafein boleh menyebabkan depujan jantung yang cepat, kekejangan atau kelesukan tidur.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakannya jika anda mengalami tekanan darah tinggi, glaukoma atau sindrom pulau kering yang teruk.

JANGAN ambil lebih daripada 8 kaplet dalam 24 jam.

JANGAN melebihi dos yang disyorkan, kecuali atas nasihat doktor. Ambil dos paling rendah yang dapat memberi keberkesanan. Pengambilan lebih daripada dos maksimum boleh menyebabkan kerosakan hati yang teruk atau yang membawa maut.

JANGAN ambil dengan produk lain yang mengandungi paracetamol.

JANGAN daripada pandangan dan capaian kanak-kanak. *Keep out of the sight and reach of children.*

Sensitiviti membaca dan ikut arahan pada label

Ubat ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan mengambil sebarang ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

AMARAN ALAHAN: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala-gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh dan ruam. Jika ruam tanda-tanda keadaan yang serius. Jika reaksi ini berlaku, hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Interaksi dengan Ubat-Lain

Paracetamol

Kesan anticoagulant warfarin dan coumestrol yang lain mungkin ditingkatkan dengan penggunaan ubat-ubatan paracetamol yang berpanjangan dengan peningkatan risiko pendarahan; dos sekali sehari tidak mempunyai kesan yang ketara.

Sakit

Kafein boleh meningkatkan penyinkiran litium dari badan. Oleh itu, penggunaan bersamaan litium tidak digalakkan.

Kehamilan dan Penyusuan

Kehamilan:

Tidak disyorkan untuk diambil semasa kehamilan.

Not recommended for use during pregnancy.

Kafein tidak disyorkan untuk diambil semasa kehamilan kerana kemungkinan peningkatan risiko keguguran spontan yang dikaitkan dengan pengambilan kafein.

NPA017520

[illegible]