

# Children's Advil

Suspension/Suspensión

Ibuprofen Oral Suspension

100 mg per 5 mL

Pain Reliever/Fever Reducer (NSAID)

Ibuprofeno suspensión oral

100 mg por cada 5 mL

Analgésico/antifebril (AINE)

## Fever/Fiebre

Aches & Pains  
Dolores y malestares

Lasts Up To/Dura hasta

**8**  
Hours/horas



Fruit-Flavored Liquid  
for ages

Líquido con sabor a fruta  
para las edades

2-11 years/años

4 FL OZ (120 mL) Alcohol-Free/Sin alcohol

**Important: Read all product information before using. Keep this box for important information. This product is intended for use in children ages 2 years – 11 years.**

### Drug Facts

#### Active ingredient (in each 5 mL) Purpose

Ibuprofen 100 mg (NSAID)\* .....Fever reducer/Pain reliever  
\*nonsteroidal anti-inflammatory drug

#### Uses

temporarily: ■ reduces fever  
■ relieves minor aches and pains due to the common cold, flu, sore throat, headaches and toothaches

#### Warnings

**Allergy alert:** Ibuprofen may cause a severe allergic reaction, especially in people allergic to aspirin. Symptoms may include:

■ hives ■ facial swelling ■ asthma (wheezing)  
■ shock ■ skin reddening ■ rash ■ blisters

If an allergic reaction occurs, stop use and seek medical help right away.

**Stomach bleeding warning:** This product contains an NSAID, which may cause severe stomach bleeding.

The chance is higher if the child

■ has had stomach ulcers or bleeding problems  
■ takes a blood thinning (anticoagulant) or steroid drug  
■ takes other drugs containing prescription or nonprescription NSAIDs [aspirin, ibuprofen, naproxen, or others]

■ takes more or for a longer time than directed

**Heart attack and stroke warning:** NSAIDs, except aspirin, increase the risk of heart attack, heart failure, and stroke. These can be fatal. The risk is higher if you use more than directed or for longer than directed.

**Sore throat warning:** Severe or persistent sore throat or sore throat accompanied by high fever, headache, nausea, and vomiting may be serious. Consult doctor promptly. Do not use more than 2 days or administer to children under 3 years of age unless directed by doctor.

#### Do not use

■ if the child has ever had an allergic reaction to any other pain reliever/fever reducer  
■ right before or after heart surgery

#### Ask a doctor before use if

■ stomach bleeding warning applies to the child  
■ child has problems or serious side effects from taking pain relievers or fever reducers  
■ child has a history of stomach problems, such as heartburn  
■ child has high blood pressure, heart disease, liver cirrhosis, kidney disease, asthma, or had a stroke  
■ child has not been drinking fluids  
■ child has lost a lot of fluid due to vomiting or diarrhea  
■ child is taking a diuretic

## ***Drug Facts*** (continued)

---

**Ask a doctor or pharmacist before use if the child is**

- under a doctor's care for any serious condition
  - taking any other drug
- 

### **When using this product**

- take with food or milk if stomach upset occurs
- 

### **Stop use and ask a doctor if**

- child experiences any of the following signs of stomach bleeding:
    - feels faint
    - vomits blood
    - has bloody or black stools
    - has stomach pain that does not get better
  - child has symptoms of heart problems or stroke:
    - chest pain
    - trouble breathing
    - weakness in one part or side of body
    - slurred speech
    - leg swelling
  - the child does not get any relief within first day (24 hours) of treatment
  - fever or pain gets worse or lasts more than 3 days
  - redness or swelling is present in the painful area
  - any new symptoms appear
- 

**Keep out of reach of children.** In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

---

## ***Directions***

- this product does not contain directions or complete warnings for adult use
- do not give more than directed
- shake well before using
- mL = milliliter
- find right dose on chart. If possible, use weight to dose; otherwise use age.
- repeat dose every **6-8 hours**, if needed
- do not use more than **4 times a day**
- measure only with the dosing cup provided. Dosing cup to be used with Children's Advil Suspension only. Do not use with other products. Dose lines account for product remaining in cup due to thickness of suspension.



## Drug Facts (continued)

### Dosing Chart

Weight (lb)	Age (yr)	Dose (mL)
under 24 lb	under 2 yr	ask a doctor
24-35 lb	2-3 yr	5 mL
36-47 lb	4-5 yr	7.5 mL
48-59 lb	6-8 yr	10 mL
60-71 lb	9-10 yr	12.5 mL
72-95 lb	11 yr	15 mL

### Other information

- each 5 mL contains: **sodium 3 mg**
- one dose lasts 6-8 hours
- store at 20-25°C (68-77°F)
- see bottom of box for lot number and expiration date

### Inactive ingredients

artificial flavor, carboxymethylcellulose sodium, citric acid monohydrate, edetate disodium, FD&C red no. 40, glycerin, microcrystalline cellulose, polysorbate 80, purified water, sodium benzoate, sorbitol solution, sucrose, xanthan gum

### Questions or comments?

call toll-free **1-800-88-ADVIL** or ask your pharmacist, doctor or health care professional

**Importante:** Lea toda la información sobre el producto antes de usarlo. Conserve esta caja para información importante. Este producto está pensado para ser administrado a niños de 2 a 11 años.

## Datos sobre el fármaco

### Ingrediente activo (por cada 5 mL)

Ibuprofeno 100 mg (AINE)\* ..... Antifebril/analgésico  
\*antiinflamatorio no esteroideo

### Finalidad

## Datos sobre el fármaco (continuación)

### Usos temporales:

- baja la fiebre
- alivia dolores y malestares leves causados por el resfrío común, la gripe, el dolor de garganta, el dolor de cabeza y el dolor de muelas

### Advertencias

**Alerta de alergia:** El ibuprofeno puede provocar una reacción alérgica intensa, especialmente en personas alérgicas a la aspirina. Los síntomas pueden incluir:

- urticaria
- hinchazón facial
- asma (sibilancias)
- choque
- enrojecimiento de la piel
- erupción cutánea
- ampollas

Si se produce una reacción alérgica, interrumpa el uso y busque ayuda médica de inmediato.

**Advertencia de sangrado estomacal:** Este producto contiene un AINE, que puede provocar sangrado estomacal intenso. Las probabilidades son mayores si el niño:

- ha tenido problemas de úlceras o sangrado en el estómago
- usa un anticoagulante o un corticoesteroide
- usa otros fármacos de venta con o sin receta que contienen AINE [aspirina, ibuprofeno, naproxeno u otros]
- toma este producto en dosis mayores o durante un período más prolongado que lo indicado

### Advertencia de Ataque Cardíaco y Accidente

**Cerebrovascular:** Los NSAID, exceptuando la aspirina, aumentan el riesgo de ataque cardíaco, infarto y accidentes cerebrovasculares. Estos pueden ser fatales. El riesgo es más alto si usted usa más de lo que se receta, o por un período más largo del que se receta.

**Advertencia de dolor de garganta:** El dolor de garganta intenso o persistente, o el dolor de garganta acompañado de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas y vómitos pueden ser graves. Consulte a un médico sin demora. No use este producto durante más de 2 días ni lo administre a niños menores de 3 años a menos que lo indique un médico.

## ***Datos sobre el fármaco*** (continuación)

---

### **No lo use**

- si el niño ha presentado alguna vez una reacción alérgica a cualquier otro analgésico/antifebril
  - inmediatamente antes o después de una cirugía de corazón
- 

### **Consulte a un médico antes de usarlo si**

- la advertencia de sangrado estomacal es aplicable al niño
  - el niño tiene problemas o efectos secundarios graves por tomar analgésicos o antifebriles
  - el niño tiene antecedentes de problemas estomacales, como acidez
  - el niño tiene presión arterial alta, enfermedad cardíaca, cirrosis hepática, enfermedad renal, asthma, o tuvo un accidente cerebrovascular
  - el niño no ha estado tomando líquidos
  - el niño ha perdido gran cantidad de líquido debido a vómitos o diarrea
  - el niño está tomando un diurético
- 

### **Consulte a un médico o farmacéutico antes de usarlo si el niño**

- recibe cuidados médicos por cualquier afección grave
  - está usando algún otro fármaco
- 

### **Al usar este producto**

- adminístrelo con alimentos o leche si se produce malestar estomacal
- 

### **Interrumpa su uso y consulte a un médico si**

- el niño presenta alguno de los siguientes signos de sangrado estomacal:
  - siente que va a desmayarse
  - vomita sangre
  - tiene heces con sangre o de color negro
  - tiene dolor estomacal que no mejora
- niño(a) tiene síntomas de problemas del corazón o accidente cerebrovascular:
  - dolor de pecho
  - problemas para respirar
  - debilidad en una parte o lado del cuerpo
  - habla ininteligible o afectada
  - hinchazón de piernas



## ***Datos sobre el fármaco*** (continuación)

- el niño no presenta ninguna mejoría dentro del primer día (24 horas) de tratamiento
- la fiebre o el dolor empeoran o duran más de 3 días
- el área dolorida presenta enrojecimiento o hinchazón
- aparece algún síntoma nuevo

**Manténgalo fuera del alcance de los niños.** En caso de sobredosis, obtenga ayuda médica o comuníquese con un centro de toxicología de inmediato.

### ***Instrucciones***

- este producto no contiene instrucciones ni advertencias completas para el uso en adultos
- no administre cantidades mayores de las indicadas
- agite bien el frasco antes de usarlo
- mL = mililitro
- consulte la dosis adecuada en el cuadro. Si es posible, use el peso como referencia para la dosis; como alternativa, use la edad.
- repita la dosis cada **6 a 8 horas**, de ser necesario
- no lo use más de **4 veces por día**
- mida únicamente con el vaso dosificador suministrado. El vaso dosificador debe utilizarse exclusivamente con Children's Advil Suspension/Suspensión. No lo use con otros productos. Las líneas que marcan las dosis toman en cuenta el producto que queda adherido al vaso debido a la viscosidad de la suspensión.

#### **Cuadro de dosis**

<b>Peso (libras)</b>	<b>Edad (años)</b>	<b>Dosis (mL)</b>
menos de 24 libras	menos de 2 años	consulte a un médico
24 a 35 libras	2 a 3 años	5 mL
36 a 47 libras	4 a 5 años	7.5 mL
48 a 59 libras	6 a 8 años	10 mL
60 a 71 libras	9 a 10 años	12.5 mL
72 a 95 libras	11 años	15 mL



## ***Datos sobre el fármaco*** (continuación)

### ***Información adicional***

- cada 5 mL contienen: **3 mg de sodio**
- una dosis dura entre 6 y 8 horas
- consévelo entre 20 y 25 °C (68 a 77 °F)
- consulte el número de lote y la fecha de vencimiento en la base de la caja

### ***Ingredientes inactivos***

saborizante artificial, carboximetilcelulosa sódica, ácido cítrico monohidratado, edetato disódico, FD&C rojo n.º 40, glicerina, celulosa microcristalina, polisorbato 80, agua purificada, benzoato de sodio, solución de sorbitol, sacarosa, goma xantana

### ***¿Preguntas o comentarios?***

llame gratuitamente al **1-800-88-ADVIL** o consulte a su farmacéutico, médico o profesional de atención de la salud

**Long Lasting:** Up to 8 hours of fever reduction

**Great Convenience:** Long duration means fewer doses needed per day.

**Efecto prolongado:** Alivia la fiebre hasta 8 horas

**Muy conveniente:** El efecto más prolongado significa que se necesitan menos dosis al día.

For most recent product information,  
visit [www.Advil.com](http://www.Advil.com)

Para ver la información más reciente  
sobre el producto, visite [www.Advil.com](http://www.Advil.com)

Distributed by:

GSK Consumer Healthcare Warren, NJ 07059

©2023 GSK or licensor