

**PROYECTO DE PROSPECTO DIGITAL (ACCESO CON CÓDIGO QR) y PROYECTO DE PROSPECTO FÍSICO (EN PAPEL):**

**ALIKAL**  
**sabor Limón**

**ÁCIDO ACETILSALICÍLICO/CAFEÍNA/BICARBONATO y CARBONATO DE SODIO/ÁCIDO CÍTRICO**

Venta Libre  
1 comprimido + 1 dosis de polvo efervescente (4,5 g)

Industria Argentina

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ALIKAL**

**¿QUÉ CONTIENE?** Comprimido: Ingredientes activos: Ácido acetilsalicílico 0,48g; Cafeína anhidra 0,05g. Ingrediente inactivo: Almidón c.s. Dosis efervescente: Ingredientes activos/sobre: Bicarbonato de sodio 2,08g; Ácido cítrico 1,922g; Carbonato de sodio 0,45g. Ingredientes inactivos: Sacarina sódica, Colorante amarillo DC N° 10; Aroma limón IFF BR 14547.

**ALIKAL** es la combinación de una sal efervescente con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica.

**ACCIONES:** Analgésico (calma el dolor)–Antiácido.

**¿PARA QUÉ SE USA?**

Alivio de la acidez y de la indigestión ácida acompañada de dolor de cabeza.

**¿CÓMO SE USA?**

Vía oral solamente. Adultos y niños mayores de 16 años: En caso de síntomas, disolver el polvo contenido en un sobre en un vaso con agua (aprox. 200ml) y tomarlo junto con un comprimido. Puede tomar una segunda dosis en el mismo día por única vez, después de al menos 4 hs de la primera toma. Dosis máxima diaria: 2 sobres (cada sobre contiene 1 dosis efervescente y 1 comprimido). No tomar sin haber comido (en ayunas), ni inmediatamente luego de una comida abundante. No usar por más de 5 días sin consultar al médico. **No exceder la dosis indicada.**

**¿QUIENES NO LO PUEDEN RECIBIR?**

No lo use si: Tiene enfermedad de hígado, corazón o riñones; es alérgico a la aspirina u otros analgésicos o antiinflamatorios o cualquier otro ingrediente del producto incluyendo xantinas, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio o ácido cítrico; tiene asma, tiene o ha tenido gota; el médico le indicó que siga una dieta restringida en sodio; está recibiendo otra medicación o está siendo tratado por otra enfermedad; está en los últimos 3 meses (3er trimestre) de embarazo ya que podría dañar al feto o causar problemas durante el parto; está anticoagulado o tiene problemas de coagulación; va a ser intervenido quirúrgicamente en los próximos 7 días. Tiene o ha tenido: úlcera en el estómago, perforación o sangrado del estómago. No usar en niños menores de 16 años. La administración de aspirina a niños puede causar Síndrome de Reye (enfermedad muy rara, que puede ser mortal).

**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMARLO?**

Tenga especial precaución y consulte al médico antes de tomar este medicamento si: Tiene: más de 65 años, presión arterial alta, enfermedad alérgica o pólipos nasales, diabetes (demasiado azúcar en su sangre); se siente deshidratado (sentirse sediento con la boca seca después de episodios de diarrea o vómitos lo cual podría reducir la cantidad de agua en el cuerpo); le diagnosticaron deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD); consume en exceso bebidas con cafeína (por ej., té, café, bebidas

enlatadas con cafeína) cuando tome este medicamento ya que la alta ingesta de cafeína puede causar dificultad para dormir, temblores y molestias en el pecho causadas por palpitaciones. Especialmente consulte con su médico si Ud. está tomando lo siguiente: otros productos conteniendo aspirina o medicamentos similares llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs); alcohol; antiácidos que neutralizan la acidez del estómago; medicamentos utilizados para prevenir la coagulación de la sangre (anticoagulantes o antiplaquetarios/antiagregantes plaquetarios); anticonvulsivantes como ser valproato para tratar crisis convulsivas (ataques); inhibidores de la anhidrasa carbónica como ser acetazolamida (usada en el tratamiento de glaucoma, crisis convulsivas, o para aumentar la producción de orina); corticosteroides (usados para proveer alivio a la inflamación); sulfonilureas para tratar diabetes como ser glibenclamida; metotrexato para tratar ciertos tipos de cáncer, artritis o psoriasis; inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para tratar la depresión; agentes uricosúricos, tales como probenecid y sulfinpirazona para tratar la gota; diuréticos para aumentar la producción de orina y reducir el exceso de líquido; litio; medicamentos usados para tratar la presión arterial alta (ej. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina como ser enalapril o quinapril; o betabloqueantes como ser propranolol, atenolol y metoprolol). Alikal sabor Limón contiene 765,6 mg de sodio por dosis que deben tener en cuenta pacientes con una dieta controlada en sodio.

Si Ud. recibe otro medicamento, está embarazada, planeando quedar embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Este producto contiene ácido acetilsalicílico que puede dificultar quedar embarazada lo cual es reversible si se suspende su administración. Alikal no está recomendado para utilizar durante el embarazo ni durante la lactancia ya que el ácido acetilsalicílico puede pasar a la leche materna y puede causar daño a su bebé. Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos (ya sea venta libre o con prescripción) por eso tómelos en diferentes momentos del día, luego de consultar al médico.

#### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS LO TOMO?**

Si los síntomas persisten por más de 5 días o empeoran consulte al médico.

Puede tener flatulencia, hinchazón, náuseas, vómitos, indigestión, eructos, mareo y nerviosismo. La aspirina puede causar sangrado, debe consultar al médico si tiene algún sangrado inusual. Suspenda su uso y consulte inmediatamente al médico si tiene: Una reacción alérgica, como una erupción en la piel y picazón o silbidos o tos o dificultad para respirar; cualquier sangrado del estómago (los síntomas pueden incluir vómitos o heces con sangre); aumento en el número de sangrados nasales o moretones; zumbidos de oídos o pérdida temporaria de la audición; cualquier hinchazón de tobillos o retención de líquidos.

#### **¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Llame inmediatamente a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Htal. de Pediatría R. Gutiérrez TE. (011)4962-6666/2247. Htal. Dr. A. Posadas TE. (011)4654-6648/4658-7777. Centro de Asist. Toxicológica La Plata - TE.(0221)451-5555.

#### **¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?**

Llame al 0-800-888-6006 o escribanos a [infomedica.consumo@gsk.com](mailto:infomedica.consumo@gsk.com). ANMAT Responde: 0800-333-1234.

Almacenar por debajo de 30°C.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

No usar si el sobre no está intacto.

Elaborado por: GlaxoSmithKline Argentina S.A., C. Casares 3690, Victoria, Bs. As., Argentina. Dir. Téc.: M. Fabiana Vitale – Farm. Esp. Med. Aut. por el M.S. Cert. N°: 18.358.

Fecha última revisión:

Marcas Registradas son propiedad o licenciadas por GSK. ©2024 GSK o licenciante.

[Logo GSK]

(Lote:                    )

(Vto:                    )

**PRESENTACIONES:** Estuches conteniendo 10 y 12 sobres. Dispensers conteniendo: 24, 26, 30 y 40 sobres cada uno con su respectivo prospecto para ser fraccionado por unidad de sobre. Dispenser conteniendo 30 sobres para ser fraccionados de a tres sobres juntos con su respectivo prospecto.  
(Sólo se indicará en el envase la presentación que corresponda a la unidad de venta)