

**IBUEVANOL RÁPIDA ACCIÓN  
IBUPROFENO**

10 Cápsulas blandas

**Venta Libre**

**Industria Argentina**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO**

**¿QUÉ CONTIENE IBUEVANOL RÁPIDA ACCIÓN?**

**FÓRMULA:** Cada cápsula contiene: Ingrediente activo: Ibuprofeno 200,00 mg.

Ingredientes inactivos: Polietilenglicol 600; Hidróxido de potasio al 43%; Gelatina; Metilparabeno; Propilparabeno; Anhidrisorb 85/70; FD&C verde #3.

**ACCIONES:** Analgésico (Calma el dolor) – Antifebril (Baja la fiebre) – Antiinflamatorio (reduce la inflamación).

**¿PARA QUE SE USA?**

Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (menstruales, de espalda, de cabeza, musculares, de dientes), dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

**¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

Sólo para administración oral. Adultos y mayores de 12 años: 1 - 2 cápsulas cada 8 horas, hasta 3 veces por día. Mientras los síntomas persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 4 horas, sin exceder la dosis máxima de 6 cápsulas de 200 mg (1200 mg)/día. Tomar preferentemente con agua después de las comidas. No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 para la fiebre. Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si Ud. tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran. No tomar más de la dosis indicada. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48/72 hs consulte con su médico. No usar en niños menores de 12 años.

**¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ESTE MEDICAMENTO?**

No use este medicamento si: Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros analgésicos similares, a otros medicamentos antiinflamatorios conocidos como antiinflamatorios no esteroideos o a otros ingredientes del producto; tiene o ha tenido úlcera en el estómago, perforación o sangrado del estómago; padece falla hepática o renal o de falla cardíaca severa; está en los últimos 3 meses de embarazo.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Ud. debería discontinuar el tratamiento y consultar con un médico frente a la primera aparición de erupción cutánea, herida en la mucosa o cualquier otro signo de hipersensibilidad.

Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si: Es mayor de 65 años; está tomando otros analgésicos o medicamentos antiinflamatorios; tiene: asma, alergia o pólipos nasales, problemas de hígado o riñones, presión arterial alta, ciertos problemas circulatorios, problemas de estómago o ha tenido recientemente una cirugía de estómago, problemas intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn; o padece una enfermedad mixta del tejido conectivo ejemplo lupus eritematoso sistémico.

Consulte con su médico antes de tomar este medicamento, si Ud.: recibe algún otro medicamento; está intentando quedar embarazada, está embarazada o dando el pecho a su bebé; está tomando en particular alguno de los siguientes medicamentos: usados para prevenir la coagulación de la sangre como anticoagulantes o antiplaquetarios; usados para tratar: Infecciones como ser aminoglucósidos, algunos inhibidores de CYP2C9 y quinolonas, la presión sanguínea, falla cardíaca; corticosteroides (usados para aliviar la inflamación); ciclosporina; diuréticos para aumentar la producción urinaria y reducir el exceso de líquidos; sulfonilureas para tratar diabetes; litio e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para tratar la depresión; metotrexato para tratar algunos tipos de cáncer, artritis o psoriasis; zidovudina para tratar el VIH. Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud. está tomando una medicación en forma regular ya sea de venta libre o con receta.

Hable con su médico o farmacéutico si: Ud. tiene una infección (por favor lea lo indicado en **Infecciones**). **Infecciones:** Ibuevanol Rápida Acción puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que este producto pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si Ud. toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

Contiene 35,84 mg de potasio por cápsula a ser considerado por las personas con función renal reducida o que sigan una dieta controlada en potasio. Contiene sorbitol: una fuente de fructosa. Si su médico le dijo que Ud. es intolerante a ciertos azúcares, contáctelo antes de tomar este medicamento. Contiene FD&C verde #3 que puede causar reacciones tipo alérgicas.

Si Ud. consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte con su médico antes de tomar este medicamento.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda su uso y consulte con su médico inmediatamente si Ud. presenta: alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse algunas veces de problemas respiratorios o hinchazón de los labios, lengua, garganta o cara; erupción en la piel o descamación, o úlceras en la boca; empeoramiento de su asma; moretones o sangrado inusual, fiebre, dolor de garganta, palidez extrema o debilidad; problemas de hígado incluyendo ictericia (los síntomas pueden incluir coloración amarillenta en piel y en el blanco de los ojos); dolor de pecho; debilidad repentina en una parte o en un lado del cuerpo o una repentina dificultad para hablar; dolor estomacal, náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea o indigestión o si Ud. desarrolla úlcera en el

estómago, vomita sangre o arenilla marrón (como borra de café) o tiene materia fecal negra o si empeora una enfermedad intestinal preexistente como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

**¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Llame a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata - Tel.: (0221) 451-5555.

**CONSERVAR A TEMPERATURA INFERIOR A 25 °C.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

**ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN.**

**(LOGO)**

**¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?**

Llame al 0-800-888-6006 ó escribanos a [mystory.ar@haleon.com](mailto:mystory.ar@haleon.com)

[www.ibuevanol.com.ar](http://www.ibuevanol.com.ar)

ANMAT Responde: 0800-333-1234

Elaborado en: Av. Márquez 691, Loma Hermosa (B1657CSA), Pcia. de Bs. As.

Acondicionado por: Haleon Argentina S.A., Carlos Casares 3690, (B1644BCD) Victoria, Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: M. Fabiana Vitale – Farmacéutica.

Esp. Med. Autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N° 38.955

Fecha última revisión: Agosto 2021

Marcas Registradas son propiedad o licenciadas por Haleon. ©2024 Haleon o licenciante.

[www.ibuevanol.com.ar](http://www.ibuevanol.com.ar)

Lote No.:

Vto.:

---

**Nota:** Idéntico texto llevarán todas las presentaciones aprobadas.

IBUEVANOL RÁPIDA ACCIÓN  
GDS v 7.0  
LENC Argentina  
Junio 2024