

PRIMARIO: SOBRE	
SOBRE DOBLE UVASAL BICARBONATO Y CARBONATO DE SODIO ÁCIDO CÍTRICO ANTIÁCIDO SALES EFERVESCENTES	[Logo Haleon] Industria Argentina
Venta Libre 5g	
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO	
¿QUÉ CONTIENE UVASAL?	
Cada 100 g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 46,13 g; Ácido cítrico anhidro 43,87 g; Carbonato de sodio 10,00 g.	
ACCIONES: Antiácido	
¿PARA QUÉ SE USA UVASAL?	
UVASAL está indicado para el alivio de la indigestión ácida y la acidez.	
¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?	
Vía de administración oral. Adultos y niños mayores de 12 años: cuando aparezcan los síntomas tome el contenido de un sobre disuelto en agua (mínimo un vaso). Una segunda dosis puede ser tomada luego de 2-3 horas. No tome la segunda dosis antes de las 2 horas de haber tomado la primera. No tomar más de dos veces al día. No usar en niños menores a 12 años. Dosis máxima diaria: 2 sobres por día.	
¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR UVASAL?	
No use este medicamento si:	
<ul style="list-style-type: none"> – Tiene problemas de hígado, corazón o riñones. – Tiene presión arterial alta. – Es alérgico al bicarbonato de sodio, al carbonato de sodio o al ácido cítrico. – Sigue una dieta baja en sodio. 	
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?	
Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.	
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?	
No tomar por un período mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico. No exceda la dosis indicada. Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos.	
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases e hinchazón.	
¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?	
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.	
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.	
Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.	
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555	
¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?	
Llame al 0-800-888-6006 ó escribanos a mystory.ar@haleon.com	
ANMAT Responde: 0800-333-1234	

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.	
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.	
Proteger de temperaturas superiores a 30 °C. No usar si los sobres no están intactos.	
Elaborado por: Haeon Argentina S.A., Carlos Casares 3690, Victoria, Buenos Aires, Argentina. Dir.Téc.: M. Fabiana Vitale – Farmacéutica. Esp. Med. Aut. por el M.S. Cert. N° 4.972. Importado en Uruguay por: Epolyr S.A. Costa Rica 1720 Local 102 P.1 Torre 2. Montevideo. Preguntas 08002266. Reg. MSP 25763. Ley 15443. Venta libre en condiciones reglamentarias. Vía Oral. Dir. Tec. QF Claudia Lamas. No dejar medicamentos al alcance de los niños. Siga correctamente el modo de usar, no desapareciendo los síntomas consulte a su médico. Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), Tel. 1722. Fecha última revisión: Abril 2012	
Marcas Registradas son propiedad o licenciadas por Haeon. ©2024 Haeon o licenciante.	
ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN	
ADD CELIAC LOGO	
(Lote:	Vto:)

SECUNDARIO: ESTUCHE x 15 sobres dobles de 5 g	
UVASAL	[Logo Haeon]
BICARBONATO Y CARBONATO DE SODIO ÁCIDO CÍTRICO ANTIÁCIDO SALES EFERVESCENTES	
Venta Libre	Ind. Argentina
Contiene 15 sobres dobles de 5g	
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.	
¿QUÉ CONTIENE UVASAL?	
Cada 100 g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 46,13 g; Ácido cítrico anhidro 43,87 g; Carbonato de sodio 10,00 g.	
ACCIONES: Antiácido	
¿PARA QUÉ SE USA UVASAL?	
UVASAL está indicado para el alivio de la indigestión ácida y la acidez.	
¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?	
Vía de administración oral. Adultos y niños mayores de 12 años: cuando aparezcan los síntomas tome el contenido de un sobre disuelto en agua (mínimo un vaso). Una segunda dosis puede ser tomada luego de 2-3 horas. No tome la segunda dosis antes de las 2 horas de haber tomado la primera. No tomar más de dos veces al día. No usar en niños menores a 12 años. Dosis máxima diaria: 2 sobres por día.	
¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR UVASAL?	
No use este medicamento si:	
<ul style="list-style-type: none"> - Tiene problemas de hígado, corazón o riñones. - Tiene presión arterial alta. 	

Proyecto de Rótulo: FRASCO (Envase primario) - UVASAL Clásico

NO UTILICE SI EL PRECINTO ESTÁ ROTO

[Logo Haleon]

TIRE PARA ABRIR LA TAPA

UVASAL

Antiácido

Sales Efervescentes

BICARBONATO Y

CARBONATO DE SODIO

ACIDO CITRICO

Venta Libre

INDUSTRIA ARGENTINA

CONT. NETO 100g

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE UVASAL?

Cada 100g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 46,13g; Ácido cítrico anhidro 43,87g; Carbonato de sodio 10,00g.

ACCIONES: Antiácido

¿PARA QUÉ SE USA UVASAL?

UVASAL está indicado para el alivio de la indigestión ácida y la acidez.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración oral. Adultos y niños mayores de 12 años: cuando aparezcan los síntomas tome el contenido de 1 cucharadita de té (5 gramos) disuelto en agua (mínimo un vaso). Una segunda dosis puede ser tomada luego de 2-3 horas. No tome la segunda dosis antes de las 2 horas de haber tomado la primera. No tomar más de dos veces al día. No usar en niños menores a 12 años. Dosis máxima diaria: 2 cucharaditas de té por día.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR UVASAL?

No use este medicamento si:

- Tiene problemas de hígado, corazón o riñones.
- Tiene presión arterial alta.
- Es alérgico al bicarbonato de sodio, al carbonato de sodio o al ácido cítrico.
- Sigue una dieta baja en sodio.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

No tomar por un período mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico. No exceda la dosis indicada. Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de

otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases e hinchazón.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. Centro de Asistencia Toxicológica La Plata - Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Llame al 0-800-888-6006 ó escribanos a mystory.ar@haleon.com

ANMAT Responde: 0800-333-1234

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Proteger de temperaturas superiores a 30 °C.

Elaborado por: Haleon Argentina S.A., Carlos Casares 3690, Victoria, Bs.As., Argentina

Dir. Téc.: M. Fabiana Vitale – Farmacéutica.

Esp. Med. Aut. Por el M.S. Cert. N°: 4.972

Fecha última revisión: Abril 2012

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por el grupo de compañías Haleon. ©2024 grupo de compañías Haleon o licenciante.

ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN

[ADD TACC FREE LOGO]