

PROYECTO DE RÓTULO-PROSPECTO

UVASAL sabor LIMÓN

**BICARBONATO DE SODIO
ACIDO CÍTRICO
CARBONATO DE SODIO
ANTIÁCIDO
POLVO EFERVESCENTE**

Venta Libre

Industria Argentina

Contiene (X) sobres de 5 g (Para sobres)

Contenido neto (X) g (Para frascos)

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE UVASAL sabor Limón?

Cada 100 g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 46,215 g; Ácido cítrico 42,70 g; Carbonato de sodio 10,00 g. Ingredientes inactivos: Sacarina sódica; Colorante amarillo DC N° 10; Aroma Limón IFF BR 14547.

ACCIONES: Antiácido

¿PARA QUÉ SE USA UVASAL sabor Limón?

UVASAL sabor Limón está indicado para el alivio de la indigestión ácida y la acidez.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración oral. Adultos y niños mayores de 12 años: cuando aparezcan los síntomas tome el contenido de un sobre disuelto en agua ó 1 cucharadita de té (5 gramos) disuelto en agua. Una segunda dosis puede ser tomada luego de 2-3 horas. No tome la segunda dosis antes de las 2 horas de haber tomado la primera. No tomar más de dos veces al día. No usar en niños menores a 12 años. Dosis máxima diaria: 2 sobres ó 2 cucharaditas de té por día.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR UVASAL sabor Limón?

No use este medicamento si:

- Tiene problemas de hígado, corazón o riñones.
- Tiene presión arterial alta.
- Es alérgico al bicarbonato de sodio, al carbonato de sodio, al ácido cítrico o a otros ingredientes del producto.
- Sigue una dieta baja en sodio.

M³
AP

Florencia Domínguez
GlaxoSmithKline Argentina S.A.
Aprobada Legal

Lucía de la Roza
GlaxoSmithKline Argentina S.A.
Co-Directora Técnica
N° 14180 M.P. 16000

2297



¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

No tomar por un período mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico. No exceda la dosis indicada. Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases e hinchazón.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata- Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Llame al 0-800-888-6006 ó escribanos a infomedica.consumo@gsk.com

ANMAT Responde: 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Manténgase en lugar fresco y seco.

No usar si los sobres no están intactos (para sobres)

No usar si el precinto está roto (para frascos)

Elaborado por: **GlaxoSmithKline Argentina S.A.**, Carlos Casares 3690, (B1644BCD) Victoria, Buenos Aires, Argentina

Director Técnico: Eduardo D. Camino – Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 4.972

Fecha última revisión:

Lote:

Vto:

PRESENTACIONES: Estuches conteniendo 10, 12, 20, 25 y 30 sobres; frascos de 50 y 100 g.

MS
AP

Florencia Domínguez
GlaxoSmithKline Argentina S.A.
Apoderada Legal

Cecilia de la Roza
GlaxoSmithKline Argentina S.A.
Co-Directora Técnica
C.I. 4150 M.P. 10000