

Proyecto de Rótulo: FRASCO (Envase primario) – UVASAL sabor Naranja

SABOR NARANJA

[Logo Haleon]

NO UTILICE SI EL PRECINTO ESTÁ ROTO

TIRE PARA ABRIR LA TAPA

UVASAL

Sabor NARANJA

Antiácido

Sales Efervescentes

BICARBONATO Y

CARBONATO DE SODIO

ACIDO CITRICO

Venta Libre

INDUSTRIA ARGENTINA

CONT. NETO 100g

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE UVASAL sabor Naranja?

Cada 100g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 43,16g; Ácido cítrico 43,10g; Carbonato de sodio 10,00g. Ingredientes inactivos: Ciclamato sódico; Colorante FDC amarillo N°6; Aroma Naranja 57300 AP 0551.

ACCIONES: Antiácido

¿PARA QUÉ SE USA UVASAL sabor Naranja?

UVASAL sabor Naranja está indicado para el alivio de la indigestión ácida y la acidez.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración oral. Adultos y niños mayores de 12 años: cuando aparezcan los síntomas tome el contenido de 1 cucharadita de té (5 gramos) disuelto en agua (mínimo 1 vaso). Una segunda dosis puede ser tomada luego de 2-3 horas. No tome la segunda dosis antes de las 2 horas de haber tomado la primera. No tomar más de dos veces al día. No usar en niños menores a 12 años. Dosis máxima diaria: 2 cucharaditas de té por día.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR UVASAL sabor Naranja?

No use este medicamento si:

- Tiene problemas de hígado, corazón o riñones.
- Tiene presión arterial alta.
- Es alérgico al bicarbonato de sodio, al carbonato de sodio, al ácido cítrico o a otros ingredientes del producto.
- Sigue una dieta baja en sodio.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

No tomar por un período mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico. No exceda la dosis indicada. Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos. Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases e hinchazón.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Llame al 0-800-888-6006 ó escribanos a mystory.ar@haleon.com
ANMAT Responde: 0800-333-1234

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Proteger de temperaturas superiores a 30 °C.

Elaborado por: Haleon Argentina S.A., C. Casares 3690, Victoria, Bs.As., Argentina
Dir. Téc.: M. Fabiana Vitale – Farmacéutica.
Esp. med. aut. Por el M.S. Cert. N°: 4.972
Fecha última revisión: Abril 2012

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por el grupo de compañías Haleon. ©2024 grupo de compañías Haleon o licenciante.

ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN

[ADD TACC FREE LOGO]

Proyecto de Rótulo: SOBRE (Envase primario) - UVASAL sabor Naranja

[Logo Haleon]

SOBRE DOBLE

UVASAL
Sabor NARANJA
Sales Efervescentes
Antiácido
BICARBONATO Y
CARBONATO DE SODIO
ÁCIDO CÍTRICO

Venta Libre
5g

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE UVASAL sabor Naranja?

Cada 100 g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 43,16g; Ácido cítrico 43,10g; Carbonato de sodio 10,00g. Ingredientes inactivos: Ciclamato sódico; Colorante FDC amarillo N° 6; Aroma Naranja 57300 AP 0551.

ACCIONES: Antiácido

¿PARA QUÉ SE USA UVASAL sabor Naranja?

UVASAL sabor Naranja está indicado para el alivio de la indigestión ácida y la acidez.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración oral. Adultos y niños mayores de 12 años: cuando aparezcan los síntomas tome el contenido de un sobre disuelto en agua (mínimo 1 vaso). Una segunda dosis puede ser tomada luego de 2-3 horas. No tome la segunda dosis antes de las 2 horas de haber tomado la primera. No tomar más de dos veces al día. No usar en niños menores a 12 años. Dosis máxima diaria: 2 sobres por día.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR UVASAL sabor Naranja?

No use este medicamento si:

- Tiene problemas de hígado, corazón o riñones.
- Tiene presión arterial alta.
- Es alérgico al bicarbonato de sodio, al carbonato de sodio, al ácido cítrico o a otros ingredientes del producto.
- Sigue una dieta baja en sodio.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO? No tomar por un período mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico.

No exceda la dosis indicada. Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases o hinchazón.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777. Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Llame al 0-800-888-6006 ó escribanos a mystory.ar@haleon.com

ANMAT Responde: 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Proteger de temperaturas superiores a 30 °C.

No usar si los sobres no están intactos

Elaborado por Haleon Argentina S.A., Carlos Casares 3690, Victoria, Buenos Aires, Argentina

Dir. Téc.: M. Fabiana Vitale – Farmacéutica.

Esp. Med. Aut. Por el M.S. Cert. N° 4.972

Fecha última revisión: Abril 2012

Marcas Registradas son propiedad o licenciadas por Haleon. ©2024 Haleon o licenciante.

ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN

[ADD CELIAC LOGO]

Proyecto de Rótulo: ESTUCHE (Empaque secundario) - UVASAL sabor Naranja

[Logo Haleon]

UVASAL
Sabor NARANJA
Sales Efervescentes
Antiácido
BICARBONATO Y
CARBONATO DE SODIO
ÁCIDO CÍTRICO

Venta Libre

Contiene 15 sobres dobles de 5g

Ind. Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE UVASAL sabor Naranja?

Cada 100 g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 43,16 g; Ácido cítrico 43,10 g; Carbonato de sodio 10,00 g. Ingredientes inactivos: Ciclamato sódico; Colorante FDC amarillo N°6; Aroma Naranja 57300 AP 0551.

ACCIONES: Antiácido

¿PARA QUE SE USA UVASAL sabor Naranja?

UVASAL sabor Naranja está indicado para el alivio de la indigestión acida y la acidez.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Via de administración oral. Adultos y niños mayores de 12 años: cuando aparezcan los síntomas tome el contenido de un sobre disuelto en agua (mínimo 1 vaso). Una segunda dosis puede ser tomada luego de 2-3 horas. No tome la segunda dosis antes de las 2 horas de haber tomado la primera. No tomar más de dos veces al día. No usar en niños menores a 12 años. Dosis máxima diaria: 2 sobres por día.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR UVASAL sabor Naranja?

No use este medicamento si:

- Tiene problemas de hígado, corazón o riñones.
- Tiene presión arterial alta.
- Es alérgico al bicarbonato de sodio, al carbonato de sodio, al ácido cítrico o a otros ingredientes del producto.
- Sigue una dieta baja en sodio.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

No tomar por un periodo mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico. No exceda la dosis indicada. Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases e hinchazón.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOME MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Llame al 0-800-888-6006 o escribanos a mystory.ar@haleon.com
ANMAT Responde: 0800-333-1234

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Proteger de temperaturas superiores a 30 °C.
No usar si los sobres no están intactos

Elaborado por: Haleon Argentina S.A., Carlos Casares 3690, Victoria, Buenos Aires, Argentina
Dir. Téc.: M. Fabiana Vitale - Farmacéutica.
Esp. Med. Aut. por el M. S. Cert. N° 4.972
Fecha última revisión: Abril 2012

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por el grupo de compañías Haleon. ©2024 grupo de compañías Haleon o licenciante.

ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN
[ADD CELIAC LOGO]