

PROSPECTO UVASAL, UVASAL LIMÓN Y UVASAL NARANJA

[Logo Haleon]

UVASAL / UVASAL LIMÓN / UVASAL NARANJA

Sales Efervescentes

Antiácido

BICARBONATO Y
CARBONATO DE SODIO
ÁCIDO CÍTRICO

Venta Libre

INDUSTRIA ARGENTINA

Estuche: Contiene 15 sobres dobles de 5g

Frascos. CONT. NETO 100 g

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE UVASAL?

Cada 100 g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 46,13 g; Ácido cítrico anhidro 43,87 g; Carbonato de sodio 10,00 g.

¿QUÉ CONTIENE UVASAL SABOR NARANJA?

Cada 100 g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 43,16g; Ácido cítrico 43,10g; Carbonato de sodio 10,00g. Ingredientes inactivos: Ciclamato sódico; Colorante FDC amarillo N° 6; Aroma Naranja 57300 AP 0551.

¿QUÉ CONTIENE UVASAL SABOR LIMÓN?

Cada 100 g contiene: Ingredientes Activos: Bicarbonato de sodio 46,215 g; Ácido cítrico 42,70 g; Carbonato de sodio 10,00g. Ingredientes inactivos: Sacarina sódica; Colorante amarillo DC N°10; Aroma Limón IFF BR 14547.

ACCIONES: Antiácido

¿PARA QUÉ SE USA?

Está indicado para el alivio de la indigestión ácida y la acidez.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración oral. Adultos y niños mayores de 12 años: cuando aparezcan los síntomas tome el contenido de un sobre o 1 cucharadita de té (5 gramos) disuelto en agua (mínimo 1 vaso). Una segunda dosis puede ser tomada luego de 2-3 horas. No tome la segunda dosis antes de las 2 horas de haber tomado la primera. No tomar más de dos veces al día. No usar en niños menores a 12 años. Dosis máxima diaria: 2 sobres o 2 cucharaditas de té por día.

¿QUÉ PERSONAS NO LO PUEDEN RECIBIR?

No use este medicamento si:

- Tiene problemas de hígado, corazón o riñones.
- Tiene presión arterial alta.

- Es alérgico al bicarbonato de sodio, al carbonato de sodio, al ácido cítrico o a otros ingredientes del producto.
- Sigue una dieta baja en sodio.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO? No tomar por un período mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico. No exceda la dosis indicada. Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases o hinchazón.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777. Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Llame al 0-800-888-6006 ó escribanos a mystory.ar@haleon.com

ANMAT Responde: 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Proteger de temperaturas superiores a 30 °C.

Para sobres: No usar si los sobres no están intactos

Para frascos: NO UTILICE SI EL PRECINTO ESTÁ ROTO. TIRE PARA ABRIR LA TAPA

Elaborado por: Haleon Argentina S.A., Carlos Casares 3690, Victoria, Buenos Aires, Argentina

Dir. Téc.: M. Fabiana Vitale – Farmacéutica.

Esp. Med. Aut. Por el M.S. Cert. N° 4.972

Fecha última revisión: Abril 2012

Marcas Registradas son propiedad o licenciadas por Haleon. ©2026 Haleon o licenciante.

ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN

[ADD CELIAC LOGO]