

PANADOL RAPID

Información del producto

Cada tableta de Panadol Rapid contiene:

Ingrediente Activo: Acetaminofén 500mg Efecto: analgésico (alivia el dolor) / antipirético (baja la fiebre). Excipiente csp 1 tableta.

Dosis

Adultos (12 años en adelante): Administración oral 2 tabletas cada 6 horas. Use la dosis efectiva más baja que necesite para tratar sus síntomas durante el menor tiempo posible. No tome con más frecuencia que cada 4 horas. Máximo 8 tabletas en 24 horas. No se recomienda en menores de 12 años. No administrar más de 4 veces al día la dosis recomendada, ni por más de 10 días consecutivos a adultos. No exceda la dosis declarada.

Contraindicaciones

No utilice si es alérgico al acetaminofén o cualquier otro ingrediente del producto.

Advertencias y precauciones

Contiene acetaminofén. No utilice este medicamento si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofén para tratar el dolor, la fiebre, los síntomas del resfriado y la gripe o para conciliar el sueño. La dosis excesiva del acetaminofén puede causar daño serio al hígado. Siempre lea y siga la etiqueta. Consulte a su médico antes de usar si: Tiene problemas de hígado o riñón, está tomando algún medicamento o si está bajo tratamiento médico, está embarazada, tiene infección grave, tiene muy bajo peso o consume mucho alcohol, es posible que deba evitar el uso del producto por completo o limitar la cantidad de acetaminofén que toma, ya que puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica, cuyos síntomas incluyen: respiración agitada y con dificultad, náuseas, vómito, pérdida del apetito. Consulte a su médico si presenta la combinación de esos síntomas. El dolor y fiebre persisten por más de 3 días, empeora u ocurren nuevos síntomas. Puede tomar este producto durante la lactancia. Considere tomar la menor dosis efectiva y por el menor tiempo necesario.

Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

Interacción con otros medicamentos

Consulte a su médico si toma warfarina o medicamentos similares.

Reacciones adversas

Deje de usar si: Tiene reacciones alérgicas en la piel, problemas respiratorios, hinchazón de labios, lengua, cara o garganta, descamación o úlceras en la boca; hematomas o sangrado inexplicables. Experimenta reacciones en piel como el Síndrome de Stevens-Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica o Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda. Ha sufrido previamente problemas de respiración al consumir ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta reacciones similares. Estas reacciones son raras.

Sobredosis

Si excede la dosis recomendada: Consulte a su médico inmediatamente incluso si no tiene ningún síntoma debido al riesgo de insuficiencia hepática.

Información adicional

Almacenar por debajo de 30°C.

Vía oral.

Venta Libre.

Úselo solo si el sobre está intacto.

Para más información, reporte de eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK al correo electrónico

fv.aecaricam@gsk.com o a los teléfonos: Costa Rica: (506) 4055-4242. El Salvador: (503) 2136-7801. Guatemala: (502) 2376-1930.

Honduras: (504) 2540-1638. Nicaragua: (505) 27222215 / (505) 27222339. Panamá: (507) 833-6768.

www.panadol.com

Manufacturado por

Haleon Panamá S.A. Panamá. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por Haleon. ©2025 Haleon o licenciante.