

PRIMARIO: SOBRE / SACHET (5 g)

Frente	Frente
[Logo de GSK] Polvo Efervescente SAL ANDREWS Limón 5 g	[Logo de GSK] Sparkling Salts ANDREWS SALTS Lemon 5 g
Alivio Rápido y Efectivo	Fast, Effective Relief
Información del Producto	Drug Facts
Cada sobre de 5 g contiene: Bicarbonato de Sodio 2,31g, Carbonato de Sodio 0,5g, Ácido Cítrico 2,13g Colorante Amarillo, Sabor a Limón. Contiene Sacarina Sódica.	Each 5 g sachet of powder contains: Sodium Bicarbonate 2,31g, Sodium Carbonate 0,5g, Citric Acid 2,13g, Yellow Colorant, Lemon Flavor. Contains Sodium Saccharin.
Usos	Uses
Para el alivio sintomático de la acidez, indigestión y el malestar estomacal debido a éstos síntomas.	For the symptomatic relief of: Heartburn, Acid Indigestion, Sour Stomach and Upset Stomach due to these symptoms.
Dosis	Dose
Adultos y niños mayores de 12 años: Disuelva un sobre en un vaso de agua. Tome cuando ocurran los síntomas. Una segunda dosis se puede tomar después de 2-3 horas. Dosis máxima: 2 sobres en 24 horas. No use por más de 14 días. Niños menores de 12 años: No se recomienda. Vía Oral. Venta libre.	Adults and children 12 years and older: Dissolve one sachet in a minimum of 1 cup of water. Drink as symptoms occur. A second dose may be taken after 2-3 hours. Maximum daily dose: 2 sachets in 24 hours. Do not use for more than 14 days. Children under 12 years: Not recommended. For oral administration only. Free Sale.
Advertencias y Precauciones	Warning and Precautions
Este producto reduce la acidez de su estómago y puede interferir con la manera en que otros medicamentos son absorbidos, por lo tanto, tome sus otros medicamentos a una hora diferente del día. No usar si tiene dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de apendicitis o si presenta sangrado rectal. No tomar conjuntamente con productos lácteos. No exceda la dosis recomendada. NO USE SI EL SOBRE ESTÁ ROTO. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS. Consérvese a menos de 30°C.	This product reduces the acidity of your stomach and may interfere with how other medications are absorbed – therefore, please take other medications at a different time of the day. Do not use if you experience stomach pain, vomiting and other symptoms of appendicitis or if you have rectal bleeding. Do not take along with dairy products. Do not exceed the stated dose. USE ONLY IF THE SACHET IS INTACT. KEEP OUT OF REACH AND SIGHT OF CHILDREN. Store below 30°C.
Contraindicaciones	Contraindications
No lo use: Si padece de enfermedades del corazón, renales o hepático crónicas; presión alta; si es alérgico al bicarbonato de sodio, carbonato de	Do not use if: You have liver, heart, or kidney problems You have high blood pressure

sodio, ácido cítrico o a algún otro componente del producto; o si está sometido a una dieta baja en sal (cada sobre contiene 0,85 g de sodio).	You are allergic to sodium bicarbonate, sodium carbonate, citric acid, or any other ingredient in this product. You are on a low sodium diet (each sachet contains 0,85 g of sodium)
Consulte a su Médico:	Consult a Doctor:
● Si los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran. ● Antes de tomar este producto si está embarazada o en periodo de lactancia ● En caso de sobredosis accidental.	● If symptoms persist for more than 3 days or worsen ● Before taking this product, if you are pregnant or breastfeeding ● In case of overdose
Interacciones:	Interactions
No se use con anticolinérgicos, quinolonas, efedrina, litio, salicilatos y tetraciclinas.	Do not use with anticholinergics, quinolones, ephedrine, lithium, salicylates or tetracyclines.
Reacciones Adversas:	Adverse Reactions:
Irritación estomacal e intestinal leve que puede causar gases o hinchazón.	Non-serious, stomach / gut irritations which could cause flatulence or bloating.

SECUNDARIO: ESTUCHE / PACKAGE (12's -50's)

Frente	Frente
[Logo de GSK] Polvo Efervescente SAL ANDREWS LIMÓN Malestar Estomacal, Acidez, Indigestión 12 sobres / 50 sobres	[Logo de GSK] Sparkling Salts ANDREWS SALTS LEMON Upset Stomach, Heartburn, Acid Indigestion 12 sachets / 50 sachets
Claims	Claims
Alivio Rápido y Efectivo	Fast, Effective Relief
Información del Producto	Drug Facts
Cada sobre de 5 g contiene: Bicarbonato de Sodio 2,31g, Carbonato de Sodio 0,5g, Ácido Cítrico 2,13g Colorante Amarillo, Sabor a Limón. Contiene Sacarina Sódica.	Each 5 g sachet of powder contains: Sodium Bicarbonate 2,31g, Sodium Carbonate 0,5g, Citric Acid 2,13g, Yellow Colorant, Lemon Flavor. Contains Sodium Saccharin.
Usos	Uses
Para el alivio sintomático de la acidez, indigestión y el malestar estomacal debido a éstos síntomas.	For the symptomatic relief of: Heartburn, Acid Indigestion, Sour Stomach and Upset Stomach due to these symptoms.
Dosis	Dose
Adultos y niños mayores de 12 años: Disuelva un sobre en un vaso de agua. Tome cuando ocurran los síntomas. Una segunda dosis se puede tomar después de 2-3 horas. Dosis máxima: 2 sobres en 24 horas. No use por más de 14 días. Niños menores de 12 años: No se recomienda. Vía Oral. Venta libre.	Adults and children 12 years and older: Dissolve one sachet in a minimum of 1 cup of water. Drink as symptoms occur. A second dose may be taken after 2-3 hours. Maximum daily dose: 2 sachets in 24 hours. Do not use for more than 14 days. Children under 12 years: Not recommended. For oral administration only. Free Sale.
Advertencias y Precauciones	Warnings and Precautions
Este producto reduce la acidez de su estómago y puede interferir con la manera en que otros medicamentos son absorbidos, por lo tanto, tome sus otros medicamentos a una hora diferente del día. No usar si tiene dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de apendicitis o si presenta sangrado rectal. No tomar conjuntamente con productos lácteos. No exceda la dosis recomendada. NO USE SI EL SOBRE ESTÁ ROTO. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS. Consérvese a menos de 30°C.	This product reduces the acidity of your stomach and may interfere with how other medications are absorbed – therefore, please take other medications at a different time of the day. Do not use if you experience stomach pain, vomiting and other symptoms of appendicitis or if you have rectal bleeding. Do not take along with dairy products. Do not exceed the stated dose. USE ONLY IF THE SACHET IS INTACT. KEEP OUT OF REACH AND SIGHT OF CHILDREN. Store below 30°C.
Contraindicaciones	Contraindications
No lo use:	Do not use if:

Si padece de enfermedades del corazón, renales o hepático crónicas; presión alta; si es alérgico al bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, ácido cítrico o a algún otro componente del producto; o si está sometido a una dieta baja en sal (cada sobre contiene 0,85 g de sodio).	You have liver, heart, or kidney problems You have high blood pressure You are allergic to sodium bicarbonate, sodium carbonate, citric acid, or any other ingredient in this product. You are on a low sodium diet (each sachet contains 0,85 g of sodium).
Consulte a su Médico:	Consult a Doctor:
● Si los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran. ● Antes de tomar este producto si está embarazada o en periodo de lactancia ● En caso de sobredosis accidental.	● If symptoms persist for more than 3 days or worsen. ● Before taking this product, if you are pregnant or breastfeeding. ● In case of overdose