

PRIMARIO: SOBRE / SACHET (5 g)/ SACHET (5G) MM

Frente	Frente
 Polvo Efervescente SAL ANDREWS NARANJA 5 g	 Sparkling Salts ANDREWS SALTS ORANGE 5 g
Alivio Rápido y Efectivo	Fast and Effective Relief
Información del Producto:	Drug Facts:
Cada sobre de 5 g contiene: Bicarbonato de Sodio 2.158 g, Ácido Cítrico 2.155 g, Carbonato de Sodio 0.5 g. Excipientes: Ciclamato Sódico, Aroma Naranja, Colorante FDYC Amarillo N° 6.	Each 5 g sachet of powder contains: Sodium Bicarbonate 2.158 g, Citric Acid 2.155 g, Sodium Carbonate 0.5. Excipients: Sodium Ciclamate, Orange Flavor, N° 6 Yellow FDYC colorant.
Usos:	Uses:
Para el alivio sintomático de la acidez, indigestión, ardor y malestar estomacal debido a estos síntomas.	For the symptomatic relief of: heartburn, acid indigestion, sour stomach and upset stomach due to these symptoms.
Dosis y modo de empleo:	Dose and instructions for use:
Adultos y niños mayores de 12 años: Disuelva un sobre en agua (mínimo 1 vaso). Utilice cuando ocurran los síntomas. Una segunda dosis se puede tomar después de 2-3 horas. No tome la segunda dosis con menos de 2 horas después de la primera dosis. Dosis máxima: 2 sobres en 24 horas. No use por más de 14 días. Niños menores de 12 años: No se recomienda. Vía Oral. Venta libre.	Adults and children 12 years and older: Dissolve one sachet in water (minimum of 1 cup). Use when symptoms occur. A second dose may be taken after 2-3 hours. Do not take the second dose less than 2 hours after the first dose. Maximum daily dose: 2 sachets in 24 hours. Do not use for more than 14 days. Children under 12 years: Not recommended. For oral administration only. Free Sale.
Advertencias y Precauciones:	Warning and Precautions:
Este producto reduce la acidez de su estómago y puede interferir con la manera en que otros medicamentos son absorbidos, por lo tanto, por favor tome sus otros medicamentos a una hora diferente del día. No exceda la dosis recomendada. NO USE SI EL SOBRE ESTÁ ROTO. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS. Consérvese a menos de 30°C.	This product reduces the acidity of your stomach and may interfere with how other medications are absorbed – therefore, please take other medications at a different time of the day. Do not exceed the stated dose. USE ONLY IF THE SACHET IS INTACT. KEEP OUT OF REACH AND SIGHT OF CHILDREN. Store below 30°C.
Contraindicaciones:	Contraindications:
No lo use: Si padece de enfermedades del hígado, corazón o renales; presión alta; si es alérgico al bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, ácido cítrico o a algún otro componente del	Do not use if: You have liver, heart, or kidney problems. You have high blood pressure; you are allergic to sodium bicarbonate, sodium carbonate, citric

producto; o si está sometido a una dieta baja en sodio.	acid, or any other ingredient in this product; you are on a low sodium diet.
Consulte a su Médico:	Consult a Doctor:
● Si los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran. ● Antes de tomar este producto si está embarazada o en periodo de lactancia. ● En caso de sobredosis accidental. ● Si tiene alguna duda adicional o necesita más información.	● If symptoms persist for more than 3 days or worsen. ● Before taking this product, if you are pregnant or breastfeeding. ● In case of overdose. ● If you have any additional doubt or need more information.
Interacciones:	Interactions:
La capacidad de neutralización ácida del producto puede alterar el perfil de absorción de pH específico de medicamentos administrados conjuntamente.	The acid neutralizing capacity of the product may alter the absorption profile of pH specific drugs given concomitantly.
Reacciones Adversas:	Adverse Reactions:
Irritación estomacal e intestinal leve que puede causar gases o hinchazón.	Non-serious, stomach / gut irritations which could cause wind or bloating.
Hecho por / Made by:	
GlaxoSmithKline Argentina, S.A., Carlos Cásares No.3690, Buenos Aires, Argentina.	
Titular: GlaxoSmithKline Costa Rica, S.A., Costa Rica.	
Marcas registradas de propiedad o licenciadas por GSK. ©2021 GSK o licenciante. Trade marks owned or licensed by GSK. ©2021 GSK or licensor.	
Registros Sanitarios:	
Rep. Dominicana:	
Manuf.:	
Lote:	
Exp.:	

SECUNDARIO: ESTUCHE / PACKAGE (12's-50's)	
Frente	Frente
[Logo de GSK] Polvo Efervescente SAL ANDREWS NARANJA Malestar Estomacal, Acidez, Indigestión 12 sobres / 50 sobres	[Logo de GSK] Sparkling Salts ANDREWS SALTS ORANGE Upset Stomach, Heartburn, Acid Indigestion 12 sachets / 50 sachets
Alivio Rápido y Efectivo	Fast and Effective Relief
Información del Producto:	Drug Facts:

Cada sobre de 5 g contiene: Bicarbonato de Sodio 2.158 g, Ácido Cítrico 2.155 g, Carbonato de Sodio 0.5 g. Excipientes: Ciclamato Sódico, Aroma Naranja, Colorante FDYC Amarillo N° 6.	Each 5 g sachet of powder contains: Sodium Bicarbonate 2.158 g, Citric Acid 2.155 g, Sodium Carbonate 0.5. Excipients: Sodium Ciclamate, Orange Flavor, N° 6 Yellow FDYC colorant.
Usos:	Uses:
Para el alivio sintomático de la acidez, indigestión, ardor y malestar estomacal debido a estos síntomas.	For the symptomatic relief of: heartburn, acid indigestion, sour stomach and upset stomach due to these symptoms.
Dosis y modo de empleo:	Dose and instructions for use:
Adultos y niños mayores de 12 años: Disuelva un sobre en agua (mínimo 1 vaso). Utilice cuando ocurran los síntomas. Una segunda dosis se puede tomar después de 2-3 horas. No tome la segunda dosis con menos de 2 horas después de la primera dosis. Dosis máxima: 2 sobres en 24 horas. No use por más de 14 días. Niños menores de 12 años: No se recomienda. Vía Oral. Venta libre.	Adults and children 12 years and older: Dissolve one sachet in water (minimum of 1 cup). Use when symptoms occur. A second dose may be taken after 2-3 hours. Do not take the second dose less than 2 hours after the first dose. Maximum daily dose: 2 sachets in 24 hours. Do not use for more than 14 days. Children under 12 years: Not recommended. For oral administration only. Free Sale.
Advertencias y Precauciones:	Warnings and Precautions:
Este producto reduce la acidez de su estómago y puede interferir con la manera en que otros medicamentos son absorbidos, por lo tanto, por favor tome sus otros medicamentos a una hora diferente del día. No exceda la dosis recomendada. NO USE SI EL SOBRE ESTÁ ROTO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS. Consérvese a menos de 30°C.	This product reduces the acidity of your stomach and may interfere with how other medications are absorbed – therefore, please take other medications at a different time of the day. Do not exceed the stated dose. USE ONLY IF THE SACHET IS INTACT. KEEP OUT OF REACH AND SIGHT OF CHILDREN. Store below 30°C.
Contraindicaciones:	Contraindications:
No lo use: Si padece de enfermedades del hígado, corazón o renales; presión alta; si es alérgico al bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, ácido cítrico o a algún otro componente del producto; o si está sometido a una dieta baja en sodio.	Do not use if: You have liver, heart, or kidney problems; you have high blood pressure; you are allergic to sodium bicarbonate, sodium carbonate, citric acid, or any other ingredient in this product; you are on a low sodium diet.
Consulte a su Médico:	Consult a Doctor:
● Si los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran. ● Antes de tomar este producto si está embarazada o en periodo de lactancia. ● En caso de sobredosis accidental. ● Si tiene alguna duda adicional o necesita más información.	● If symptoms persist for more than 3 days or worsen ● Before taking this product, if you are pregnant or breastfeeding. ● In case of overdose. ● If you have any additional doubt or need more information.
Interacciones:	Interactions:

La capacidad de neutralización ácida del producto puede alterar el perfil de absorción de pH específico de medicamentos administrados conjuntamente.	The acid neutralizing capacity of the product may alter the absorption profile of pH specific drugs given concomitantly.
Reacciones adversas:	Adverse Reactions:
Irritación estomacal e intestinal leve que pueden causar gases o hinchazón.	Non-serious, stomach / gut irritations which could cause wind or bloating.
Hecho por: / Made by:	
GlaxoSmithKline Argentina, S.A., Carlos Cásares No.3690, Buenos Aires, Argentina.	
Titular: GlaxoSmithKline Costa Rica, S.A., Costa Rica.	
Marcas registradas de propiedad o licenciadas por GSK. ©2021 GSK o licenciante. Trade marks owned or licensed by GSK. ©2021 GSK or licensor.	
  Para mayor información, reporte de situaciones desfavorables con el producto o quejas, contacte a GSK al correo electrónico fv.aecaricam@gsk.com o a los teléfonos:  Costa Rica: (506) 4055-4242 El Salvador: (503) 2136-7801 Guatemala: (502) 2376-1930 Honduras: (504) 2540-1638 Nicaragua: (505) 27222215 Panamá: (507) 833-6768 Jamaica: 1 (876) 630 2074 Trinidad & Tobago: 1 (868) 224 5759  www.gsk.com	
Números de Registros Sanitarios:	
Guatemala: El Salvador: Honduras: Nicaragua: Costa Rica: Panamá: Rep. Dominicana: Manuf.: Lote: Exp.:	