48 Tabletas

Mujer



REGISTROS SANITARIOS:

Costa Rica: Nº M-PA-22-00155 El Salvador: Nº F051819092019 Guatemala: N°PF-38075 Honduras: Nº HN-M-0521-0023 Nicaragua: Nº 0198291107 Panama: 63559

El tratamiento de:

- · Dolor de cabeza
- · Dolor muscular
- · Dismenorrea (dolor menstrual)

Adultos (18 años en adelante): Administración oral 2 tabletas cada 6 horas. Use la dosis efectiva más baja que necesite para tratar sus síntomas durante el menor tiempo posible. Máximo 8 tabletas en 24 horas, ancianos 6 tabletas. No se recomienda en menores de 18 años. No administrar más de 4 veces al día la dosis recomendada, ni por más de 10 días consecutivos a adultos. No exceda la dosis declarada.

No utilice si es alérgico al acetaminofén, la cafeína o cualquier otro ingrediente del producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Contiene acetaminofén. No utilice este medicamento si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofén para tratar el dolor, la fiebre, los síntomas del resfriado y la gripe o para conciliar el sueño. La dosis excesiva del acetaminofén puede causar daño serio al hígado. Siempre lea y siga la etiqueta. Consulte a su médico antes de usar si: Tiene problemas de hígado o riñón, está tomando algún medicamento o si está bajo tratamiento médico, está embarazada o en periodo de lactancia, tiene infección grave, tiene muy bajo peso o consume mucho alcohol, es posible que deba evitar el uso del producto por completo o limitar la cantidad de acetaminofén que toma, ya que puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica, cuyos sintomas incluyen: respiración agitada y con dificultad, náuseas, vómito, pérdida del apetito. Consulte a su médico si presenta la combinación de estos síntomas. El dolor y fiebre persisten por más de 3 días, empeora u ocurren nuevos síntomas. Contiene cafeína. Evite tomar grandes cantidades de café, té u otros medicamentos que contienen cafeína. Niveles altos de cafeína pueden causar dificultades para dormir, agitación, una sensación incómoda en el pecho causada por palpitaciones. Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

Este producto no se recomienda si está tomando litio. Consulte a su médico si toma warfarina o medicamentos similares.

Deje de usar si: Tiene reacciones alérgicas en la piel, problemas respiratorios, hinchazón de labios, lengua, cara o garganta, descamación o úlceras en la boca; hematomas o sangrado inexplicables. Experimenta reacciones en piel como el Síndrome de Stevens-Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica o Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda. Ha sufrido previamente problemas de respiración al consumir ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta reacciones similares. Estas reacciones son raras.

Si excede la dosis recomendada: Consulte a su médico inmediatamente incluso si no tiene ningún síntoma debido al riesgo de insuficiencia hepática.

Cada tableta de Panadol Mujer contiene:

Ingrediente Activo: Acetaminofén 500mg Efecto: analgésico (alivia el dolor) / antipirético (baja la fiebre) Cafeína 65mg. Efecto: Mejora el efecto analgésico. Excipiente csp 1 tableta.

Almacenar por debajo de 30°C. Vía oral. Venta Libre. Úselo solo si el sobre está intacto.

Para más información, reporte de eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK al correo electrónico fv.aecaricam@gsk.com o a los teléfonos: Costa Rica: (506) 4055-4242. El Salvador: (503) 2136-7801. Guatemala: (502) 2376-1930. Honduras: (504) 2540-1638. Nicaragua: (505) 27222215 / (505) 27222339.Panamá: (507) 833-6768.

www.panadol.com

GlaxoSmithKline Panamá, S.A., Panamá. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por GSK. ©2021 GSK o licenciante.

6**2**000000212457









Alivia: **Dolores menstruales** \checkmark **Dolor muscular** \checkmark

Contiene Acetaminofén y Cafeína





соте: Exp:



10