

Para mayor información, reporte de eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK al correo electrónico fv.aecaricam@gsk.com o a los teléfonos: Costa Rica: (506)4055-4242. Honduras: (504)2540-1638. Guatemala: (502)2376-1930. El Salvador: (503)2136-7801. Panamá: (507)833-6768. Nicaragua: (505)2722215 / (505)27222339.

REGISTROS SANITARIOS:
Costa Rica: M-PA-22-00202
El Salvador: 21085
Guatemala: PF-14839
Honduras: HN-M-0619-0013
Nicaragua: 0147340200
Panamá: 40840



7 451079 003639

62000000212466

Lote: Exp:



Gripe

Noche ⁺

Alivia:

- Dolor y congestión nasal •
- Estornudos •
- Fiebre •



48 Capletas



Gripe

48 Capletas

Gripe

Panadol

Noche ⁺

DOSIS

Adultos y niños ≥ 12 años: Tome 2 capletas cada 6 horas. Dosis Máxima: 8 capletas en 24 horas. Ancianos: Tome 2 capletas cada 6 horas. Dosis Máxima: 6 capletas en 24 horas. Niños (menores de 12 años): No Usar. No exceder la dosis indicada y no tomar con una frecuencia mayor a cada 6 horas. No utilizar por más de 5 días, si sus síntomas no mejoran, o el dolor y fiebre persisten por más de 3 días, en caso de estar embarazada, tratando de quedar embarazada o amamantando, consulte con su médico. No exceder la dosis indicada o la frecuencia de las dosis. Utilice siempre la menor dosis efectiva y en el menor tiempo para aliviar los síntomas. Este medicamento puede causar somnolencia, mareos, visión nublada o discapacidad psicomotora. No se debe conducir u operar maquinaria hasta estar seguro de que no se está siendo afectado por estos efectos.

CONTRAINDICACIONES

No utilice si es alérgico al acetaminofén, fenilefrina, clorfeniramina o a cualquier ingrediente. Está tomando o ha tomado en las últimas 2 semanas medicamentos llamados inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Contiene Acetaminofén. No tomar con cualquier otro medicamento para el alivio de la tos, gripe y resfriado, congestión o nariz tapada, no tome alcohol (vino, cerveza, licores) mientras esté tomando este medicamento. Evite combinarlos o limite la cantidad de acetaminofén que toma. No tome más de la dosis recomendada de este medicamento ya que una sobredosis de acetaminofén puede causar daño grave a su hígado. Lea y siga siempre las instrucciones del empaque. **Consulte un médico antes de usar si:** tiene problemas de hígado o riñón, tiene una infección severa, está severamente desnutrido, severamente por debajo de su peso apropiado o es un tomador crónico de grandes cantidades de alcohol, ya que esto podría aumentar el riesgo de acidosis metabólica. Tiene las siguientes condiciones: enfermedad cardíaca, presión sanguínea alta, hipertiroidismo, agrandamiento de la próstata, diabetes, glaucoma, un tumor cerca del riñón, convulsiones, enfermedad de los vasos sanguíneos, asma, bronquitis, o enfermedad pulmonar crónica.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS

Consulte a su médico si: está tomando medicamentos para controlar la presión arterial (betabloqueadores), antidepresivos (tríclicos-amitriptilina), digoxina para enfermedad cardíaca, para la migraña aguda (ergotamina, metisergida), para la ansiedad o para dormir, fenitoína para epilepsia, que contienen anfetaminas o para perder peso (anorexígenos), antialérgicos, warfarina o similares utilizados como anticoagulantes.

REACCIONES ADVERSAS

Al utilizar este medicamento puede experimentar: somnolencia, sedación, nerviosismo, dificultad para dormir, fatiga, mareos, dificultad para concentrarse, falta de coordinación, dolor de cabeza, visión borrosa, boca seca, aumento de la presión arterial, sensación de estar enfermo (náuseas) y vómito. Ancianos son propensos a desarrollar efectos adversos con este medicamento. Los cuidadores no deben administrar a ancianos con confusión. **Deje de usar este producto y consulte a su médico inmediatamente si usted experimenta:** reacciones alérgicas como erupción cutánea, picazón, enrojecimiento, algunas veces con dificultad para respirar o inflamación de la boca, ojos, labios, lengua, garganta y cara, o sensación de desmayo, que puede conducir a la pérdida de la conciencia. Descamación de la piel, o úlceras bucales. Problemas para respirar luego de tomar ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta reacciones similares con este producto. Ha presentado moretones inexplicables o hemorragias. Pérdida de visión, que puede ser debido a presión anormalmente alta en el ojo. Pulso acelerado o latidos cardíacos irregulares. Usted experimenta dificultad al orinar. Reacciones en piel como el Síndrome de Stevens- Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica o Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda. Estas reacciones son raras.

SOBREDOSIS

No exceda la dosis recomendada. En caso de sobredosis accidental: Consulte inmediatamente con el médico, aunque no presente síntomas, debido al riesgo de daño en el hígado.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cada capleta contiene: Acetaminofén 500 mg Analgésico (alivia el dolor) / Antipirético (baja la fiebre); Maleato de Clorfeniramina 2 mg (Antihistamínico); Clorhidrato de Fenilefrina 5 mg (Descongestionante nasal).

INFORMACIÓN ADICIONAL

No conduzca ni opere maquinarias, ya que este producto puede causar somnolencia, mareos, visión borrosa o deterioro psicomotor. Mantener fuera del alcance y vista de los niños. Almacenar por debajo de 30°C. Úselo sólo si el sobre esta intacto. Venta libre. Vía oral.

MANUFACTURADO POR

GlaxoSmithKline Panamá, S.A., Panamá. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por GSK. ©2021 GSK o licenciatas.
www.panadol.com