

# PANADOL RAPID

## Información del producto

Cada tableta de Panadol Rapid contiene:

Ingrediente Activo: Acetaminofén 500mg Efecto: analgésico (alivia el dolor) / antipirético (baja la fiebre). Excipiente csp 1 tableta.

## Use Panadol Rapid para

El alivio del dolor leve a moderado, incluyendo:

- ✓ Dolor de cabeza
- ✓ Dolor muscular
- ✓ Dolor por osteoartritis
- ✓ Fiebre y dolor después de haber sido vacunado
- ✓ Dolor posterior a tratamientos dentales / extracción dental

Además, reduce la fiebre

## Dosis

Adultos (12 años en adelante): Administración oral 2 tabletas cada 6 horas. Use la dosis efectiva más baja que necesite para tratar sus síntomas durante el menor tiempo posible. No tome con más frecuencia que cada 4 horas. Máximo 8 tabletas en 24 horas. No se recomienda en menores de 12 años. No administrar más de 4 veces al día la dosis recomendada, ni por más de 10 días consecutivos a adultos. No exceda la dosis declarada.

## Contraindicaciones

No utilice si es alérgico al acetaminofén o cualquier otro ingrediente del producto.

## Advertencias y precauciones

Contiene acetaminofén. No utilice este medicamento si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofén para tratar el dolor, la fiebre, los síntomas del resfriado y la gripe o para conciliar el sueño. La dosis excesiva del acetaminofén puede causar daño serio al hígado. Siempre lea y siga la etiqueta. Consulte a su médico antes de usar si: Tiene problemas de hígado o riñón, está tomando algún medicamento o si está bajo tratamiento médico, está embarazada, tiene infección grave, tiene muy bajo peso o consume mucho alcohol, es posible que deba evitar el uso del producto por completo o limitar la cantidad de acetaminofén que toma, ya que puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica, cuyos síntomas incluyen: respiración agitada y con dificultad, náuseas, vómito, pérdida del apetito. Consulte a su médico si presenta la combinación de esos síntomas. El dolor y fiebre persisten por más de 3 días, empeora u ocurren nuevos síntomas. Puede tomar este producto durante la lactancia. Considere tomar la menor dosis efectiva y por el menor tiempo necesario.

Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

## Interacción con otros medicamentos

Consulte a su médico si toma warfarina o medicamentos similares.

## Reacciones adversas

Deje de usar si: Tiene reacciones alérgicas en la piel, problemas respiratorios, hinchazón de labios, lengua, cara o garganta, descamación o úlceras en la boca; hematomas o sangrado inexplicables. Experimenta reacciones en piel como el Síndrome de Stevens-Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica o Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda. Ha sufrido previamente problemas de respiración al consumir ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta reacciones similares. Estas reacciones son raras.

## Sobredosis

Si excede la dosis recomendada: Consulte a su médico inmediatamente incluso si no tiene ningún síntoma debido al riesgo de insuficiencia hepática.

## Información adicional

Almacenar por debajo de 30°C. Vía oral. Venta Libre. Úselo solo si el sobre está intacto. Para reporte de situaciones desfavorables [SafetyReportingAmericas@haleon.com](mailto:SafetyReportingAmericas@haleon.com), para quejas de calidad [PQC.Caricam@haleon.com](mailto:PQC.Caricam@haleon.com) o a los teléfonos: Costa Rica: (506) 4055-4242, Honduras: (504) 2540-1638, Guatemala: (502) 2376-1930, El Salvador: (503) 2136-7801, Panamá: (507) 833-6768, Nicaragua: (505) 2722-2215 / (505) 2722-2339. [www.haleon.com](http://www.haleon.com). [www.panadol.com](http://www.panadol.com)