

Suave con tu estómago / Gentle on stomach

Empieza a actuar en 5 min / Relief starts in 5 min



Rapid



7 451079 003806

Contiene **Acetaminofén**
Contains **Acetaminophen**

Panadol

Rapid
500 mg

Efectivo alivio del dolor y fiebre
Effective pain reliever and fever reducer

5x

Rápida absorción
Fast absorption



104 tabletas recubiertas
film coated tablets



Lote / Batch No.: Exp.:

Panadol

Rapid
Fast absorption

5x

Rápida absorción
Fast absorption

104 tabletas recubiertas
film coated tablets

OPTIZORB

62000000211809

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Almacenar por debajo de 30°C.
Via oral.
Venta Libre.
Uselo solo si el sobre está intacto.
Para más información, reporte de eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK al correo electrónico fv.aecaricam@gsk.com o a los teléfonos: Costa Rica: (506) 4055-4242. El Salvador: (503) 2136-7801. Guatemala: (502) 2378-1930. Honduras: (504) 2340-1638. Nicaragua: (505) 27222275 / (505) 27222339. Panamá: (507) 833-6768.
www.panadol.com

OTHER INFORMATION:
Store below 30°C.
Oral use.
Free Sale.
Use only if pouch is intact.
For more information, reports of adverse events or product complaints, contact GSK at the email fv.aecaricam@gsk.com or by phone: Jamaica: +1 876 630 2074. Trinidad & Tobago: +1 868 224 5759.
www.panadol.com

MANUFACTURADO POR / MANUFACTURED BY:
GlaxoSmithKline Dunganvan Ltd. Irlanda/Ireland. **Empacado por/Packed by:** GlaxoSmithKline Panamá S.A. Panamá. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por GSK. ©2023 GSK o licenciante. Trade marks owned or licensed by GSK. ©2023 GSK or licenser.

REGISTROS SANITARIOS / REGISTRATION NUMBERS:
Titular: GlaxoSmithKline Costa Rica S.A., Costa Rica
Costa Rica: 4118-62-5686
El Salvador: F05230092009
Guatemala: PF-43409
Honduras: HN-M-0619-0115
Panamá: 72852

USE PANADOL RAPID PARA:
El alivio del dolor leve a moderado, incluyendo:
✓ Dolor de cabeza
✓ Dolor muscular
✓ Dolor por osteoartritis
✓ Fiebre y dolor después de haber sido vacunado
✓ Dolor posterior a tratamientos dentales / extracción dental
Además, reduce la fiebre

DOSIS:
Adultos (12 años en adelante): Administración oral 2 tabletas recubiertas cada 6 horas. Use la dosis efectiva más baja que necesite para tratar sus síntomas durante el menor tiempo posible. No tome con más frecuencia que cada 4 horas. Máximo 8 tabletas recubiertas en 24 horas. No se recomienda en menores de 12 años. No administrar más de 4 veces al día la dosis recomendada, ni por más de 10 días consecutivos a adultos. No exceda la dosis declarada.

CONTRAINDICACIONES:
No utilice si es alérgico al acetaminofén o cualquier otro ingrediente del producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Contiene acetaminofén. No utilice este medicamento si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofén para tratar el dolor, la fiebre, los síntomas del resfriado y la gripe o para conciliar el sueño. La dosis excesiva del acetaminofén puede causar daño serio al hígado. Siempre lea y siga la etiqueta. **Consulte a su médico antes de usar si:** Tiene problemas de hígado o riñón, está tomando algún medicamento o si está bajo tratamiento médico, está embarazada, tiene infección grave, tiene muy bajo peso o consume mucho alcohol, es posible que deba evitar el uso del producto por completo o limitar la cantidad de acetaminofén que toma, ya que puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica, cuyos síntomas incluyen: respiración agitada y con dificultad, náuseas, vómito, pérdida del apetito. Consulte a su médico si presenta la combinación de esos síntomas. El dolor y fiebre persisten por más de 3 días, empeora u ocurren nuevos síntomas. Puede tomar este producto durante la lactancia. Considere tomar la menor dosis efectiva y por el menor tiempo necesario. Manténer fuera del alcance y vista de los niños.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:
Consulte a su médico si toma warfarina o medicamentos similares.

REACCIONES ADVERSAS:
Deje de usar si: Tiene reacciones alérgicas en la piel, problemas respiratorios, hinchazón de labios, lengua, cara o garganta, descamación o úlceras en la boca; hematomas o sangrado inexplicables. Experimenta reacciones en piel como el Síndrome de Stevens-Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica o Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda. Ha sufrido previamente problemas de respiración al consumir ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta reacciones similares. Estas reacciones son raras.

SOBREDOSIS:
Si excede la dosis recomendada: Consulte a su médico inmediatamente incluso si no tiene ningún síntoma debido al riesgo de insuficiencia hepática.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
Cada tableta recubierta de **Panadol Rapid** contiene:
Ingrediente Activo: Acetaminofén 500mg **Electo:** analgésico (alivia el dolor) / antipirético (baja la fiebre). Excipiente csp 1 tableta recubierta.

USE PANADOL RAPID FOR:
Relief of mild to moderate pain including:
✓ Headache
✓ Muscle pain
✓ Osteoarthritis pain
✓ Fever and pain after vaccination
✓ Pain after dental procedures / tooth extraction.
In addition, it reduces fever.

DOSAGE:
Adults (12 years and older): Oral administration 2 film coated tablets every 6 hours. Use the smallest dose that you need to treat your symptoms and use the medicine for the shortest period necessary. Do not take more frequently than every 4 hours. Maximum 8 film coated tablets per 24 hours. Not recommended in children under 12 years. Do not administer more than 4 times in a day the recommended dose, or for more than 10 consecutive days to adults. Do not exceed the stated dose.

CONTRAINDICATIONS:
Do not use if you are allergic to acetaminophen or any other ingredients in the product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
Contains acetaminophen. Do not use this medicine if you are taking any other medicines containing acetaminophen to treat pain, fever, symptoms of cold and flu or to aid sleep. Do not take more than recommended dose as it may cause serious harm to your liver. Always read and follow the label. **Check with your doctor before use if you:** Have liver or kidney problems, are taking any medication or if you are under medical treatment, you are pregnant, have a severe infection, are severely underweight, or are chronic heavy alcohol user, you may need to avoid using this product altogether or limit the amount of acetaminophen that you take, as this may increase the risk of metabolic acidosis, signs of metabolic acidosis include: deep, rapid, difficult breathing, nausea, vomiting, loss of appetite. Contact a doctor immediately if you get a combination of these symptoms. Pain or fever persists for more than 3 days, gets worse or new symptoms occur. You can take this product whilst breastfeeding. Consider taking the lowest effective dose for the shortest period of time. Keep out of sight and reach of children.

DRUG INTERACTIONS:
Consult your doctor if you are taking warfarin or similar medicines.

ADVERSE REACTIONS:
Stop use if: You have skin allergic reactions, breathing problems, swelling of lips, tongue, face or throat, peeling or mouth ulcers, unexplained bruising or bleeding. You experience skin reactions such as Stevens-Johnson Syndrome, Toxic Epidermal Necrolysis or Acute Generalized Exanthematous Pustulosis. You have previously experienced breathing problems with acetylsalicylic acid or non-steroidal anti-inflammatories and experience a similar reaction. These reactions are rare.

OVERDOSE:
If you exceed the recommended dose: Seek medical advice from a doctor immediately even if you do not have any symptoms because of the risk of liver failure.

PRODUCT INFORMATION:
Each film coated tablet of **Panadol Rapid** contains:
Active ingredient Acetaminophen 500mg **Purpose:** analgesic/antipyretic.
Excipients q.e. 1 film coated tablet.