

104 capletas

Contiene Acetaminofén

Suave con el estómago

Alivio del dolor y la fiebre

500 mg

Adulto

Winasorb

6200000214171



Winasorb

Adulto

500 mg

Alivio del dolor y la fiebre

Suave con el estómago



104 capletas

Contiene Acetaminofén

Lote / Batch No.:

Exp.:

Winasorb

Adulto



7 451079 003578

USE WINASORB PARA

El alivio del dolor leve a moderado, incluyendo:

- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- Dolor por osteoartritis
- Fiebre y dolor después de haber sido vacunado
- Dolor posterior a tratamientos dentales / extracción dental

Además, reduce la fiebre

DOSIS

Adultos (12 años en adelante): Administración oral 2 capletas cada 6 horas. Use la dosis efectiva más baja que necesite para tratar sus síntomas durante el menor tiempo posible. No tome con más frecuencia que cada 4 horas. Máximo 8 capletas en 24 horas. No se recomienda en menores de 12 años. No administrar más de 4 veces al día la dosis recomendada, ni por más de 10 días consecutivos a adultos. No exceda la dosis declarada.

CONTRAINDICACIONES

No utilice si es alérgico al acetaminofén o cualquier otro ingrediente del producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Contiene acetaminofén. No utilice este medicamento si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofén para tratar el dolor, la fiebre, los síntomas del resfriado y la gripe o para conciliar el sueño. La dosis excesiva del acetaminofén puede causar daño serio al hígado. Siempre lea y siga la etiqueta. **Consulte a su médico antes de usar si:** Tiene problemas de hígado o riñón, está tomando algún medicamento o si está bajo tratamiento médico, está embarazada, tiene infección grave, tiene muy bajo peso o consume mucho alcohol, es posible que deba evitar el uso del producto por completo o limitar la cantidad de acetaminofén que toma, ya que puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica, cuyos síntomas incluyen: respiración agitada y con dificultad, náuseas, vómito, pérdida del apetito. Consulte a su médico si presenta la combinación de esos síntomas. El dolor y fiebre persisten por más de 3 días, empeora u ocurren nuevos síntomas. Puede tomar este producto durante la lactancia. Considere tomar la menor dosis efectiva y por el menor tiempo necesario. Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Consulte a su médico si toma warfarina o medicamentos similares.

REACCIONES ADVERSAS

Deje de usar si: Tiene reacciones alérgicas en la piel, problemas respiratorios, hinchazón de labios, lengua, cara o garganta, descamación o úlceras en la boca; hematomas o sangrado inexplicables. Experimenta reacciones en piel como el Síndrome de Stevens-Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica o Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda. Ha sufrido previamente problemas de respiración al consumir ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta reacciones similares. Estas reacciones son raras.

SOBREDOSIS

Si excede la dosis recomendada: Consulte a su médico inmediatamente incluso si no tiene ningún síntoma debido al riesgo de insuficiencia hepática.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cada capleta de **Winasorb adulto** contiene:

Ingrediente Activo: Acetaminofén 500mg **Efecto:** analgésico (alivia el dolor) / antipirético (baja la fiebre). Excipiente csp 1 capleta.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Almacenar por debajo de 30°C.

Vía oral.

Venta Libre.

Uselo solo si el sobre está intacto.

Para más información, reporte de eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK al correo electrónico fv.aecaricam@gsk.com o al teléfono: República Dominicana +1 (829) 956-6335 www.gsk.com

MANUFACTURADO POR: GlaxoSmithKline Panamá, S.A., Panamá. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por GSK. ©2021 GSK o licenciante

REGISTROS SANITARIOS:

República Dominicana: N° 2000-1460

www.winasorbdo.com