Advil MAX®
Dolor Severo y Alivio Hasta por 8 Horas
Ibuprofeno

Advil

MAX®

Dolor Severo y Alivio
Hasta por 8 Horas

Potente acción analgésica en 1 cápsula

Ibuprofeno

10
Cápsulas Líquidas*

Advil MAX®
Dolor Severo y Alivio Hasta por 8 Horas
Ibuprofeno

Advil MAX®
Dolor Severo y Alivio Hasta por 8 Horas
Ibuprofeno
10 Cápsulas Líquidas*

PROTÉJASE DEL CALOR

P008611019
200028013

PROTÉJASE DEL CALOR

7 702113 200861 7

Lote:
F. Fab.:
Vence:

Fórmula: Cada cápsula blanda de **Advil MAX ®** contiene Ibuprofeno **400 mg. Indicaciones:** Analgésico y antipirético. **Dosis:** Adultos y niños mayores de 12 años (> a 40 kg): Tome 1 cápsula blanda cada a 8 a horas; sin exceder de 3 cápsulas blandas (1200 mg de ibuprofeno) en 24 horas. Tomar con alimentos; si persiste el dolor por mas de 5 días, hebre por mas de 3 días, o empeoran con otros síntomas se debe suspender y consultar. Mayores de 65 años: Se debe ajustar la dosis por el médico tratante. Insuficiencia renal, hepática o cardíaca: Reducir la dosis. Administrar con precaución y con seguimiento medico. **Vía de administración:** Oral. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al ibuprofeno, a los salicilatos o antiinflamatorios no esteroides. Niños menores de 12 años. Broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico. Reacciones alérgicas a los AINEs, úlcera péptica o duodenal, sangrado gastrointestinal o cualquier otro sangrado o enfermedad ácido péptica. Disfunción hepática severa. Tercer trimestre de embarazo. Insuficiencia renal grave (depuración de creatinina <30 ml/min), falla cardíaca severa. Cirugía de derivación arterial coronaria (Bypass coronario). **Advertencias y precauciones:** Consulte a su médico para que evalúe el riesgo beneficio antes de administrar el medicamento si usted tiene: Asma, enfermedad del corazón, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, arteriopatía periférica y/o enfermedad cerebrovascular no controladas, así mismo en pacientes con factores de riesgo cardiovascular conocidos, enfermedad renal, desordenes de la coagulación, alteraciones hematológicas, insuficiencia hepática, cirrosis o enfermedades del tracto gastrointestinal, en particular gastritis o úlcera gástrica o duodenal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Si usted ha sufrido una apoplejía o si está tomando otro antiinflamatorio no esteroideo (AINE). El uso concomitante con el ácido acetilsalicílico (ASA), anticoagulantes (Por ejemplo warfarina), antagonistas plaquetarios, corticoides orales o antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRs) incrementa el riesgo de ulcera gastrointestinal y sus complicaciones. Consulte con su médico si está consumiendo ácido acetilsalicílico o algún otro antiagregante plaquetario para la prevención de un infarto de miocardio (Cardioprotector) o un accidente cerebrovascular (ACV) debido a que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico. No se recomienda el uso simultáneo de dos antiinflamatorios tipo AINE por tanto no se recomienda el consumo de ibuprofeno simultáneamente con medicamentos que contengan diclofenaco, naproxeno, nimesulide, ketoprofeno, meloxicam, celecoxib y similares. Se han descrito reacciones cutáneas graves, algunas mortales en asociación con la utilización de AINEs. Los AINEs pueden enmascarar los síntomas de las infecciones. Se ha observado meningitis aséptica con el tratamiento de ibuprofeno, más probable en pacientes con lupus eritematoso sistémico, enfermedad del colágeno, en pacientes sin patología crónica, se debe tener precaución. Suspenda la administración y consulte a su médico si nota una reacción que incluye: Enfisema de la piel, rash, ampollas, si presenta vomito con sangre, sangre en las heces o heces negras, dolor de cabeza o dolor abdominal, algunas de estas reacciones pueden ser mortales. Los pacientes con antecedentes de alergia al ácido acetilsalicílico o a otros AINEs tienen mayor riesgo de ser alérgicos al ibuprofeno. En algunos pacientes se recomienda usar un medicamento adicional para disminuir el riesgo de ulceración y sangrado digestivo. El riesgo de ulceración y sangrado del tubo digestivo se incrementa con las dosis más altas o con el consumo simultáneo de dos AINEs por tanto se debe empezar el tratamiento con la dosis efectiva mas baja. La administración continua a largo plazo puede incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, así como mayor riesgo de daño de la función renal. El riesgo de daño renal con ibuprofeno se incrementa en pacientes desfinfadratados o que tengan alteración de la función renal, hepática o cardíaca, o que consuman ciertos medicamentos. Los efectos secundarios pueden ser minimizados con el uso de dosis bajas por cortos periodos de tiempo. Si usted tiene 60 años de edad o más consulte a su médico antes de utilizar, los pacientes de mayor edad tienen mayor riesgo de reacciones adversas más severas. A menos que sea prescrito por un profesional del cuidado de la salud, detenga la administración y consulte si el dolor empeora o persiste por más de 5 días, o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días. Los pacientes que consumen ibuprofeno por tiempo prolongado deben realizarse periódicamente exámenes para evaluar las funciones renal, hepática, hematológica y cardiovascular. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite tomar este producto con el consumo excesivo de alcohol (3 o más bebidas al día). Pregunte a su médico antes de usar si usted está embarazada o lactando, se recomienda utilizarlo solo si es estrictamente necesario durante los dos primeros trimestres de embarazo o en la lactancia, está contraindicado durante el tercer trimestre del embarazo. **Fertilidad:** Puede disminuir la fertilidad por efecto de la inhibición de la ciclooxigenasa y alteraciones en la ovulación. Efecto de reversible con la suspensión del tratamiento. **Lactancia:** No se recomienda el uso de ibuprofeno durante la lactancia debido al riesgo potencial de inhibir la síntesis de prostaglandinas en el neonato. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinas: Los pacientes que experimentan mareo, vértigo, alteraciones visuales u otros trastornos del sistema desconfinuar el uso y consultar para asistencia medica inmediata. Almacenar a temperatura no mayor a 30°C. Protéjase de la luz y el calor.

10 Cápsulas Blandas. VENTA LIBRE. Marcas propiedad de o licenciadas al grupo de compañías Haleon. ©2023 Haleon o licenciante. Fabricado por: Procaps S. A. Barranquilla, Colombia. Reg. San. No. MWMA 2019M-0002510-R2. La tecnología líquida de **Advil MAX ®** contenida en una sola cápsula, provee alivio rápido y temporal de los dolores de: • Cabeza. • Espalda. • Muscular. • Asociados al resfriado común. • Cabeza asociados a migraña. • Articular. • Cólico menstrual. • Dental. **La cápsula blanda** presenta una rápida disolución y una mas rápida absorción comparada con tabletas tradicionales. * Cápsulas Blandas.

Atención al Cliente
018000-127333
mysfoy@cohbeln.com o consulte a un médico.