Advil
MAX
Ibuprofeno
HALEON
Rápido y efectivo contra el DOLOR FUERTE.
Cabeza, espalda y muscular asociado a la inflamación.
Ibuprofeno
Advil
CÁPSULAS LÍQUIDAS* 10
0.5 mm
1.5 mm
200031411
7 702132 008611
Fórmula: Cada cápsula blanda de Advil MAX contiene Ibuprofeno 400 mg. Indicaciones: Analgésico y antipirético. Dosis: Adultos y niños mayores de 12 años (> a 40 kgs: Tome 1 cápsula blanda cada 6 a 8 horas, sin exceder de 3 cápsulas blandas (1200 mg de Ibuprofeno) en 24 horas. Tomar con alimentos, si persiste el dolor por más de 5 días, fiebre por más de 3 días, o empeoran con otros síntomas se debe suspender y consultar. Mayores de 65 años: Se debe ajustar la dosis por el médico tratante. Insuficiencia renal, hepática o cardíaca: Evaluar la dosis. Administrar con precaución y con seguimiento médico. Vía de administración: Oral. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al Ibuprofeno, a los salicilatos o antiinflamatorios no esteroideos. Niños menores de 12 años. Broncoespasmo, urticaria aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico. Insuficiencias graves a los AINEs. Úlcera péptica o duodenal, sangrado gastrointestinal o cualquier otro sangrado y enfermedad ácido péptica. Disfunción hepática severa. Tercer trimestre del embarazo. Insuficiencia renal grave (Depuración de creatinina <30 ml/min). Fase cerebrovascular. Cirugía de revascularización arterial coronaria (Bypass coronario). Advertencias y precauciones: Consulta a su médico para que evalúe el riesgo beneficio antes de administrar el medicamento en usted tiene: Asma, enfermedad del corazón, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, arteriopatía periférica y/o enfermedad cerebrovascular no controladas, en niños en pacientes con trastorno de riesgo cardiovascular conocidos, enfermedad renal, deshidratación, enfermedad hepática, insuficiencia hepática, cirrosis o enfermedades del tracto gastrointestinal, en particular gastritis o úlcera gástrica o duodenal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Si usted ha sufrido una apoplejía o si está tomando otro antiinflamatorio no esteroideo (AINE). El uso concomitante con el ácido acetilsalicílico (ASA), anticoagulantes (Por ejemplo warfarina), antagonistas piperidínicos, corticoides orales o antiagregantes inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRS) incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal y sus complicaciones. Consulta con su médico si está consumiendo ácido acetilsalicílico o algún otro antiagregante plaquetario para la prevención de un infarto de miocardio (Cardioprotector) o un accidente cerebrovascular (ACV) debido a que el Ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico. No se recomienda el uso simultáneo de dos antiinflamatorios tipo AINE. Por tanto no se recomienda el consumo de Ibuprofeno simultáneamente con medicamentos que contengan Dexketoprofeno, Ketoprofeno, Ketorolaco, Meloxicam, Tenoxicam, Celecoxib y Etoricoxib. Se han descrito reacciones cutáneas graves, algunas mortales se asociación con la utilización de AINEs. Los AINEs pueden enmascarar los síntomas de las infecciones. Se ha observado meningitis aséptica con el tratamiento de Ibuprofeno, más probable en pacientes con lupus eritematoso sistémico, enfermedad del colágeno, y en pacientes sin patología crónica, se debe tener precaución. Suspenda la administración y consulta a su médico si nota una reacción que incluye: Enrojecimiento de la piel, rash, ampollas, el presenta vomito con sangre, sangre en las heces o heces negras, dolor de cabeza o dolor abdominal, algunas de estas reacciones pueden ser mortales. Los pacientes con enfermedades de angina al ácido acetilsalicílico o a otros AINEs tienen mayor riesgo de ser afectados al Ibuprofeno. En algunos pacientes se recomienda que un medicamento coadyuvante para disminuir el riesgo de aparición de AINEs por tanto se debe empezar el tratamiento con la dosis efectiva más baja, la administración continua a largo plazo puede incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, así como mayor riesgo de daño de la función renal. El riesgo de daño renal con Ibuprofeno en pacientes deshidratados o que tengan alteración de la función renal, hepática o cardíaca, o que consuman ciertos medicamentos. Los efectos secundarios pueden ser minimizados con el uso de dosis bajas por corto periodo de tiempo. Si usted tiene fiebre o dolor es dado a la función renal, la dosis efectiva más baja y por el tiempo más corto posible. Los pacientes de mayor edad tienen mayor riesgo de reacciones adversas más severas. A menos que sea prescrito por un profesional del cuidado de la salud, descartar la administración y consulte al doctor empezar o prescribe exámenes para evaluar sus funciones renal, hepática, hematológica y cardiovascular. Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite tomar este producto con el consumo excesivo de alcohol (3 o más bebidas al día). Fríjuntie a su médico antes de usar si usted está embarazada o lactando, se recomienda utilizarlo solo si es estrictamente necesario durante los dos primeros trimestres de embarazo o en la lactancia, está contraindicado durante el tercer trimestre del embarazo. Fertilidad: Puede disminuir la fertilidad. Lactancia: No se conoce la excreción por leche de la Ibuprofeno de la cicloxigenasa y alteraciones en la cinética. Debe ser prescrito en la superación del trabajo. Lactancia: No se conoce la excreción durante los dos primeros trimestres de embarazo o en la lactancia, está contraindicado durante el tercer trimestre del embarazo. Fertilidad: Puede disminuir la fertilidad. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinas: Los pacientes que experimenten mareo, vértigo, alteraciones visuales o otros trastornos del sistema nervioso central mientras están tomando Ibuprofeno, deben abstenerse de conducir o manejar maquinaria. En caso de sobredosis accidental, descontinuar el uso y consultar para asistencia médica inmediata. Almacenar a temperatura no mayor a 30°C. Protegido de la luz y el calor. 10 Cápsulas Blandas. VENTA LIBRE.
Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2023 grupo de compañías Haleon o licenciante. Fabricado por: Procaps S. A. Barranquilla, Colombia. Reg. Sanit. No. INVIMA 2019M-0003510-R2.
* Cápsulas Blandas.
Atención al Cliente
01800-1272323
mytelary.co@haleon.com
o consulte a un médico.
www.advil.com.co
MATERIAL RECICLABLE
CUIDA EL PLANETA
PROTEGER DEL CALOR