1 Cápsula **contiene Acetaminofén** 500 mg. Analgésico – antipirético. Tratamiento de fiebre y dolor de: cabeza, muscular, musculoesquelético, garganta, dental y después de procedimientos dentales y vacunación.

Dosis y administración:

Vía oral. **Adultos (incluyendo Adulto mayor) y niños mayores de 12 años:** 1 cápsula cada 4-6 horas, según sea requerido. Si los síntomas persisten o no mejoran, bajo recomendación de un profesional de salud autorizado, consuma 2 cápsulas por dosis. No exceder 6 cápsulas al día. No use por más de 3 días sin consultar al médico. No exceder la dosis recomendada. Utilizar la dosis efectiva más baja y la duración más corta de tratamiento. Tiempo mínimo entre dosis: 4 horas.

Menores de 12 años: No recomendado.

Contraindicaciones:

No usar si es alérgico al Acetaminofén u otro ingrediente del producto.

Precauciones y advertencias:

Contiene Acetaminofén. Tomar mucho Acetaminofén puede causar serio daño al hígado. No usar si: está tomando otro medicamento, prescrito o no, que contenga Acetaminofén para tratar dolor, fiebre, síntomas de resfriado o medicamentos para ayudar a dormir. Siempre leer y seguir lo descrito en el empaque. Consultar al médico antes de usar si: tiene problemas en hígado/riñón, está bajo de peso, desnutrido, toma alcohol regularmente (Tal vez deba evitar el consumo del producto por completo o limitar la cantidad de Acetaminofén). Si tiene infección severa, está gravemente desnutrido/bajo de peso o es consumidor crónico/pesado de alcohol (esto puede incrementar el riesgo de acidosis metabólica. Sus signos incluyen: respiración profunda, rápida y con dificultad, sensación de malestar/náuseas o de estar enfermo/vómito y pérdida del apetito). Contactar al médico inmediatamente si presenta una combinación de estos síntomas o no mejoran. Mantener el producto fuera del alcance y vista de los niños.

Interacciones:

Consulte al médico antes de tomarlo si está consumiendo warfarina u otros anticoagulantes. El consumo de alcohol etílico puede potenciar la toxicidad de Acetaminofén.

Reacciones adversas:

Suspender uso y consultar de inmediato al médico si presenta: Reacciones alérgicas (erupción/picazón en piel, a veces con dificultad respiratoria o hinchazón en labios, lengua, garganta o cara), descamación/erupción en piel, úlceras en boca o ha sufrido problemas respiratorios con ácido acetilsalicílico o AINEs y presenta reacción similar con este producto, hematomas sin justificación o sangrado. Estas reacciones son raras.

Embarazo y Lactancia:

Hable con el profesional en salud antes de tomarlo si está embarazada. Utilizar la dosis efectiva más baja y la duración más corta de tratamiento. Puede tomarlo mientras esté lactando.

Sobredosis:

Si excedió la dosis recomendada, consulte al médico inmediatamente, aún si no tiene síntomas debido al riesgo de falla hepática. **Antídoto:** N-acetilcisteína o metionina. Conservar bajo 30°C. Venta Libre. INVIMA 2019M-0014206-R1. Fabricado: Procaps S.A., Barranquilla, Colombia. No usar si el empaque está roto. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2023 grupo de compañías Haleon o licenciante. Contáctenos:

0180001273333
mystory.co@haleon.com
www.dolex.com.co

CONSERVE ESTA CAJA, CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA.

200029791

7 703363 006094

HALEON

acetaminofén

dolex

ActivGEL

Rápido alivio del dolor

Tecnología Líquida

10 Cápsulas Blandas

dolex ActivGEL

100 x 80 x 20