



HALEON



HALEON



50 tabletas recubiertas

problemas respiratorios con ácido acetilsalicílico o AINEs y presenta reacción similar con este producto, hematomas sin justificación sangránea. Estas reacciones son raras.

Embarazo y Lactancia:
Hable con el profesional en salud antes de tomarlo si está embarazada. Utilizar la dosis efectiva más baja y la duración más corta de tratamiento. Puede tomarlo mientras esté lactando.

Sobredosis:
Si excedió la dosis recomendada, consulte al médico inmediatamente, aun si no tiene síntomas debido al riesgo de falla hepática. **Antídotos:** N-acetilcisteína o metionina.

Conservar bajo 30°C. Venta Libre. INVIMA 20194-009003. Fabricador: GlaxoSmithKline Dunganvan Ltd. Irlanda. Envasado por: Altea Farmacéutica S.A., Bogotá D.C., Colombia. No usar si el empaque está roto. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2023 grupo de compañías Haleon o licenciantes.

Contáctenos:
CONSERVE ESTA CAJA, CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA.

018000127333
mystory.co@haleon.com
www.dolex.com.co



HALEON



50 tabletas recubiertas

1 tableta contiene **Acetaminofén** 500mg. Analgésico - antipirético. Tratamiento de fiebre y dolor de: cabeza, muscular, musculoesquelético, garganta, dental y después de procedimientos dentales y vacunación. **Dosis y Administración:** Niños: **Adultos (incluyendo Adulto mayor) y niños mayores de 12 años:** 1 tableta cada 4-6 horas según sea requerido. Si los síntomas persisten o no mejoran, bajo recomendación de un profesional de salud autorizado, consume 2 tabletas por dosis. No exceder 6 tabletas al día. No use por más de 3 días sin consultar al médico. No exceder la dosis recomendada. Diluir la dosis efectiva más baja y la duración más corta de tratamiento. Tiempo mínimo entre dosis: 4 horas. No hay estudios que demuestren que los efectos analgésicos y antipiréticos de dolex avanzado aparezcan más rápido o sean de mayor intensidad que las tabletas convencionales, es decir, no se han demostrado diferencias de relevancia clínica.

Contraindicaciones:
No usar si es alérgico al Acetaminofén u otro ingrediente del producto.

Precauciones y Advertencias:
Contiene Acetaminofén. Tomar mucho Acetaminofén puede causar daño al hígado. No usar si está tomando otro medicamento, prescrito o no, que contenga Acetaminofén para tratar dolor, fiebre, síntomas de resfriado o para ayudar a dormir. Siempre leer y seguir lo descrito en el empaque. Consultar al médico antes de usar si tiene problemas en hígado/riñón, está bajo de peso, desnutrido, toma alcohol regularmente. (Tal vez deba evitar el consumo del producto por completo o limitar la cantidad de Acetaminofén). Si tiene infección severa, está gravemente desnutrido/bajo de peso o es consumidor crónico/pesado de alcohol (esto puede incrementar el riesgo de acidosis metabólica. Sus signos incluyen: respiración profunda, rápida y con dificultad, sensación de malestar/náuseas o de estar enfermo/vómito, y pérdida del apetito). Contactar al médico inmediatamente si presenta una combinación de estos síntomas o no mejoran. Mantener el producto fuera del alcance y vista de los niños.

Interacciones:
Consulte al médico antes de tomarlo si está consumiendo warfarina u otros anticoagulantes. El consumo de alcohol etílico puede potenciar la toxicidad de Acetaminofén.

Reacciones Adversas:
Suspendir uso y consultar de inmediato al médico si presenta: Reacciones alérgicas (erupción/picazón en piel, a veces con dificultad respiratoria o hinchazón en labios, lengua, garganta o cara), descamación/erupción en piel, úlceras en boca o ha sufrido

40002674

7 707397 791476