

FF:  
FV:  
LOTE:

Sabor a frambuesa Jarabe 60mL

10003558

Para bebés de: **1-24 meses**

**dolex Bebés**

HALEON

Para bebés de: **1-24 meses**

Alivio efectivo de FIEBRE Y DOLOR

Sabor a frambuesa Dosificador en mL Jarabe 60mL

**acetaminofén**

018000-127333  
mystory.co@haleon.com  
www.dolex.com.co

7 441026 003348

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**  
**Contiene Acetaminofén.** No recomendado para menores de 1 mes. No usar este medicamento si el bebé está usando otro que tiene acetaminofén ya que puede conducir a una sobredosis. No administrar más de la dosis recomendada ya que puede causar daño grave al hígado lo que puede conducir a la muerte. Siempre leer y seguir lo descrito en el empaque. Consultar al médico antes de usar si el bebé: tiene problemas en hígado o riñón; está bajo de peso o desnutrido (es posible que deba evitar consumir el producto por completo o limitar la cantidad que pueda tomar); tiene una infección severa, está gravemente desnutrido o bajo de peso (puede incrementar el riesgo de acidosis metabólica cuyos signos incluyen: respiración profunda, rápida, con dificultad; sensación de malestar/nauseas o de estar enfermo/vómito, pérdida del apetito. Debe contactar al médico de inmediato si presenta una combinación de estos síntomas). Tiene sorbitol, el cual puede tener efecto laxante o causar diarrea, y ácido benzoico que puede aumentar la ictericia (color amarillento de la piel y los ojos) en neonatos ictericos pre-término y a término de hasta 8 semanas; consultar al médico antes de usarlo. Contiene 0.4g/mL de sorbitol y 3mg/mL de ácido benzoico. Mantener el producto fuera del alcance y la vista de los niños. Consultar al médico si los síntomas persisten.

**REACCIONES ADVERSAS:**  
 Suspender el uso del producto y consultar inmediatamente al médico si presenta: reacciones alérgicas como erupción o picazón en la piel, con o sin dificultad para respirar o hinchazón en los labios, lengua, garganta o cara; sarpullido en la piel, descamación, o úlceras en la boca; hematomas sin justificación o sangrado; ha experimentado problemas respiratorios con el ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta una reacción similar con este producto. Estas reacciones son raras.

**INTERACCIONES:**  
 Asegúrese de consultar al médico antes de usarlo si está tomando warfarina u otros anticoagulantes.

**SOBREDOSIS:**  
 Si excedió la dosis recomendada, acudir inmediatamente al hospital incluso si no tiene síntomas, debido al riesgo de falla hepática. Se han observado casos de pancreatitis aguda, usualmente con disfunción y toxicidad hepática.  
 Conservar por debajo de 30°C. Venta libre. INVIMA 2019M-0019411. Fabricado: Pharmélique S.A. Bogotá D.C., Colombia. No usar si la tapa está abierta o presenta signos de haberse abierto. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2023 grupo de compañías Haleon o licenciante.  
**CONSERVE ESTA CAJA, CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA.**

**dolex Bebés**

HALEON

Para bebés de: **1-24 meses**

Alivio efectivo de FIEBRE Y DOLOR

Sabor a frambuesa Dosificador en mL Jarabe 60mL

**acetaminofén**

**ALIVIO DEL DOLOR:**

- De cabeza
- De garganta
- Cuando salen los dientes
- Dolor de oído
- Muscular
- Musculoesquelético
- Después de procedimientos dentales/extracción dental

Alivio del dolor y fiebre después de la vacunación.  
**Alivio de la fiebre.**  
**Contiene Acetaminofén 32mg/mL equivalente a 3200mg/100mL.**

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:**  
**Bebés de 1 a 24 meses:** Elija la dosis según el peso actual del bebé (use la edad únicamente como guía). Presione fuertemente la tapa hacia abajo y sin dejar de presionar, gírela a la izquierda. Mida la cantidad exacta de líquido en el dosificador (jeringa) que viene con el producto, el cual está graduado en mililitros y le permite medir la dosis de acuerdo al peso; haga que el bebé tome el jarabe. Si excedió la dosis recomendada, acudir inmediatamente al médico.

Instrucciones de uso del producto:  
 1. Introduzca la jeringa limpia y seca en el frasco. 2. Extraiga la cantidad de jarabe requerida. Verifique que la cantidad de mililitros medida coincida con la recomendada en la tabla. 3. Administrar únicamente por vía oral y posteriormente lave la jeringa con agua, séquela y guárdela.

Para saber la dosis adecuada siga la siguiente tabla, o consulte a su médico.

Peso (Kilogramos)	Edad (meses)	Dosis (mL)
4.2 - 4.9	1	1.5
5 - 5.9	2 - 3	2
6 - 6.9	4 - 5	2.5
7 - 7.9	6 - 8	2.5 - 3
8 - 8.9	9 - 12	3 - 3.5
9 - 9.9	13 - 16	3.5 - 4
10 - 10.9	17 - 21	3.5 - 4.5
11 - 11.9	22 - 24	4 - 5

**Menores de 1 mes:** no recomendado. La dosis máxima en 24 horas es 60 mg/kg distribuida en dosis individuales de 10 - 15 mg/kg. No exceder la dosis recomendada. No administrar más de 4 dosis en 24 horas. Debe esperar mínimo 4 horas entre cada dosis. Debe utilizar la dosis más baja necesaria para lograr la eficacia y durante el periodo de tiempo más corto. No usar por más de 3 días sin consultar al médico.  
**Fiebre en bebés de 1 - 3 meses:** Si persiste por más de 24 horas (después de 4 dosis), consulte rápidamente al médico para diagnosticar si se debe a una infección seria. Fiebre posterior a la vacunación en bebés de 1 - 3 meses: Dosis única de 10 - 15 mg/kg para el alivio sintomático de la fiebre después de la vacunación. Si se requiere una segunda dosis, espere al menos 4 horas. Consulte al médico si la fiebre persiste después de una segunda dosis. Se recomienda seguir las guías de práctica clínica local donde estén disponibles.

**CONTRAINDICACIONES:**  
 No usar si es alérgico al Acetaminofén u otro ingrediente del producto.