CONTRA LOS SÍNTOMAS DE LA
GRIPA
dolex
MULTI SÍNTOMAS
HALEON
CONTRA LOS SÍNTOMAS DE LA
GRIPA
dolex
MULTI SÍNTOMAS
Dolor de cabeza y garganta •
Fiebre y molestia corporal •
Congestión y secreción nasal •
Estornudos y picazón en la nariz •
Dolor muscular •
Acetaminofén
Fenilefrina HCl
Clorfeniramina Maleato
12 TABLETAS
Lote/Batch:
Exp:
9650202000029
COMPOSICIÓN
1 tableta contiene Acetaminofén 500 mg, Fenilefrina HCl 5 mg, Clorfeniramina maleato 2 mg.
INDICACIONES
Alivio de síntomas del resfriado común.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Niños: según su requerido hasta máximo 6 tabletas/día. Si los síntomas persisten o no mejoran, hable con un médico. Usar siempre la dosis más baja y el tiempo más corto necesario para aliviar los síntomas. No exceder la dosis recomendada ni tomar con una frecuencia menor a 4 horas. No use para fiebre más de tres días y para dolor más de cinco días, sin previa consulta médica. Niños menores de 12 años: No recomendado.
CONTRAINDICACIONES
Alergia a algún componente del producto. Está o ha tomado durante las 2 últimas semanas antidepresivos IMAO, por ej. fenelzina, furazolidona, etc.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Condición Acetaminofén. No exceda dosis recomendada ya que puede causar serio daño al hígado. No usar si está tomando medicamentos, prescritos o no, que contengan Acetaminofén para dolor y fiebre, o aquellos para el alivio de los gripa y resfriado, congestión o bloqueo nasal, estimulantes tipo anfetaminas (para déficit de atención), supresores del apetito, otros que contengan antihistamínicos (para alergias), o si está tomando medicamentos para aguar e diuréticos. Evite el uso de vehículos o maquinaria pesada. Consultar al médico antes de usar si: Tiene glaucoma, retención urinaria, hipertiroidismo, jaqueca agonizada, diabetes, glaucoma, hipertensión, cardiopatía, hepatopatía, enfermedad hepática o renal, bajo peso, desnutrición, enfermedad tromboembólica (tumor otra del riñón), enfermedad de vasos sanguíneos (como el fenómeno de Reynaud), epilepsia, asma, bronquitis o trastornos pulmonares crónicos. Tiene una hipertrofia de próstata, retención de orina, problemas de hígado, riñones, vejiga, tiroides, corazón o presión alta, o si está en dieta baja en sal. Si la fiebre o el dolor persiste o empeora o aparecen otros síntomas como: erupción, dolor de cabeza severo, o no puede tomar incrementar el riesgo de Alzheimer, otros síntomas incluyen: presencia la combinación de esos síntomas. El producto puede provocar somnolencia, mareo, irritación gástrica y con dificultad, insomnio, vértigo, pérdida del apetito, cansancio o su médico si respiración agitada y con dificultad, insomnio, vértigo, pérdida del apetito, cansancio o su médico si visión borrosa, detenga inmediatamente y en algunos pacientes puede alertar seriamente la capacidad para manejar maquinas. Debe evitarse el consumo del alcohol ya que el producto puede aumentar sus efectos. No use para fiebre más de tres días y para dolor más de cinco días, sin previa consulta médica. No use si está embarazada, lactando o intenta quedar embarazada o lactando, mantener fuera de la vista y alcance de niños.
INTERACCIONES
Consulte al médico antes de iniciar o terminar cualquier medicamentos para combatir la gripa, sangrados, hacer deportivas, enfermedades cardiacas, migraña aguda, ansiedad, inquietud o cansancio, que contienen Tiabina (quinquina), está consumiendo Warfarina o similares (anticoagulantes), no ingerir alcohol mientras use este medicamento (puede potenciar la toxicidad de Acetaminofén).
REACCIONES ADVERSAS
Poder ocasionalmente presentar somnolencia, sedación, nerviosismo, dificultad para dormir, cansancio, mareos, dificultad para concentrarse, falta de coordinación, dolor de cabeza, visión borrosa, boca seca, aumento de presión arterial, náuseas y vértigo. Niños y adultos mayores son más propensos a desarrollar estos efectos. Diabéticos deben estar atentos a no dar este medicamento a niños menores de 12 años y para dolor más de cinco días, sin previa consulta médica. Niños si tiene dificultad para orinar (por posibles agrandadas). Reacciones alérgicas como sarpullido en la piel, picazón, algunas veces con dificultad para respirar o inflamación de labios, lengua, boca. Ha tenido problemas respiratorios con Ácido Acetilsalicílico o con AINEs, nuevamente o sangrando sin explicación, pérdida de visión, dolor ocular, latidos irregulares del corazón. Estas reacciones son raras.
SOBREDOSIS
Si excede la dosis recomendada, consulte al médico de inmediato, incluso si no se presenta ningún síntoma, debido al riesgo de daño hepático.
ANTÍDOTO: N-acetilcisteína o Metionina.
Conservar bajo 30°C. Vida Libre. MVMA 2009-M037-R2. Fabricado Formado por Gammahelthe Pharma S.A. Importador: Haleon Colombia S.A.S. Bogotá D.C. Colombia.
No use el producto si el sobre está dañado o abierto. Cuidado/Consulta: 018000-127333 o dolex.com.co Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías haleon. ©2023 grupo de compañías Haleon o licenciante.
CONSERVE ESTA CJA. CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA.
0180000-127333
mystory.co@haleon.com
www.dolex.com.co
7 451079 001542