CONTRA LOS SÍNTOMAS DE LA
GRIPA
dolex
MULTI SÍNTOMAS
HALEON
CONTRA LOS SÍNTOMAS DE LA
GRIPA
dolex
MULTI SÍNTOMAS
Dolor de cabeza y garganta •
Fiebre y molestia corporal •
Congestión y secreción nasal •
Estornudos y picazón en la nariz •
Dolor muscular •
Acetaminofén
Feniefrina HCl
Clorfeniramina Maleato
12 TABLETAS
Lote/Batch:
Exp:
6200000021492 4
COMPOSICIÓN
1 tableta contiene Acetaminofén 500 mg, Fenilefrina HCl 5 mg, Clorfeniramina maleato 2 mg.
INDICACIONES
Alivio de síntomas del resfriado común.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Vía oral. Adultos (mayores de 12 años): 1 tableta cada 4-6 horas, según sea requerido hasta máximo 6 tabletas/día. Si los síntomas persisten o no mejoran, hable con un médico. Usar siempre la dosis más baja y el tiempo más corto necesario para aliviar los síntomas. No exceder la dosis recomendada ni tomar con una frecuencia menor a 4 horas. No use para niños de 6 to años y para adulto mas de cinco días, sin previa consulta médica. Niños menores de 12 años: No recomendado.
CONTRAINDICACIONES
Alergia a algún componente del producto. Está o ha tomado durante las 2 últimas semanas antidepresivos IMAO, por ej: fenelzina, furazolidona, etc.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Condición Acetaminofén. No exceda dosis recomendada ya que puede causar serio daño al hígado. No usar si está tomando medicamentos prescritos o no, que contengan Acetaminofén para dolor y fiebre, o aquellos para el alivio de los gripa y resfriado, congestión o bloqueo nasal, estimulantes tipo anfetaminas (para déficit de atención), supresores del apetito, otros que contengan antihistamínicos (para alergias), o si está tomando medicamentos para reducir el ácido. Tos y gripa de duración en el empaque, consultar al médico antes de usar si: Tiene glaucoma, hipertiroidismo, hiperfimbrismo, presión aguanosa, diabetes, glaucoma, enfermedad cardíaca, hipertensión, enfermedad hepática o renal, bajo peso, desnutrición, enfermedad tiroidea (tumor área del riñón), enfermedad de vasos sanguíneos (como el fenómeno de Reynaud), epilepsia, asma, bronquitis o trastornos pulmonares crónicos. Tiene una hipertrofia de próstata, dificultad para orinar, insomnio, vértigo, pérdida del apetito (consulte a su médico si severa), lo que puede incrementar el riesgo de Alzheis Hiebaldéfica, otros síntomas incluyen: presencia la combinación de esos síntomas. El producto puede provocar somnolencia, mareo, irritación gástrica y con dificultad, insomnio, vértigo, pérdida del apetito (consulte a su médico si respiración agitada y con dificultad, insomnio, vértigo, pérdida del apetito (consulte a su médico si visión borrosa, detrioro paracomotor y en algunos pacientes puede alterar sensiblemente la capacidad para manejar maquinas. Debe evitarse el consumo del alcohol ya que el producto puede aumentar sus efectos. No use para niños mas de tres días y para adulto mas de cinco días, sin previa consulta médica. No usar si está embarazada, lactando quedar embarazada o lactando, fuéramos fuera de la vista y alcance de niños.
INTERACCIONES
Consulte al médico antes de usar si está tomando medicamentos para controlar la presión sanguínea, hacer deportista, enfermedades cardíacas, migraña aguda, ansiedad, insomnio o dolor, que contienen fenitoina (epilepsia), está consumiendo Warfarina o similares (anticoagulantes), no ingerir alcohol mientras use este medicamento (puede potenciar la toxicidad de Acetaminofén).
REACCIONES ADVERSAS
Poder ocasionalmente presentar somnolencia, sedación, nerviosismo, dificultad para dormir, cansancio, mareos, dificultad para concentrarse, falta de coordinación, dolor de cabeza, visión borrosa, boca seca, aumento de presión arterial, náuseas y vómito. Niños y adultos mayores son más propensos a desarrollar estos efectos. Diabéticos deben estar alertas a no dar este si tiene dificultad para orinar (por posibles agravamiento). Reacciones alérgicas como sarpullido en la piel, picazón, algunas veces con dificultad para respirar o inflamación de labios, lengua, garganta, cara y ojos o sensación de desmayo. Una erupción o descamación en piel o ulceras en boca. Ha tenido problemas respiratorios con Ácido Acetilsalicílico o con AINEs. Ronchones o sangrado sin explicación, pérdida de visión, dolor ocular, latidos irregulares del corazón. Estas reacciones son raras.
SOBREDOSIS
Si excedió la dosis recomendada, consulte al médico de inmediato, incluso si no se presenta ningún síntoma, debido al riesgo de daño hepático.
ANTÍDOTO: N-acetilcisteína o Metionina.
Conservar bajo 30°C. Vencimiento: 08/2027. Elaborado: Farmina por Haleon Farmina S.A. No use el producto si el sobre está dañado o abierto. Medicamento: 08000-127333 o dolex.com.co Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2023 grupo de compañías Haleon o licenciante.
CONSERVE ESTA CJA. CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA.
mystory.co@haleon.com
0180000-127333
www.dolex.com.co
dolex
CONTRA LOS SÍNTOMAS DE LA
GRIPA
MULTI SÍNTOMAS
7 451079 001542