

**Composición:**

14 tabletas **Contiene Acetaminofén** 500 mg, Cafeína 55 mg. Analgésico - antiérgico. Tratamiento de fiebre y dolor leve a moderado de cabeza, asociado a la migraña, muscular, muscular-esquelético, espalda, articular, garganta, dental, después de procedimientos dentales y vacunación.

**Dosis y administración:**

En los **Adultos (incluyendo Adulto mayor) y niños mayores de 12 años:** Tableta cada 4-6 horas según sea requerido. Si los síntomas persisten o no mejoran, bajo recomendación de un profesional de salud autorizado, consume 2 tabletas por dosis. No exceder 6 tabletas al día. No use por más de 3 días sin consultar al médico. No exceder la dosis recomendada. Utilizar la dosis efectiva más baja y la duración más corta de tratamiento. Tiempo mínimo entre dosis: 4 horas. **Menores de 12 años:** No recomendado.

**Contraindicaciones:**

No usar si es alérgico al acetaminofén, la cafeína u otro ingrediente del producto.

**Precauciones y advertencias:**

**Contiene acetaminofén.** Tomar mucho Acetaminofén puede causar daño al hígado. No usar si está tomando otro medicamento, prescrito o no, que contenga Acetaminofén para tratar dolores, fiebre, síntomas de resaca o para ayudar a dormir. Siempre leer y seguir lo descrito en el empaque. Consultar al médico antes de usar si tiene problemas en hígado/riñón, está bajo de peso, deshidratado, toma alcohol regularmente. Del vez, debe evitar el consumo del producto por completo o limitar la cantidad de Acetaminofén. Si tiene infección viral, está generalmente decaído bajo de peso o es consumidor ocasional de alcohol (esto puede incrementar el riesgo de daños metabólicos. Sus signos incluyen: respiración profunda, rápida y con dificultad, sensación de malestar/ansiedad o estar enfermo/fatigado y pérdida del apetito). Este medicamento contiene Cafeína. Se debe evitar el consumo excesivo de cafeína mientras tome este producto (ej. té, café y algunas bebidas enlatadas). Exceso de cafeína puede producir dificultad para dormir, temblores y molestias en el pecho producidos por palpitaciones. Contactar al médico inmediatamente si presenta una combinación de estos síntomas o no mejoran. Mantener el producto fuera del alcance y vista de los niños. Cada tableta contiene 0,175 mg de sodio. Metil, etil y propil parabenos sódico pueden causar reacciones alérgicas.

**Interacciones:**

Consulte al médico antes de tomarlo si está consumiendo warfarina u otros anticoagulantes. No recomendado si está consumiendo litio. El consumo de alcohol ético puede potenciar la toxicidad de Acetaminofén.

**Reacciones adversas:**

Suspender uso y consultar de inmediato al médico si presenta: Reacciones alérgicas (erupción/pelección en piel, a veces con dificultad respiratoria o hinchazón en labios, lengua, garganta o cara), desmayo/hipotensión en pie, úlcera en boca, o ha sufrido problemas respiratorios con ácido acetilsalicílico o AINEs y presenta reacción similar con este producto, hematomas sin justificación o sangrado. Estas reacciones son raras. **Embarazo y lactancia:** No recomendado. **Saludable:** Si excedió la dosis recomendada, consulte al médico inmediatamente, aún si no tiene síntomas debido al riesgo de fallo hepático. **Advertido del Acetaminofén:** N-acetilcisteína o Metionina.

Conservar bajo 30°C. Venta Libre. INVIMA 2020M-005506-01. Fabricador: GlaxoSmithKline Durgamun Ltd. Irlanda. Importador: Haleson Colombia S.A.S., Bogotá D.C., Colombia. No usar si el empaque está roto. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleson. © 2023 grupo de compañías Haleson o licenciante. Contactenos.

018000-127333  
mystery.co@haleon.com  
www.dolex.com.co

CONSERVE ESTA CAA, CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA.

62000000704812

dolex  
**Forte**<sup>NF</sup>

14 tabletas recubiertas

