

FF:
FV:
LOTE:

Sabor a frambuesa Jarabe 90mL

Para niños de **2+**

dolex Niños

HALEON



Para niños de: **2+**

Alivio efectivo de FIEBRE Y DOLOR



Sabor a frambuesa Dosificador en mL Jarabe 90mL

acetaminofén

con dificultad; sensación de malestar/nauseas o de estar enfermo/vómito, pérdida del apetito, en cuyo caso debe contactar al médico de inmediato si presenta una combinación de estos síntomas). Este producto tiene sorbitol, el cual puede tener un efecto laxante o causar diarrea. Mantener el producto fuera del alcance y la vista de los niños. Consultar al médico si los síntomas persisten.

REACCIONES ADVERSAS:
Suspender el uso y consultar inmediatamente al médico si presenta: reacciones alérgicas como erupción o picazón en la piel, con o sin dificultad para respirar o hinchazón en los labios, lengua, garganta o cara; sarpullido en la piel, descamación, o úlceras en la boca; hematomas sin justificación o sangrado; ha experimentado problemas respiratorios con el ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta una reacción similar con este producto. Estas reacciones son raras.

INTERACCIONES:
Asegúrese de consultar al médico antes de usarlo si está tomando warfarina u otros anticoagulantes.

SOBREDOSIS:
Si excedió la dosis recomendada, acudir inmediatamente al hospital incluso si no tiene síntomas, debido al riesgo de falla hepática. Se han observado casos de pancreatitis aguda, usualmente con disfunción y toxicidad hepática.

Conservar por debajo de 30°C. Venta libre. INVIMA 2019M-0019412. Fabricado: Pharmetique S.A., Bogotá D.C., Colombia. No usar si la tapa está abierta o presenta signos de haberse abierto. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2023 grupo de compañías Haleon o licenciante.

CONSERVE ESTA CAJA, CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA.

018000-127333
mystory.co@haleon.com
www.dolex.com.co



7 707172 685778

HALEON



Para niños de: **2+**

Alivio efectivo de FIEBRE Y DOLOR



Sabor a frambuesa Dosificador en mL Jarabe 90mL

acetaminofén

ALIVIO DEL DOLOR:

- De cabeza
- De garganta
- Cuando salen los dientes
- Dolor de oído
- Muscular
- Musculoesquelético
- Dolor después de procedimientos dentales / extracción dental

Alivio del dolor y la fiebre después de la vacunación
Alivio de la fiebre
Contiene Acetaminofén 32mg/mL equivalente a 3200mg/100mL.

DOSIS Y ADMINISTRACION:
Para niños de 2 años en adelante: Elija la dosis según el peso actual del niño, si no lo sabe consulte la edad en la tabla. Presione fuertemente la tapa hacia abajo y sin dejar de presionar, gírela a la izquierda. Mida la cantidad exacta de líquido en la copa que viene con el producto, la cual está graduada en mililitros y le permite medir la dosis de acuerdo al peso. Haga que el niño tome el jarabe. Si excedió la dosis recomendada, debe acudir rápidamente al médico.

Para saber la dosis adecuada siga la siguiente tabla, o consulte a su médico.

Peso (Kilogramos)	Edad (años)	Dosis (mL)
12 - 14	2	5
14.1 - 16	3	6
16.1 - 18.1	4	7
18.2 - 20.1	5	7.5
20.2 - 22.2	6	8

La dosis máxima en 24 horas es 60 mg/kg distribuida en dosis individuales de 10 - 15 mg/kg. No exceder la dosis recomendada. No administrar más de 4 dosis en 24 horas. Debe esperar mínimo 4 horas entre cada dosis. Debe utilizar la dosis más baja necesaria para lograr la eficacia y la duración de tratamiento más corta. No usar por más de 3 días sin consultar al médico.

CONTRAINDICACIONES:
No usar si es alérgico al Acetaminofén u otro ingrediente del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Contiene Acetaminofén. No usar este medicamento si el niño está usando otro medicamento que contiene acetaminofén ya que puede conducir a una sobredosis. No exceder la dosis recomendada ya que puede causar daño grave al hígado lo que puede conducir a la muerte. Siempre leer y seguir lo descrito en el empaque. Consultar al médico antes de usar si el niño: tiene problemas en hígado o riñón; está bajo de peso o desnutrido, (es posible que deba evitar el consumo del producto por completo o limitar la cantidad de acetaminofén que pueda tomar); tiene una infección severa, (esto puede incrementar el riesgo de acidosis metabólica, cuyos signos incluyen: respiración profunda, rápida,

