

Atención: No administrar más de 4 dosis en 24 horas. Nunca exponer a la luz solar directa, a temperaturas superiores a 30°C o inferiores a 5°C. Mantener el producto en su empaque original, con el sello intacto y lejos de niños y mascotas.

CONTRAINDICACIONES: No administrar si el niño tiene fiebre o dolor sin un diagnóstico médico claro. No administrar si el niño tiene problemas renales o hepáticos.

EFECTOS SECUNDARIOS: El uso prolongado puede causar daño renal o hepático. Si el niño presenta vómitos, diarrea, dolor abdominal, o cambios en su comportamiento, consulte al médico inmediatamente.

PRECAUCIONES: Evitar el uso simultáneo con otros medicamentos que contengan acetaminofén. Evitar el consumo de alcohol.

INTERACCIONES: Evitar el uso con medicamentos que contengan alcohol o otros ingredientes que puedan afectar al hígado o los riñones.

RECOMENDACIONES: Mantener la temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C). Evitar el uso en niños con problemas renales o hepáticos. Evitar el uso en niños con problemas de coagulación.

PRECAUCIONES: Evitar el uso con medicamentos que contengan alcohol o otros ingredientes que puedan afectar al hígado o los riñones.

RECOMENDACIONES: Mantener la temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C). Evitar el uso en niños con problemas renales o hepáticos. Evitar el uso en niños con problemas de coagulación.

Edad (Años)	Dosis (mg)	Frecuencia
2 - 4	100	3 veces al día
5 - 7	150	3 veces al día
8 - 12	200	3 veces al día
13 - 17	300	3 veces al día

7 451079 000874

105200000095

2+

dolx Niños

ALIVIO DEL DOLOR Y FIEBRE: El alivio del dolor y la fiebre se logra al administrar 100 mg de acetaminofén por vía oral cada 4-6 horas, hasta un máximo de 4 dosis en 24 horas.

INDICACIONES: Fiebre, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de muelas, dolor de garganta, dolor de oídos, dolor de nariz, dolor de ojos, dolor de boca, dolor de labios, dolor de piel, dolor de músculos, dolor de huesos, dolor de articulaciones.

CONTRAINDICACIONES: No administrar si el niño tiene fiebre o dolor sin un diagnóstico médico claro. No administrar si el niño tiene problemas renales o hepáticos.

EFECTOS SECUNDARIOS: El uso prolongado puede causar daño renal o hepático. Si el niño presenta vómitos, diarrea, dolor abdominal, o cambios en su comportamiento, consulte al médico inmediatamente.

PRECAUCIONES: Evitar el uso simultáneo con otros medicamentos que contengan acetaminofén. Evitar el consumo de alcohol.

INTERACCIONES: Evitar el uso con medicamentos que contengan alcohol o otros ingredientes que puedan afectar al hígado o los riñones.

RECOMENDACIONES: Mantener la temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C). Evitar el uso en niños con problemas renales o hepáticos. Evitar el uso en niños con problemas de coagulación.

HALEON



Para niños de: **2+**

Alivio efectivo de FIEBRE Y DOLOR

Sabor a cereza **acetaminofén** **20** Tabletas Masticables

Lote:
 F. Exp:
 7 451079 000874

Generar por debajo de 30°C. Venta libre. INVIMA 01224-08029-04. Fabricado en Colombia por Haleon Pharmaceuticals, Inc. No usar si el producto está abierto o presenta signos de haberse alterado. Nunca administrar más de 4 dosis en 24 horas. Mantener alejado de niños y mascotas. Conserve en su empaque original. **CONSERVE EN SU EMPAQUE ORIGINAL.**

Atención: No administrar más de 4 dosis en 24 horas. Nunca exponer a la luz solar directa, a temperaturas superiores a 30°C o inferiores a 5°C. Mantener el producto en su empaque original, con el sello intacto y lejos de niños y mascotas.

CONTRAINDICACIONES: No administrar si el niño tiene fiebre o dolor sin un diagnóstico médico claro. No administrar si el niño tiene problemas renales o hepáticos.

EFECTOS SECUNDARIOS: El uso prolongado puede causar daño renal o hepático. Si el niño presenta vómitos, diarrea, dolor abdominal, o cambios en su comportamiento, consulte al médico inmediatamente.

PRECAUCIONES: Evitar el uso simultáneo con otros medicamentos que contengan acetaminofén. Evitar el consumo de alcohol.

INTERACCIONES: Evitar el uso con medicamentos que contengan alcohol o otros ingredientes que puedan afectar al hígado o los riñones.

RECOMENDACIONES: Mantener la temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C). Evitar el uso en niños con problemas renales o hepáticos. Evitar el uso en niños con problemas de coagulación.