



1 tableta contiene Acetaminofén 500 mg. Analgésico – antipirético. Tratamiento de fiebre y dolor de: cabeza, muscular, musculoesquelético, garganta, dental, y después de procedimientos dentales y vacunación. **Dosis y Administración:** Via oral. **Adultos (Incluyendo Adulto mayor) y niños mayores de 12 años:** 1 tableta cada 4-6 horas según sea requerido. Si los síntomas persisten o no mejoran, bajo recomendación de un profesional de salud autorizado, consumo 2 tabletas por dosis. No exceder 6 tabletas al día. No usar por más de 3 días sin consultar al médico. No exceder la dosis recomendada. Utilizar la dosis efectiva más baja y la duración más corta de tratamiento. Tiempo mínimo entre dosis: 4 horas.

**Contraindicaciones:**  
No usar si es alérgico al Acetaminofén u otro ingrediente del producto.  
**Precauciones y Advertencias:**  
**Contiene Acetaminofén.** Tomar mucho Acetaminofén puede causar serio daño al hígado. No usar si: está tomando otro medicamento, prescrito o no, que contenga Acetaminofén para tratar dolor, fiebre, síntomas de resfriado o para ayudar a dormir. Siempre leer y seguir lo descrito en el empaque. Consultar al médico antes de usar si: tiene problemas en hígado/riñón, está bajo de peso, desnutrido, toma alcohol regularmente (Tal vez deba evitar el consumo del producto por completo o limitar la cantidad de Acetaminofén). Si tiene infección severa, está gravemente

dolex  
Acetaminofén  
**Rápida acción**  
Efectivo alivio del dolor  
Suave con su estómago  
24 tabletas recubiertas



desnutrido/bajo de peso o es consumidor crónico/pesado de alcohol (esto puede incrementar el riesgo de acidosis metabólica. Sus signos incluyen: respiración profunda, rápida y con dificultad, sensación de malestar/náuseas o de estar enfermo/vómito y pérdida del apetito). Contactar al médico inmediatamente si presenta una combinación de estos síntomas o no mejoran. Mantener el producto fuera del alcance y vista de los niños.


**Interacciones:**  
Consulte al médico antes de tomarlo si está consumiendo warfarina u otros anticoagulantes. El consumo de alcohol etílico puede potenciar la toxicidad de Acetaminofén.  
**Reacciones Adversas:**  
Suspender uso y consultar de inmediato al médico si presenta: Reacciones alérgicas (erupción/picazón en piel, a veces con dificultad respiratoria o hinchazón en labios, lengua, garganta o cara), descamación/erupción en piel, úlceras en boca, o ha sufrido problemas respiratorios con ácido acetilsalicílico o AINEs y presenta reacción similar con este producto, hematomas sin justificación o sangrado. Estas reacciones son raras.

**Embarazo y Lactancia:**  
Hable con el profesional en salud antes de tomarlo si está embarazada. Utilizar la dosis efectiva más baja y la duración más corta de tratamiento. Puede tomarlo mientras esté lactando.

**Sobredosis:**  
Si excedió la dosis recomendada, consulte al médico inmediatamente, aún si no tiene síntomas debido al riesgo de falla hepática. **Antídoto:** N-acetilcisteína o metionina.

Conservar bajo 30°C. Vento Libre. INVIMA 2019M-0015572-R1. Fabricado: GlaxoSmithKline Dunparvan Ltd. India. Importado: Haleon Colombia S.A.S. Bogotá D.C., Colombia. Envasado: Altea Farmacéutica S.A., Colombia. No usar si el empaque está roto. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por Haleon. 6/2024 Haleon o licenciantes.

CONSERVE ESTA CAJA, CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA.  
018000-127333  
mystory.co@haleon.com  
www.dolex.com.co



LEDA