



Winasorb Niños

HALEON

Jarabe
Acetaminofén 160 mg por 5 mL

Lea detenidamente este inserto antes de utilizar Winasorb Niños. Consérvelo por si necesita volver a leerlo. Consulte a su profesional de la salud si tiene alguna duda.

Denominación Común Internacional:
Acetaminofén

Fórmula del Medicamento

1. ¿Qué contiene Winasorb Niños?
Cada 5 mL contiene
Acetaminofén 160 mg. La solución también contiene sacarina sódica, saborizante, ácido benzoico, colorante rojo #40.

Propiedades / Indicaciones

2. ¿Para qué sirve Winasorb Niños?
Use Winasorb Niños para

El alivio de:

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor y fiebre asociado con la dentición
- Dolor después de tratamiento dental / extracción dental
- Dolor y fiebre asociado a la vacunación

Dosis / Modo de Empleo

3. ¿Cómo debe ser usado Winasorb Niños?
Para uso oral únicamente.
Utilice siempre la copa dosificadora proporcionada en el empaque. La copa dosificadora tiene varias escalas, refiérase al peso del niño en la tabla para suministrar la dosis adecuada. Mida la cantidad exacta de líquido en la copa dosificadora.

Dosis (cada 6 horas)

PESO	EDAD	DOSIS
13-15 kg	2-3 años	6 ml
16-19 kg	4-5 años	7.5 ml
20-25 kg	6-7 años	9 ml
26-31 kg	8-9 años	12 ml
32-42 kg	10-12 años	15 ml

Dosis máxima diaria: 60 mg / kg administrados en dosis divididas de 10 a 15 mg / kg durante el período de 24 horas. Se puede repetir cada 6 horas si los síntomas persisten, sin exceder 4 tomas en un período de 24 horas, ni por más de 3 días consecutivos sin consultar al médico. No tomar junto con otros medicamentos de prescripción o sin prescripción que contengan acetaminofén o indicados para el alivio del dolor, fiebre, resfrios o para conciliar el sueño. No se recomienda en niños menores de 2 años. Los rangos de edad en la tabla de dosificación son solamente orientativos. Utilice siempre la menor dosis efectiva para tratar los síntomas y en el menor período de tiempo necesario.

Contraindicaciones

4. ¿Cuándo no debe usarse Winasorb Niños?
No utilice el medicamento si es alérgico o hipersensible al acetaminofén o a cualquier componente de la formulación.



Advertencias y Precauciones

5. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Winasorb Niños?

Contiene acetaminofén. No utilizar con otros productos que contengan acetaminofén porque puede ocurrir una sobredosis. Nunca suministre más medicamento de la que se muestra en la tabla. No sobrellene la copa dosificadora. La dosis excesiva del acetaminofén puede causar daño grave al hígado.

Antes de tomar o cuando suministre este medicamento consulte a su médico si:

El dolor y la fiebre persisten por más de 3 días, empeora u ocurren nuevos síntomas. Si ha sido diagnosticado con mal funcionamiento del hígado o de los riñones. Está bajo de peso o desnutrido. Está tomando warfarina u otros medicamentos anticoagulantes. Si tiene infección severa, está severamente desnutrido o severamente bajo de peso, lo que puede incrementar el riesgo de acidosis metabólica, cuyos síntomas incluyen: respiración agitada y con dificultad, náuseas, vómito, pérdida del apetito. Consulte a su médico si presenta la combinación de esos síntomas. Lea y siga las instrucciones del empaque. Contiene colorante rojo #40 puede provocar reacciones alérgicas.

Interacciones

6. ¿Está tomando otros medicamentos?

Consulte a su médico si su niño toma warfarina o medicamentos similares para adelgazar la sangre.

Reacciones Adversas

7. ¿Qué reacciones secundarias puede causar Winasorb Niños?

Deje de administrar este medicamento y consulte a su médico inmediatamente si:

- Experimenta una reacción alérgica como salpullido en la piel, picazón, en ocasiones con problemas para respirar, inflamación de labios, lengua, garganta y cara.

- Experimenta descamación de la piel y úlceras bucales.
- Si ha experimentado problemas para respirar luego de tomar ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta esas reacciones con este medicamento.
- Experimenta reacciones en piel como el Síndrome de Steven- Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica y Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda.
- Experimenta sangrado o hematomas inexplicables. Estas reacciones son raras.

Manejo de Sobredosis

Si toma más cantidad de medicamento de lo indicado, consulte inmediatamente al médico, aunque no presente síntomas, debido al riesgo de daño hepático. La sobredosis de acetaminofén puede causar insuficiencia hepática que puede llevar a un trasplante de hígado o la muerte.

Información Adicional

- Consérvese a menos de 30°C.
- Manténgase fuera del alcance y vista de los niños.
- Uso pediátrico.
- Presentaciones: Frasco con 30 mL, 60 mL y 90 mL. Algunas presentaciones no están a la venta en todos los países.

Para mayor información, contacte a Haleon al correo electrónico para reporte de situaciones desfavorables farmacovigilanciaca@haleon.com, para quejas de calidad PQC.caricam@haleon.com o al teléfono: República Dominicana +1 (829) 956-6335.

Fabricado por Pharmetique S.A., Colombia.
Titular: Haleon Costa Rica S.A., Costa Rica.

Fecha de la última revisión: Marzo 2019, basado en el GDS v7.0 de Agosto 2017



10003580