



Winasorb Niños

Tabletas Masticables
Acetaminofén 80 mg
por tableta masticable

HALEON

Refinar al peso del niño en la tabla para suministrar la dosis adecuada.

DOSIS (cada 6 horas):	PESO	EDAD	DOSIS
	13 – 15 kg	2 – 3 años	2 tabletas
	16 – 19 kg	4 – 5 años	3 tabletas
	20 – 25 kg	6 – 7 años	3.5 tabletas
	26 – 31 kg	8 – 9 años	4.5 tabletas
	32 – 42 kg	10-12 años	6 tabletas

Dosis máxima diaria: 60 mg/kg administrados en dosis divididas de 10 a 15 mg/kg durante el periodo de 24 horas. Se puede repetir cada 6 horas si los síntomas persisten, sin exceder 4 tomas en un periodo de 24 horas, ni por más de 3 días consecutivos sin consultar al médico. No tomar junto con otros medicamentos de prescripción o sin prescripción que contengan acetaminofén o indicados para el alivio del dolor, fiebre, resfriados o para conciliar el sueño. No se recomienda en niños menores de 2 años. Los rangos de edad en la tabla de dosificación son únicamente para orientación. Utilice siempre la menor dosis efectiva para tratar los síntomas y en el menor periodo de tiempo necesario.

CONTRAINDICACIONES

4. ¿Cuándo no debe usarse Winasorb Niños?

No utilice el medicamento si es alérgico o hipersensible al acetaminofén o a cualquier componente de la formulación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Winasorb Niños?

Contiene acetaminofén. No utilizar con otros productos que contengan acetaminofén porque puede ocurrir una sobredosis. Nunca exceda la dosis de medicamento del que se muestra en la

La detención de este inserto antes de utilizar Winasorb Niños. Consulte por si necesita volver a leerlo. Conservarlo a su profesional de la salud si tiene alguna duda.

DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL

Acetaminofén

FÓRMULA DEL MEDICAMENTO

1. ¿Qué contiene Winasorb Niños?

Cada tableta masticable contiene: Acetaminofén encapsulado (92%) 87 mg equivalente a 80 mg de Acetaminofén. La tableta también contiene D8C rojo lastra #27, D8C rojo lastra #30, sabor, manitol, sacarina sódica, ácido estéarico, almidón de maíz.

PROPIEDADES / INDICACIONES

2. ¿Para qué sirve Winasorb Niños?

Usar Winasorb Niños para

- El alivio de:
- ✓ La fiebre
- ✓ El dolor de cabeza
- ✓ El dolor y fiebre asociado con la dentición
- ✓ El dolor después de tratamiento dental / extracción dental
- ✓ El dolor y fiebre asociado a la vacunación.

DOSIS / MODAL DE EMPLEO

3. ¿Cómo debe ser usado Winasorb Niños?

Para uso oral únicamente.

6200000231190

tabla. La dosis excesiva del acetaminofén puede causar daño grave al hígado.

Antes de tomar o cuando suministre este medicamento consulte a su médico si:

- El dolor y la fiebre persisten por más de 3 días, empeora o ocurren nuevos síntomas.
- El niño ha sido diagnosticado con problemas con mal funcionamiento del hígado o de los riñones. Está bajo peso o desnutrido. Está tomando warfarina u otros medicamentos anticoagulantes. Si tiene infección severa, está severamente desnutrido o severamente bajo de peso, lo que puede aumentar el riesgo de toxicidad metabólica, cuyos síntomas incluyen: respiración agitada y con dificultad, náuseas, vómito, pérdida del apetito.
- Consulte a su médico inmediatamente si el niño presenta la combinación de los siguientes síntomas: Siempre siga las instrucciones del empaque. Contiene almidón de maíz procedente de la planta de maíz.

INTERACCIONES

6. ¿Está tomando otros medicamentos?

Consulte a su médico si su niño toma warfarina o medicamentos similares para adelgazar la sangre.

REACCIONES ADVERSAS

7. ¿Qué reacciones secundarias puede causar Winasorb Niños?

Deje de administrar este medicamento al niño y consulte a su doctor inmediatamente si:

- Consulte a su doctor inmediatamente si:
 - Experimenta una reacción alérgica como picazón en la piel, picazón, con problemas para respirar, inflamación de labios, lengua, garganta y cara.
- Experimenta descamación de la piel y úlceras bucales.
- Experimenta reacciones en piel como el Síndrome de Stevens- Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica y Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda.
- Si ha experimentado problemas para respirar luego de tomar ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta esas

reacciones con este producto.
• Experimenta sangrado o hematomas inexplicables.
Estas reacciones son raras.

Manejo de sobredosis

Si el niño toma más cantidad de medicamento de lo indicado, consulte inmediatamente al médico, aunque no presente síntomas, debido al riesgo de daño hepático. La sobredosis de acetaminofén puede causar insuficiencia hepática que puede llevar a un trasplante de hígado o la muerte.

Información Adicional

Conservarse a menos de 30°C
• Uso pediátrico
• Manténgase fuera del alcance y vista de los niños
NO SE USE SI EL SOBRE ESTA ROTO.
No contiene ácido acetilsalicílico ni azúcar.
Presentaciones: Cajas con 20, y 100 tabletas.
Algunas presentaciones no están a la venta en todos los países.

Para mayor información, contacte a Haleon al correo electrónico para reporte de situaciones desfavorables: SafetyReportingAmericas@haleon.co, para quejas de calidad PQC.caricam@haleon.com o al teléfono: República Dominicana +1 (829) 956-6335

Fabricante y Titular

Haleon Panamá S.A., Urbanización Industrial Juan Díaz, calles A y B, Panamá.
Fecha de la última revisión: Marzo 2019, basado en el GDS v7.0 de Agosto 2017

62000000213190