

WINASORB ULTRA

Información del producto

Cada capleta de **Winasorb Ultra** contiene:

Ingrediente Activo: Acetaminofén 500mg **Efecto:** Analgésico (Alivia el dolor) / Antipirético (Baja la fiebre). Cafeína 65mg: **Efecto:** Mejora el efecto analgésico. Excipiente csp 1 capleta.

Use Winasorb Ultra para:

El tratamiento del dolor, incluyendo:

Migraña

Dolor por osteoartritis

Dismenorrea o dolor menstrual

Dolor muscular

Fiebre y dolor después de haber sido vacunado

Dolor posterior a tratamientos dentales / extracción dental

Además, reduce la fiebre

Dosis

Adultos (12 años en adelante): Administración oral 2 capletas cada 6 horas. No exceder 8 capletas en 24 horas. Use la dosis efectiva más baja que necesite para tratar sus síntomas durante el menor tiempo posible. Máximo 8 capletas en 24 horas, ancianos 6 capletas. No se recomienda en menores de 12 años. No administrar más de 4 veces al día la dosis recomendada, ni por más de 10 días consecutivos a adultos. No exceda la dosis declarada.

Contraindicaciones

No utilice si es alérgico al acetaminofén, la cafeína o cualquier otro ingrediente del producto.

Advertencias y precauciones

Contiene acetaminofén. No utilice este medicamento si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofén para tratar el dolor, la fiebre, los síntomas del resfriado y la gripe o para conciliar el sueño. La dosis excesiva del acetaminofén puede causar daño serio al hígado. Siempre lea y siga la etiqueta. **Consulte a su médico antes de usar si:** Tiene problemas de hígado o riñón, está tomando algún medicamento o si está bajo tratamiento médico, está embarazada o en periodo de lactancia, tiene infección grave, tiene muy bajo peso o consume mucho alcohol, es posible que deba evitar el uso del producto por completo o limitar la cantidad de acetaminofén que toma, ya que puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica. , cuyos síntomas incluyen: respiración agitada y con dificultad, náuseas, vómito, pérdida del apetito. Consulte a su médico si presenta la combinación de esos síntomas. El dolor y fiebre persisten por más de 3 días, empeora u ocurren nuevos síntomas. Contiene cafeína. Evite tomar grandes cantidades de café, té u otros medicamentos que contienen cafeína. Niveles altos de cafeína pueden causar dificultades para dormir, agitación, una sensación incómoda en el pecho causada por palpitaciones. Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

Interacciones con otros medicamentos

Este producto no se recomienda si está tomando litio. Consulte a su médico si toma warfarina o medicamentos similares.

Reacciones adversas

Deje de usar si: Tiene reacciones alérgicas en la piel, problemas respiratorios, hinchazón de labios, lengua, cara o garganta, descamación o úlceras en la boca; hematomas o sangrado inexplicables. Experimenta reacciones en piel como el Síndrome de Stevens-Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica o Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda. Ha sufrido previamente problemas de respiración al consumir ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y experimenta reacciones similares. Estas reacciones son raras.

Sobredosis

Si excede la dosis recomendada: Consulte a su médico inmediatamente incluso si no tiene ningún síntoma debido al riesgo de insuficiencia hepática.

Información adicional

Almacenar por debajo de 30°C. Vía oral. Venta Libre. Úselo solo si el sobre está intacto. Para reporte de situaciones desfavorables SafetyReportingAmericas@haleon.com, para quejas de calidad PQC.Caricam@haleon.com o al teléfono: República Dominicana +1 (829) 956-6335. www.haleon.com. www.winasorbdo.com