

## PRIMARIO: Sobre

### [FRENTE]

[Logo GSK]

### SAL ANDREWS CLÁSICA

Bicarbonato de sodio, Sulfato de magnesio

Polvo Efervescente

Combate 6 síntomas de la acidez.

5 g

### [DORSO]

Comienza a actuar en segundos\*. Antiácido.

### [Fórmula]

**Información del Producto:** Cada sobre de 5 g contiene: Bicarbonato de Sodio 2,18 g; Sulfato de Magnesio 0,8825 g; excipientes c.s. Contiene Sacarina Sódica 2,50 mg.

### [Indicaciones]

**Usos:** Alivio rápido del malestar estomacal, la acidez, la sensación de llenura, la indigestión y otras molestias por excesos en el comer o beber.

### [Dosis y administración]

**Dosis: Adultos y niños mayores de 12 años. Como antiácido:** Disuelva un sobre en medio vaso de agua. Repita si es necesario. **Como digestivo y para restaurar la regularidad intestinal:** Disuelva dos sobres en medio vaso de agua antes de acostarse o antes del desayuno. No exceda la dosis máxima de 2 sobres en 24 horas. Puede ser tomado mientras esté efervescente o dejándolo reposar según el gusto.

### [Advertencias y precauciones]

**Advertencias y Precauciones:** NO USE SI EL SOBRE ESTÁ ROTO. No usar si tiene dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de apendicitis. No exceda la dosis recomendada, ni lo utilice por más de dos semanas excepto por recomendación médica. No tomar conjuntamente con productos lácteos. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### [Consulte a su Médico si:]

**Consulte a su Médico si:** Está consumiendo otros medicamentos. Los síntomas persisten. Sufre de hipertensión o de alguna enfermedad del corazón. Está sometido a una dieta sin o pobre de sal. (Cada sobre contiene **0,64 g de sodio**). Está embarazada o en período de lactancia. En caso de sobredosis accidental.

### [Contraindicaciones:]

**Contraindicaciones:** Alergia a los componentes de la fórmula. No administrar en pacientes con enfermedad de riñones o de hígado, ni en pacientes con sangrado rectal.

### [Interacciones]

**Interacciones:** No se use con anticolinérgicos, quinolonas, efedrina, litio, salicilatos y tetraciclinas.

**[Reacciones Adversas:]**

**Reacciones Adversas:** A dosis recomendada ninguna.

**[Información adicional]**

**Información Adicional:** Consérvese a menos de 30°C. Vía Oral. Venta libre.

**SECUNDARIO: Caja**

**[FRENTE]**

[Logo GSK]

**SAL ANDREWS CLÁSICA**

Bicarbonato de sodio, Sulfato de Magnesio

Polvo Efervescente

Combate 6 síntomas de la acidez.

- Acidez
- Indigestión
- Pesadez
- Malestar estomacal
- Sensación de ardor
- Boca ácida/agria

Comienza a actuar en segundos\*.

12 sobres / 50 sobres / 30 sobres / 60 sobres

**[DORSO]**

Antiácido.

**[Fórmula]**

**Información del Producto:** Cada sobre de 5 g contiene: Bicarbonato de Sodio 2,18 g; Sulfato de Magnesio 0,8825 g. Excipientes: Ácido Cítrico; Carbonato de Sodio; Sacarina Sódica 2,50 mg.

**[Indicaciones]**

**Usos:** Alivio rápido del malestar estomacal, la acidez, la sensación de llenura, la indigestión y otras molestias por excesos en el comer o beber.

**[Dosis y administración]**

**Dosis: Adultos y niños mayores de 12 años. Como antiácido:** Disuelva un sobre en medio vaso de agua. Repita si es necesario. **Como digestivo y para restaurar la regularidad intestinal:** Disuelva dos sobres en medio vaso de agua antes de acostarse o antes del desayuno. No exceda la dosis máxima de 2 sobres en 24 horas. **Sal Andrews Clásica** puede ser tomado mientras esté efervescente o dejándolo reposar según el gusto.

**[Advertencias y Precauciones:]**

**Advertencias y Precauciones:** NO USE SI EL SOBRE ESTÁ ROTO. ●No usar si tiene dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de apendicitis. ●No exceda la dosis recomendada, ni lo utilice por

más de dos semanas excepto por recomendación médica. ●No tomar conjuntamente con productos lácteos. ●MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**[Consulte a su Médico si:]**

**Consulte a su Médico si:** ●Está consumiendo otros medicamentos. ●Los síntomas persisten. ●Sufre de hipertensión o de alguna enfermedad del corazón. ●Está sometido a una dieta sin o pobre de sal (cada sobre contiene **0,64 g de sodio**). ●Está embarazada o en período de lactancia. ●En caso de sobredosis accidental. ●Necesita información adicional o tiene alguna duda.

**[Contraindicaciones:]**

**Contraindicaciones:** Alergia a los componentes de la fórmula. No administrar en pacientes con enfermedad de riñones o de hígado, ni en pacientes con sangrado rectal.

**[Interacciones]**

**Interacciones:** No se use con anticolinérgicos, quinolonas, efedrina, litio, salicilatos y tetraciclinas.

**[Reacciones Adversas:]**

**Reacciones adversas:** A dosis recomendada ninguna.

**[Información Adicional:]**

**Información Adicional:** Consérvase a menos de 30°C. Vía Oral. Venta libre.

**[Código QR]**



**02 299 4751**



[ec.consumo@gsk.com](mailto:ec.consumo@gsk.com)



[www.gsk.com](http://www.gsk.com)

Manuf.:

Lote:

Exp.:

**Nota:** La información entre corchetes “[ ]” solo es de guía y referencia, no será transcrito en el texto del diseño final del producto. Todos los apartados incluidos en este formato se adecuan a lo requerido por la regulación local.